Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Traitement par produit de comblement (acide hyaluronique)

Injection d'acide hyaluronique pour la perte de volume, les contours et les rides du visage

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Lieu de réalisation de l'acte : _____

Nom du produit / marque : _____

Numéro de LOT et date de péremption : _____

Quantité totale (mL) : _____

Zones traitées : ☐ Lèvres ☐ Sillons nasogéniens ☐ Joues / pommettes ☐ Menton ☐ Ligne de la mâchoire ☐ Cernes (vallée des larmes) ☐ Nez ☐ Autre _____

Instrument d'injection : ☐ Aiguille ☐ Canule ☐ Les deux _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans notre peau ; il retient l'eau et donne aux tissus leur volume. Les produits de comblement sont une forme gel de cette substance, fabriquée en laboratoire. Ils sont utilisés pour **restaurer le volume** perdu avec l'âge, pour **redessiner les contours** des lèvres, des joues, du menton et de la ligne de la mâchoire, ou pour adoucir les **rides et les creux**.

La perte de volume et les rides du visage apparaissent sous l'effet du vieillissement, des modifications des os et du tissu graisseux, de la perte de poids, de l'exposition au soleil et de facteurs génétiques. L'effet du produit de comblement à l'acide hyaluronique est **temporaire** ; il est progressivement résorbé par l'organisme. **Aucun produit de comblement permanent n'est utilisé dans notre cabinet.**

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

Le traitement est réalisé au cabinet. Votre visage est d'abord évalué, vos attentes sont discutées, un plan de traitement est établi et des photographies sont prises avant le traitement.

1. **Préparation :** le maquillage est retiré et la peau est nettoyée avec une solution antiseptique. Une crème anesthésiante peut être appliquée pour votre confort ; la plupart des produits de comblement contiennent également un anesthésique local (lidocaïne).
2. **Injection :** le gel est injecté lentement et en petites quantités, à la profondeur et dans la zone prévues, à l'aide d'une aiguille fine ou d'une canule souple à bout mousse. Des techniques sûres sont utilisées pour réduire le risque d'injection dans un vaisseau sanguin.
3. **Modelage :** si nécessaire, le produit est délicatement modelé avec les doigts ; le résultat est évalué avec vous devant le miroir.
4. **Traçabilité :** le nom du produit, le numéro de LOT, la quantité et les zones traitées sont consignés dans votre dossier. Une carte/étiquette mentionnant les informations sur le produit peut vous être remise ; nous vous recommandons de la conserver.

Un avantage important du produit de comblement à l'acide hyaluronique en matière de sécurité est qu'il peut, si nécessaire, être dissous à l'aide d'une enzyme appelée **hyaluronidase**. Ce médicament et le matériel d'urgence sont toujours tenus prêts dans notre cabinet.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Crème anesthésiante et/ou anesthésique local contenu dans le produit	Environ 20–45 minutes	Le jour même ; 15–30 minutes de surveillance après le traitement

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Restauration du volume perdu, pour un aspect plus frais et plus équilibré
- Contours des lèvres, des joues, du menton et de la ligne de la mâchoire plus nets et plus harmonieux
- Adoucissement des rides et des creux
- Un résultat visible immédiatement et un retour rapide à la vie quotidienne

Le résultat est visible immédiatement après le traitement et peut être apprécié plus nettement une fois le gonflement résorbé, vers **2 semaines**. Selon le produit, la zone et votre métabolisme, l'effet dure généralement **6–18 mois** (moins longtemps dans les lèvres, plus longtemps dans les joues et le menton). Pour maintenir le résultat, le traitement doit être renouvelé à intervalles réguliers. En cas de relâchement cutané marqué, l'amélioration possible avec un produit de comblement peut être limitée.

4 Autres options thérapeutiques

- **Absence de traitement :** s'agissant d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la réaliser.
- **Toxine botulique :** plus adaptée aux rides dues aux mouvements du visage qu'à celles dues à une perte de volume.
- **Rajeunissement cutané :** la mésothérapie, le PRP, les peelings ou le laser peuvent améliorer la qualité de la peau, mais n'apportent pas de volume.
- **Transfert de graisse (à partir de votre propre graisse) :** peut durer plus longtemps ; nécessite un petit geste chirurgical.
- **Chirurgie :** un lifting du visage, une chirurgie des paupières, un implant de menton ou une rhinoplastie peuvent apporter un changement plus marqué ou permanent.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si le traitement n'est pas réalisé, votre visage continuera d'évoluer avec le vieillissement naturel. Cela ne représente pas de danger pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Le traitement **n'est pas réalisé, ou est reporté,** dans les situations suivantes : grossesse, allaitement, acné active, bouton de fièvre (herpès labial) ou infection dans la zone à traiter, allergie connue au produit ou à la lidocaïne, antécédent de réaction allergique grave (anaphylaxie), ou maladie auto-immune non contrôlée. Veuillez nous signaler si l'une de ces situations vous concerne.
- Signalez-nous si vous avez déjà reçu **un produit de comblement, quel qu'il soit,** dans la même zone (en particulier un produit permanent ou de nature inconnue), des fils ou des implants.
- Dans la mesure du possible, évitez les soins dentaires, les vaccinations ou toute autre intervention chirurgicale programmée pendant les **2 semaines qui précèdent et les 2 semaines qui suivent** le traitement, car ils peuvent augmenter le risque de réaction inflammatoire retardée. Si vous devez en avoir, veuillez nous en informer.
- Si vous avez un événement social important, prévoyez le traitement au moins 2 semaines avant, en raison d'un éventuel gonflement et d'ecchymoses.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24 heures	Un gonflement, une sensibilité et une rougeur apparaissent dans la zone ; une compresse froide soulage. Ne massez pas et n'appuyez pas sur la zone. Évitez le maquillage, le sauna, le sport intense et l'alcool. Le gonflement est plus marqué après un comblement des lèvres.
Jours 2–7	Le gonflement diminue en grande partie. **Si** des ecchymoses apparaissent, elles s'estompent en 5–10 jours. De petites zones fermes peuvent être perçues au toucher ; la plupart s'assouplissent d'elles-mêmes. Évitez de dormir sur le ventre et les massages du visage.
2e semaine	Le résultat se stabilise. Un contrôle est organisé si nécessaire ; en cas d'asymétrie ou de correction insuffisante, une petite injection complémentaire peut être prévue après évaluation par le médecin.
Mois 6–18	Le produit est progressivement résorbé. Le moment du renouvellement du traitement est planifié avec vous.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Légère douleur, rougeur et sensibilité aux points d'injection
- Gonflement (peut être marqué pendant quelques jours, en particulier au niveau des lèvres et sous les yeux)
- Ecchymoses ; **si** elles apparaissent, elles s'estompent en 1–2 semaines
- Petites zones fermes perceptibles au toucher (s'assouplissent généralement en quelques semaines)

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Légère asymétrie ou volume plus ou moins important que prévu** — Les deux moitiés du visage sont naturellement différentes ; de petites différences peuvent persister. Elles peuvent être corrigées lors du contrôle par une injection complémentaire ou par de la hyaluronidase.
- **Gonflement prolongé** — En particulier sous les yeux, le gonflement peut durer plusieurs semaines chez certaines personnes.

Situations peu fréquentes

- **Induration persistante ou nodules (grosseurs)** — Peuvent se former lorsque le produit s'accumule en un endroit. Peuvent être traités par massage, hyaluronidase ou d'autres traitements.
- **Coloration bleutée (effet Tyndall)** — Peut être observée lorsque le produit est injecté trop près de la surface, en particulier dans la peau fine sous les yeux ; elle peut être corrigée par de la hyaluronidase.
- **Déplacement du produit (migration)** — Avec le temps, le produit peut se déplacer vers une zone voisine (par ex. au-dessus du contour de la lèvre) ; il peut être dissous si nécessaire.
- **Infection et biofilm** — Rarement, une rougeur, une chaleur, une douleur ou un abcès peuvent apparaître au niveau de la zone traitée. Des antibiotiques et, si nécessaire, la dissolution du produit et un drainage peuvent être nécessaires. Si une couche de bactéries (biofilm) se forme autour du produit, l'inflammation peut récidiver et le traitement peut être long.
- **Réaction inflammatoire retardée** — **Des semaines, voire des mois** après le traitement, souvent à la suite d'une stimulation du système immunitaire comme une grippe, des soins dentaires ou une vaccination, un gonflement douloureux et une rougeur peuvent apparaître dans la zone comblée (chez **moins de 1 patient sur 100**). Elle s'améliore avec un traitement médicamenteux et, si nécessaire, la dissolution du produit.
- **Réactivation de l'herpès labial (bouton de fièvre)** — Peut survenir, en particulier après un traitement des lèvres ; si vous avez déjà eu des boutons de fièvre, un traitement préventif peut vous être prescrit.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Obstruction d'un vaisseau sanguin (occlusion vasculaire)** — Il s'agit du risque le plus important des produits de comblement. Si le produit pénètre dans un vaisseau sanguin ou le comprime de l'extérieur, la vascularisation de la zone concernée peut être compromise. Elle est rapportée dans les publications dans environ **1 traitement sur 1 000 à 1 sur 10 000** ; le risque est plus élevé au niveau du **nez, de l'espace entre les sourcils et des sillons nasogéniens**. Signes : **douleur intense** pendant ou après le traitement, **blanchiment** de la peau, suivi d'une **coloration violacée et sombre, en réseau** et d'une sensation de froid. Si elle n'est pas reconnue tôt et traitée immédiatement, elle peut entraîner une **ulcération de la peau et une perte de tissu (nécrose)**, une cicatrice permanente et une déformation.
- **Traitement d'urgence : la hyaluronidase** — En cas de suspicion d'occlusion vasculaire, le traitement est immédiatement interrompu et une dose élevée de **hyaluronidase** est injectée pour dissoudre le produit, en association avec des compresses chaudes, des massages et un traitement médicamenteux. Ce traitement est généralement efficace, mais **il ne permet pas toujours de réparer complètement** les dommages. La hyaluronidase elle-même peut très rarement provoquer une réaction allergique. Un transfert à l'hôpital, des soins de plaie, un traitement prolongé ou des interventions correctrices ultérieures peuvent être nécessaires.
- **Perte de la vue et accident vasculaire cérébral** — Bien que cela soit extrêmement rare, si le produit atteint les vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil ou le cerveau, il peut provoquer une **perte de la vue partielle ou totale et définitive** ou un **accident vasculaire cérébral (AVC)**. Ce risque est le plus souvent associé au traitement du nez et de l'espace entre les sourcils. Dans cette situation, **chaque minute compte** ; vous serez transféré(e) à l'hôpital pour une évaluation ophtalmologique et neurologique en urgence.
- **Réaction allergique grave** — Une réaction allergique sévère (anaphylaxie) à l'acide hyaluronique ou à la lidocaïne est extrêmement rare ; elle nécessite un traitement en urgence.
- **Granulome** — L'organisme forme des nodules fermes et inflammatoires en réaction au produit ; cela est très rare et peut nécessiter un traitement de longue durée.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Malaise (réaction vasovagale) :** Des vertiges, des sueurs et un bref évanouissement peuvent survenir pendant une injection ou une prise de sang ; ils passent rapidement en position allongée.
- **Infection :** Grâce à la désinfection de la peau et au matériel stérile, le risque est très faible ; si elle survient, elle est généralement traitée par antibiotiques.
- **Réaction allergique :** Au produit, à l'anesthésique local ou à l'antiseptique utilisé — allant d'une légère rougeur à, très rarement, une réaction allergique grave (anaphylaxie). Notre cabinet dispose du matériel et des médicaments d'urgence.
- **Réactivation d'un bouton de fièvre (herpès) :** Si vous avez déjà eu des boutons de fièvre, ils peuvent réapparaître dans la zone traitée ; merci de nous le signaler.
- **Résultat ne répondant pas aux attentes :** L'intensité et la durée de l'effet varient d'une personne à l'autre ; des séances supplémentaires ou une retouche peuvent être nécessaires.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Douleur intense** après le traitement, qui ne s'atténue pas ou qui ne cesse d'augmenter
- **Blanchiment, ou coloration violacée et sombre, en réseau (marbrée)** de la peau, sensation de froid, cloques ou plaie
- **Vision floue ou perte de la vue**, douleur oculaire ou vision double — **chaque minute compte** : appelez immédiatement ou rendez-vous aux urgences les plus proches
- **Maux de tête violents, troubles de la parole, faiblesse du visage, d'un bras ou d'une jambe** d'apparition soudaine (signes d'AVC) — appelez immédiatement le 112
- Gonflement d'apparition rapide du visage, des lèvres ou de la langue, urticaire ou essoufflement
- Fièvre, rougeur, chaleur et induration/gonflement croissants (même plusieurs semaines après)

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Évitez le maquillage, le sauna, le hammam, le sport intense et l'alcool pendant les 24 premières heures ; évitez de masser la zone, les soins du visage et de dormir sur le ventre pendant les 2 premières semaines.
- Protégez la zone du soleil, des cabines de bronzage (UV) et du grand froid pendant les 2 premières semaines.
- Si un autre médecin intervient à l'avenir sur votre visage (produit de comblement, laser, chirurgie, soins dentaires), informez-le que vous avez reçu un produit de comblement et indiquez-lui le nom du produit.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

12 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

13 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Il m'a été expliqué qu'il existe un risque d'occlusion vasculaire et de lésions cutanées qui en résultent et, bien que très rarement, de perte de la vue et d'accident vasculaire cérébral ; quel traitement d'urgence (hyaluronidase) serait administré dans ce cas ; et que ce traitement peut ne pas toujours être pleinement efficace.
- ☐ Je comprends que l'effet du produit de comblement est temporaire et qu'aucun produit de comblement permanent n'est utilisé dans ce cabinet, et je déclare avoir signalé de manière complète tous mes traitements antérieurs par produit de comblement ou implant.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.