Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Liposuccion sous-mentonnière

Retrait de la graisse sous le menton (liposuccion du double menton)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Technique prévue : ☐ Conventionnelle (tumescente) ☐ Assistée par énergie (laser/RF) ☐ À décider par le chirurgien

Anesthésie : ☐ Anesthésie locale ☐ Anesthésie locale + sédation ☐ Anesthésie générale _____

Interventions réalisées en même temps : ☐ Aucune ☐ Avec un formulaire de consentement distinct : _____

Préoccupations et attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La graisse qui s'accumule sous le menton (« double menton ») peut effacer l'angle entre le menton et le cou, donnant à l'ovale du visage un aspect moins net, fatigué ou plus lourd qu'il ne l'est réellement. La graisse dans cette zone est souvent due à une **prédisposition génétique** et peut ne pas disparaître complètement, même avec une perte de poids ou de l'exercice. La perte d'élasticité de la peau avec l'âge la rend également plus visible.

La liposuccion sous-mentonnière retire la **graisse située sous la peau** par aspiration à l'aide de fines canules. Le but est de dessiner l'ovale du visage et d'obtenir un **angle menton–cou naturel et harmonieux**.

Le facteur le plus important pour le résultat est la **qualité et l'élasticité de la peau**. Une peau élastique s'adapte au nouveau contour après le retrait de la graisse ; une peau peu élastique peut présenter un relâchement plus marqué. La graisse profonde située sous le muscle du cou (platysma), des glandes salivaires volumineuses, des bandes cervicales marquées et un relâchement cutané important ne peuvent pas être corrigés par la liposuccion ; dans ces cas, d'autres méthodes, comme un lifting cervical profond, peuvent être nécessaires.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

Avant l'intervention, votre menton et votre cou sont examinés, l'élasticité de la peau est évaluée, des photographies sont prises et la zone à traiter est marquée alors que vous êtes en position assise.

1. **Anesthésie et infiltration de liquide :** Un liquide spécial (solution de tumescence) contenant un anesthésique local et un médicament destiné à réduire le saignement est injecté dans la zone. Ce liquide prévient la douleur et réduit également le saignement et les ecchymoses.
2. **Petites incisions :** De petits points d'entrée d'environ **3 à 5 mm** sont réalisés dans le pli naturel sous le menton et, si nécessaire, derrière les lobes des oreilles.
3. **Retrait de la graisse :** La graisse est retirée avec soin et de manière homogène par aspiration à l'aide de fines canules (tubes métalliques). Une fine couche de graisse est laissée sous la peau afin de conserver une surface régulière.
4. **Traitement assisté par énergie (s'il est prévu) :** Une énergie laser ou de radiofréquence est utilisée pour assouplir la graisse et aider la peau à se retendre dans une certaine mesure. Cela peut contribuer à raffermir la peau, mais ne corrige pas un relâchement important.
5. **Fermeture et vêtement de contention :** Les points d'entrée sont refermés par un seul point ou laissés se refermer d'eux-mêmes. À la fin de l'intervention, un **vêtement de compression élastique (mentonnière)** est placé autour du menton et du cou.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie locale, locale + sédation, ou anesthésie générale	Environ 45 à 90 minutes (lorsqu'elle est réalisée seule)	Généralement sortie le jour même

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Réduction de l'excès de graisse sous le menton
- Un ovale du visage et un angle menton–cou mieux dessinés ; un profil du visage plus harmonieux
- Un résultat **durable** tant que votre poids reste stable, car les cellules graisseuses retirées ne se reforment pas (les modifications naturelles de la peau et des tissus liées au vieillissement se poursuivront)

La plupart des patients ayant une bonne élasticité cutanée sont satisfaits du résultat. Le résultat apparaît en **3 à 6 mois**, à mesure que le gonflement diminue. Environ **3 à 5 patients sur 100** peuvent avoir besoin d'une petite retouche en raison d'irrégularités, de graisse résiduelle ou d'une asymétrie. Une prise de poids importante et le vieillissement peuvent modifier le résultat avec le temps.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas réaliser l'intervention :** Comme il s'agit d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la faire.
- **Perte de poids et changements du mode de vie :** Réduisent la graisse corporelle globale, mais ne suppriment pas toujours la graisse rebelle sous le menton.
- **Injections lipolytiques (par ex. acide désoxycholique) :** Nécessitent plusieurs séances, peuvent provoquer un gonflement et une douleur marqués, et ont un effet plus limité.
- **Cryolipolyse (destruction de la graisse par le froid) et traitements par appareils :** Non chirurgicaux, mais nécessitent plusieurs séances et ont un effet plus limité.
- **Lifting cervical profond / lifting du cou :** Une option plus adaptée en cas de relâchement cutané important, de bandes cervicales ou de graisse profonde sous le muscle.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'intervention n'est pas réalisée, l'aspect sous votre menton restera tel qu'il est et pourra s'accentuer avec l'âge ou une prise de poids. Cela ne représente aucun danger pour votre santé.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang sont réalisées avant l'intervention ; si une sédation ou une anesthésie générale est prévue, vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste et devrez être à jeun au préalable.
- Votre poids doit idéalement être stable avant l'intervention ; si vous prévoyez une variation de poids importante dans un avenir proche, parlez-en à votre médecin.
- N'appliquez ni crème ni maquillage sur le visage et le cou le jour de l'intervention ; portez un haut confortable qui s'ouvre sur le devant plutôt qu'un vêtement à col montant.
- Après une sédation ou une anesthésie générale, vous ne devez pas conduire ; veuillez rentrer chez vous accompagné(e).
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 48 heures	Vous aurez un gonflement, une sensation de tiraillement et une légère douleur sous le menton, et un peu de liquide rosé peut s'écouler par les points d'entrée ; c'est normal. Les ecchymoses, **si elles apparaissent**, peuvent s'étendre vers le bas du cou et disparaissent en 1 à 2 semaines. Dormez la tête surélevée et portez le vêtement de contention en permanence.
1re semaine	Le vêtement de contention est généralement porté **jour et nuit pendant la première semaine**, puis **la nuit pendant 2 à 3 semaines supplémentaires**. Les éventuels points sont retirés entre le 5e et le 7e jour. La plupart des patients reprennent un travail de bureau et leur vie sociale en 3 à 7 jours.
2e à 6e semaine	Le gonflement diminue en grande partie. Une induration, de petites boules et un engourdissement peuvent être ressentis dans la zone ; ils s'assouplissent avec le temps. Le sport intense peut généralement être repris après **2 à 3 semaines**. Si cela vous est recommandé, massez doucement la zone.
3e à 6e mois	Le gonflement et l'induration résiduels disparaissent, la peau s'adapte au nouveau contour et le résultat devient net.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Gonflement, tiraillement et légère douleur sous le menton et dans le cou ; les ecchymoses, **si elles apparaissent**, disparaissent en 1 à 2 semaines
- Écoulement de liquide rosé par les points d'entrée pendant les 24 à 48 premières heures
- Engourdissement temporaire et diminution de la sensibilité dans la zone
- Légère induration et petites boules palpables pendant plusieurs semaines

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Induration et boules prolongées (fibrose)** — Une induration et des irrégularités sous la peau sont fréquentes pendant la cicatrisation ; la plupart s'assouplissent en quelques mois avec les massages et le temps.
- **Engourdissement prolongé** — La diminution de la sensibilité de la peau sous le menton peut durer de quelques semaines à quelques mois ; très rarement, elle est permanente.
- **Légère asymétrie** — Les deux moitiés du visage n'étant jamais parfaitement symétriques, de petites différences peuvent persister.

Situations peu fréquentes

- **Irrégularités du contour et capitons** — Environ **2 à 5 patients sur 100** peuvent présenter des ondulations, des creux ou des amas de graisse résiduelle. Si trop de graisse est retirée, il peut en résulter un aspect creusé ou « squelettisé » sous le menton et des bandes cervicales plus visibles. La correction peut nécessiter une injection de graisse, une nouvelle liposuccion ou une autre intervention.
- **Relâchement cutané ou retension insuffisante de la peau** — En particulier chez les personnes dont l'élasticité cutanée est diminuée, la peau peut ne pas se retendre suffisamment après le retrait de la graisse et le relâchement peut sembler plus visible. Dans ce cas, un lifting du cou peut être nécessaire à l'avenir.
- **Asymétrie du sourire (atteinte de la branche nerveuse de la lèvre inférieure)** — Une fine branche nerveuse qui longe la mâchoire et fait bouger la lèvre inférieure peut être affectée par le gonflement ou une compression, provoquant une asymétrie de la lèvre inférieure lors du sourire. Cela survient chez environ **1 patient sur 100** et récupère presque toujours spontanément **en quelques semaines à quelques mois** ; une faiblesse permanente est très rare.
- **Accumulation de sang ou de liquide (hématome, sérome)** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Les petites collections se résorbent d'elles-mêmes ; les plus importantes peuvent nécessiter une ponction à l'aiguille ou un petit geste.
- **Infection** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100** ; elle s'améliore généralement avec des antibiotiques et, rarement, un abcès peut devoir être drainé.
- **Cicatrice ou modification de la couleur de la peau aux points d'entrée** — Les petites cicatrices des points d'entrée deviennent généralement peu visibles ; rarement, un assombrissement, un épaississement ou un petit creux peut persister.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Brûlure cutanée (avec les techniques assistées par énergie)** — Lorsqu'un laser ou la radiofréquence est utilisé, malgré les mesures de sécurité, une brûlure de la peau, des cloques et une cicatrice permanente peuvent rarement survenir ; des soins de plaie et un traitement de la cicatrice peuvent être nécessaires.
- **Lésion de la peau ou perte de tissu** — Très rarement, en particulier chez les fumeurs, une altération de l'irrigation sanguine de la peau peut entraîner une plaie et une cicatrice.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Lésion nerveuse permanente** — Une faiblesse permanente des mouvements de la lèvre inférieure est exceptionnelle ; si elle survient, un traitement complémentaire peut être nécessaire.
- **Réaction à l'anesthésique local** — Une allergie à l'anesthésique local peut survenir, ou un taux sanguin trop élevé de celui-ci peut provoquer des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, un goût métallique dans la bouche et, très rarement, des convulsions ou un trouble du rythme cardiaque. Les doses sont maintenues dans des limites sûres.
- **Embolie graisseuse et lésion de structures profondes ou des voies respiratoires** — Le passage de gouttelettes de graisse dans la circulation sanguine, ou une lésion de structures profondes par la canule, sont **exceptionnels** lors d'une liposuccion sous-mentonnière de petit volume ; s'ils survenaient, un traitement en urgence à l'hôpital et en réanimation pourrait être nécessaire.
- **Insatisfaction psychologique** — Malgré un résultat techniquement réussi, une personne peut avoir du mal à s'adapter à sa nouvelle apparence. Discuter ouvertement des attentes avant l'intervention réduit ce risque.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Gonflement dur et tendu du cou augmentant rapidement**, surtout d'un seul côté
- **Difficultés à respirer ou à avaler**, ou modification de votre voix
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, douleur, rougeur ou chaleur croissantes, ou écoulement malodorant
- Peau qui devient blanche, violet foncé ou noire ; cloques remplies de liquide
- Douleur thoracique, essoufflement ou confusion

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Portez le vêtement de contention régulièrement pendant la durée indiquée ; veillez à ce qu'il ne soit ni trop serré ni trop lâche.
- Dormez sur le dos, la tête surélevée, pendant les 1 à 2 premières semaines ; évitez les étirements brusques ou excessifs du cou.
- Évitez le sport intense, le sauna, le hammam et les longues douches chaudes pendant les 2 à 3 premières semaines.
- Protégez la zone du soleil au cours des premiers mois ; cela réduit le risque de cicatrice et de modification de la couleur de la peau.
- Efforcez-vous de garder un poids stable afin de conserver le résultat.
- Si vous venez de l'étranger, prendre l'avion est généralement sans danger à partir du 2e ou 3e jour.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que le résultat dépend de l'élasticité de ma peau et que la liposuccion ne corrige pas le relâchement cutané, les bandes cervicales ni la graisse profonde située sous le muscle.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Je comprends que le port du vêtement de contention et le respect des conseils donnés influenceront directement le résultat.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

- ☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.
- ☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.