Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Верхняя / нижняя блефаропластика

Пластическая операция на веках

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Планируемая зона: ☐ Верхние веки ☐ Нижние веки ☐ Верхние + нижние веки

Методика на нижнем веке: ☐ Трансконъюнктивальная ☐ Субцилиарная (под ресницами) ☐ Не применяется _____

Дополнительные вмешательства: ☐ Перемещение жира ☐ Кантопексия / кантопластика (поддержка века) ☐ Нет _____

Показание: ☐ Эстетическое ☐ Функциональное (сужение поля зрения) ☐ Оба _____

Жалобы и ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

С возрастом кожа век теряет эластичность, мышца вокруг глаза расслабляется, а жировая ткань глазницы может выпячиваться вперёд. В результате на верхних веках появляется **избыток кожи и её нависание**, а под глазами — **мешки и впадины**. Генетическая предрасположенность, солнце, курение и колебания веса могут ускорять этот процесс.

Блефаропластика направлена на то, чтобы придать области глаз **более свежий, отдохнувший и естественный** вид за счёт удаления избытка кожи, мышцы и жира или перемещения жира. Нависание верхнего века иногда

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

бывает настолько выраженным, что сужает верхнюю часть поля зрения; в этом случае у операции есть и функциональная цель — **расширение поля зрения**.

Блефаропластика сама по себе не устраняет низкое положение бровей, опущение века из-за слабости мышцы, поднимающей веко (птоз), мелкие морщины («гусиные лапки») и тёмные круги под глазами; при этих состояниях могут потребоваться другие методы лечения.

2 Как выполняется процедура?

Перед операцией проводится осмотр глаз — оцениваются зрение, слёзопродукция и функция век — и выполняется фотографирование. При необходимости назначается консультация офтальмолога.

1. **Разметка:** Количество удаляемой кожи тщательно размечают в положении сидя, при открытых и закрытых глазах.
2. **Верхнее веко:** Разрез выполняют по естественной складке века, чтобы при открытых глазах он был скрыт в складке. Удаляют избыток кожи, а при необходимости — тонкую полоску мышцы и выпячивающийся жир.
3. **Нижнее веко — трансконъюнктивальная методика:** Разрез делают на внутренней поверхности века, поэтому снаружи рубец не виден. Жир, образующий мешки, удаляют или перемещают для заполнения впадины под глазом.
4. **Нижнее веко — субцилиарная методика:** Если есть также избыток кожи, разрез делают сразу под ресницами и удаляют избыток кожи и мышцы. Со временем рубец обычно становится малозаметным.
5. **Поддержка века (кантопексия/кантопластика):** Если нижнее веко расслаблено, в наружном углу глаза накладывают поддерживающие швы, чтобы после операции веко не оттягивалось вниз.
6. **Завершение операции:** Разрезы зашивают очень тонкими швами, которые обычно снимают на **5–7-й день**. На глаз наносят защитную мазь.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Местная анестезия (± седация) или общий наркоз	Около 1–3 часов	Обычно выписка в тот же день; после общего наркоза может потребоваться одна ночь в стационаре

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более свежий, отдохнувший и молодой вид области глаз
- Уменьшение тяжести верхних век; облегчение зрения, если нависание сужает поле зрения
- Уменьшение мешков на нижних веках и более плавный переход под глазом

Большинство пациентов довольны результатом, и эффект обычно сохраняется много лет; однако поскольку старение продолжается, со временем кожа может снова расслабиться. Примерно **2–5 из 100** пациентов может потребоваться небольшая корректирующая процедура из-за асимметрии, недостаточной коррекции или рубцов. Окончательный результат обычно проявляется через **3–6 месяцев**.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции:** Поскольку это эстетическое вмешательство, у вас всегда есть возможность от него отказаться.
- **Филлер в носослёзную борозду:** Может временно замаскировать небольшую впадину под глазом; он не устраняет мешки или избыток кожи и имеет свои специфические риски.
- **Подъём бровей с помощью ботулотоксина:** В лёгких случаях подъём брови на несколько миллиметров может немного открыть верхнее веко; эффект временный.
- **Подтяжка бровей (височный лифтинг / подтяжка лба):** Если основная проблема — низкое положение бровей, этот вариант может быть более подходящим вместо блефаропластики или в дополнение к ней.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Процедуры обновления кожи (лазер, химический пилинг, радиочастотное воздействие):** Могут улучшить мелкие морщины и качество кожи; они не устраняют значительный избыток кожи и мешки.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, нынешний вид ваших век сохранится и с возрастом может медленно усиливаться. Если нависание верхнего века сужает поле зрения, со временем это может усилиться; однако обычно это не представляет срочной угрозы для здоровья глаз.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови; если планируется общий наркоз или седация, вас осмотрит анестезиолог, и перед операцией нужно будет соблюдать голод.
- Обязательно сообщите нам, если у вас есть **сухость глаз, глаукома, заболевание щитовидной железы или ранее перенесённые операции на глазах (например, лазерная коррекция зрения)**.
- Если вы носите контактные линзы, не надевайте их в день операции; после операции вам нужно будет носить очки.
- В день операции не используйте макияж для глаз, наращённые ресницы и крем для лица. После седации или общего наркоза нельзя садиться за руль; пожалуйста, возвращайтесь домой с сопровождающим.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	Вокруг глаз могут быть отёк, стянутость, небольшое подтекание и синяки. Боль обычно слабая. Сон с приподнятой головой и **холодные компрессы** помогают уменьшить отёк. Возможны слезотечение, светочувствительность и временное затуманивание зрения (из-за мази).
1-я неделя	Швы обычно снимают на **5–7-й день**. Синяки и отёк заметно уменьшаются. Глазные капли/мазь используют согласно рекомендациям. Большинство пациентов возвращаются к сидячей работе и общественной жизни в течение 7–10 дней; синяки можно скрыть макияжем.
2–4-я недели	Оставшийся отёк уменьшается. Контактные линзы обычно можно носить через **2 недели**. Интенсивные физические нагрузки и работу, связанную с наклонами, следует отложить примерно на 2–3 недели. Перед плаванием или использованием макияжа для глаз дождитесь разрешения врача.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

1–6-й месяцы	Покраснение рубца постепенно проходит, и рубец становится трудноразличимым в складке века. Окончательная форма и симметрия век обычно устанавливаются в течение **3–6 месяцев**.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Отёк и стянутость вокруг глаз; синяки, **если они появляются**, проходят в течение 1–2 недель
- Слезотечение, ощущение сухости или песка в глазах, жжение и светочувствительность (первые дни)
- Небольшое затруднение при полном смыкании век в первые дни
- Покраснение, небольшое уплотнение и онемение вдоль линии разреза

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Сухость глаз** — Примерно у **10–25 из 100** пациентов возникает ощущение жжения, рези или сухости; обычно оно проходит при использовании глазных капель в течение от нескольких недель до нескольких месяцев. У людей, у которых уже есть сухость глаз, это может быть более выраженным и длительным.
- **Отёк белка глаза (хемоз)** — Отёк оболочки, покрывающей белок глаза, за счёт скопления жидкости; наблюдается в основном после операции на нижнем веке. Обычно проходит при использовании капель и компрессов в течение нескольких недель.
- **Неполное смыкание век (лагофтальм)** — Неполное смыкание век во время сна часто бывает в первые недели после операции на верхнем веке и обычно проходит само. В этот период для защиты глаза рекомендуется мазь на ночь. Стойким оно бывает редко (**менее чем у 1 из 100**).
- **Мелкие кисты (милиумы) и следы от швов** — Вдоль линии разреза могут образоваться мелкие белые точки; они проходят сами или удаляются с помощью простой процедуры.

Нечастые состояния

- **Оттягивание нижнего века вниз или его выворот (ретракция века, эктропион)** — После операции на нижнем веке примерно у **1–5 из 100** пациентов (чаще при субцилиарной методике) нижнее веко может оттягиваться вниз, под радужкой может быть видно больше белка глаза, или веко может выворачиваться наружу. В большинстве случаев это проходит при массаже и тейпировании; если состояние сохраняется, оно может вызывать сухость и слезотечение, и может потребоваться **корректирующая операция**.
- **Асимметрия и недостаточная или избыточная коррекция** — Между двумя веками может сохраняться разница в высоте складки или форме; если удалено слишком много кожи, может быть трудно закрывать глаза, а если удалено слишком много жира, может появиться впалый вид. Может потребоваться корректирующая процедура.
- **Изменение формы угла глаза** — Если выполнялась поддержка века (кантопексия/кантопластика), наружный угол глаза может некоторое время выглядеть натянутым, приподнятым или округлённым либо отличаться с двух сторон. В большинстве случаев это смягчается в течение нескольких недель или месяцев по мере спадания отёка; иногда требуется коррекция.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Проявление опущения века (птоза)** — Слабость мышцы, поднимающей веко, ранее скрытая избытком кожи, может стать заметной после операции; может потребоваться её исправление отдельной операцией.
- **Заметный или утолщённый рубец** — Кожа век обычно заживает очень хорошо; в редких случаях рубец может оставаться заметным или во внутреннем углу может образоваться тонкая складка-перепонка.
- **Кровотечение и скопление крови (гематома)** — Скопление крови под кожей возникает примерно у **1 из 100** пациентов; обычно оно рассасывается само, но если гематома большая, может потребоваться её удаление.
- **Инфекция** — Поскольку веки очень хорошо кровоснабжаются, инфекция бывает редко (**менее чем у 1 из 100**); если она развивается, её лечат антибиотиками.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Кровотечение за глазом и потеря зрения** — Это самое серьёзное, но очень редкое осложнение. Кровотечение за глазным яблоком возникает примерно у **1 из 2000** пациентов и может сдавливать зрительный нерв. Если его не распознать быстро и не оказать неотложную помощь (снятие швов, удаление крови, лекарственная терапия, экстренная операция), оно может привести к **необратимой потере зрения**. Необратимая потеря зрения описана примерно у **1 из 10 000–40 000** пациентов или реже. Именно поэтому предупреждающие признаки в первые 48 часов так важны.
- **Двоение в глазах** — Вызвано воздействием во время операции на нижнем веке на небольшую мышцу, которая двигает глаз (нижнюю косую мышцу); обычно оно временное, очень редко стойкое и может потребовать дополнительного лечения или операции.
- **Царапина или язва роговицы** — На прозрачной передней поверхности глаза может появиться царапина, вызывающая боль, ощущение песка и слезотечение; обычно она заживает при использовании капель в течение нескольких дней. Очень редко может потребоваться длительное лечение глаза.
- **Нарушение оттока слезы** — Слезотечение из-за повреждения слёзного канала бывает очень редко.
- **Психологическая неудовлетворённость** — Несмотря на технически успешный результат, человеку может быть трудно привыкнуть к своему новому виду. Открытое обсуждение ожиданий до операции снижает этот риск.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Сильная, нарастающая боль в глазу**, особенно с одной стороны
- **Выпячивание глаза вперёд** или быстро нарастающий, напряжённый отёк и синяки век
- **Снижение зрения**, потемнение в глазах, двоение или ограничение движений глаза
- Боль в глазу вместе с тошнотой или рвотой
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающее покраснение, выделения или боль в области разреза
- Выраженная светочувствительность и не проходящее ощущение песка в глазу
- **Если что-либо из этого возникает в первые 48 часов, счёт идёт на минуты: немедленно позвоните или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.**

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 48 часов регулярно прикладывайте холодные компрессы; спите на спине с приподнятой головой.
- Не трите глаза. В первые дни избегайте подъёма тяжестей, наклонов, натуживания и действий, повышающих риск кровотечения.
- Используйте выданные вам глазные капли и мази с рекомендованной частотой; если глаза закрываются не полностью, обязательно наносите мазь на ночь.
- Как правило, не носите контактные линзы 2 недели и не пользуйтесь макияжем для глаз 1–2 недели. На улице носите солнцезащитные очки и часто делайте перерывы при работе за экраном.
- Если вы приехали из-за рубежа, авиаперелёт обычно безопасен после снятия швов (5–7-й день).
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**,

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что блефаропластика сама по себе не устраняет низкое положение бровей, опущение века из-за слабости мышцы, поднимающей веко, мелкие морщины и тёмную пигментацию под глазами.
- ☐ Я понимаю, что если в первые 48 часов после операции у меня появится сильная боль в глазу, отёк или снижение зрения, я должен(-на) **немедленно** обратиться за помощью.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.