Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Лечение ботулинотоксином (ботокс)

Инъекционное лечение мимических морщин, увеличенной жевательной мышцы (массетера) или повышенной потливости

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Место проведения процедуры: _____

Название препарата / марка: _____

Номер серии (LOT) и срок годности: _____

Общее количество единиц и разведение: _____

Зоны введения:
☐ Лоб ☐ Межбровье ☐ «Гусиные лапки» (уголки глаз)
☐ Массетер (жевательная мышца) ☐ Шея
☐ Потливость (подмышки / ладони) ☐ Другое _____

Цель процедуры:
☐ Эстетическая ☐ Медицинская (бруксизм, потливость и т. п.)
_____

Зона(-ы) применения вне инструкции (офф-лейбл):
☐ Нет ☐ Да — зона: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Ботулинотоксин — это очищенный белок, который временно ослабляет связь между мышцей, в которую он введён, и её нервом, вследствие чего мышца сокращается слабее. В эстетических целях его применяют, чтобы смягчить **мимические морщины** на лбу, в межбровье и вокруг глаз. Кроме того, его используют как лечебное средство при скрежетании зубами (бруксизме) и увеличении жевательной мышцы (массетера), выраженных тяжах на шее и **повышенной потливости** (гипергидрозе).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Мимические морщины формируются с годами из-за многократного сокращения одних и тех же мышц и снижения эластичности кожи. Эффект **временный**: мышца постепенно восстанавливает свою функцию, и если процедуру не повторять, внешний вид медленно возвращается к исходному. Цель — **естественный, отдохнувший** вид без «застывшей» мимики.

2 Как выполняется процедура?

Процедура проводится в клинике после короткой консультации и осмотра. Оценивается ваша мимика, размечаются точки введения и при необходимости перед процедурой делаются фотографии.

1. **Подготовка:** Снимается макияж, кожа обрабатывается антисептическим раствором. Если вы чувствительны к боли, можно приложить лёд или нанести обезболивающий крем.
2. **Введение:** Очень тонкой иглой в размеченные точки вводится небольшое количество препарата. Каждый укол длится несколько секунд; ощущается лёгкое покалывание или жжение.
3. **Завершение:** На места уколов слегка надавливают. Небольшие волдыри исчезают в течение нескольких минут.
4. **Запись:** Название препарата, номер серии (LOT), общее количество единиц и зоны введения записываются в вашу медицинскую карту.

Некоторые зоны и цели введения могут не входить в утверждённую в Турции инструкцию по применению препарата (**применение вне инструкции, офф-лейбл**); например, введение в массетер (жевательную мышцу) и при бруксизме, в шею и при потливости ладоней не относится к утверждённым показаниям многих препаратов. Хотя такое применение широко распространено и признано в медицинской литературе, ваш врач отдельно объяснит, относится ли запланированная для вас зона к этой категории, и это будет отмечено в соответствующем поле настоящей формы.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Обычно не требуется; по желанию — лёд или обезболивающий крем	Около 10–20 минут	В тот же день; после процедуры — наблюдение в течение 15–30 минут

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Смягчение мимических морщин на лбу, в межбровье и вокруг глаз, более отдохнувший вид
- При введении в массетер — уменьшение симптомов бруксизма и более изящная линия нижней челюсти
- При лечении потливости — выраженное уменьшение потоотделения
- Короткая процедура без хирургических разрезов, после которой можно сразу вернуться к повседневной жизни

Эффект обычно начинает проявляться через **3–14 дней**, достигает максимума примерно через 2 недели и в мимических зонах сохраняется в среднем **3–4 месяца** (при лечении потливости и введении в массетер может длиться дольше). Выраженность и продолжительность эффекта индивидуальны. Очень глубокие, устоявшиеся морщины могут не исчезнуть полностью. При необходимости примерно через 2 недели назначается контрольный осмотр, и если врач сочтёт это целесообразным, может быть проведена небольшая дополнительная коррекция.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от процедуры:** Поскольку это эстетическая процедура, у вас всегда есть возможность от неё отказаться.
- **Филлеры:** Могут быть более подходящими для морщин, вызванных не движением, а потерей объёма.
- **Уход за кожей и методы омоложения кожи:** Кремы с ретиноидами, химические пилинги, лазер или мезотерапия могут улучшить качество кожи, но не уменьшают подвижность мимических мышц.
- **Хирургические методы:** При наличии птоза тканей более долговременное решение могут дать такие операции, как подъём бровей или подтяжка лица.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **При медицинских показаниях:** Ночная капа при бруксизме; антиперспиранты и лекарственные препараты при потливости.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если процедура не проводится, ваш нынешний внешний вид или жалобы будут развиваться естественным путём. С возрастом мимические морщины могут постепенно становиться заметнее; это не представляет опасности для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Процедура **не проводится или откладывается** в следующих случаях: беременность, кормление грудью, нервно-мышечные заболевания, такие как **миастения гравис**, БАС или синдром Ламберта–Итона, активная инфекция в зоне введения, известная аллергия на препарат, а для некоторых препаратов — аллергия на белок коровьего молока. Пожалуйста, обязательно сообщите нам, если что-либо из этого относится к вам.
- **Антибиотики группы аминогликозидов** (например, гентамицин) и некоторые миорелаксанты могут усиливать действие ботулинотоксина; если вы их принимаете, сообщите нам.
- Если вам ранее вводили ботулинотоксин, сообщите, когда, какой препарат и каким был результат.
- Чтобы снизить риск синяков, по возможности, посоветовавшись с врачом, сделайте перерыв в приёме аспирина и подобных препаратов за несколько дней до процедуры.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 4 часа	Не ложитесь, не массируйте и не надавливайте на обработанную зону. Это помогает препарату оставаться там, куда он был введён. В местах уколов могут быть лёгкое покраснение и небольшие припухлости.
Первый день	Избегайте интенсивных физических нагрузок, сауны, турецкой бани (хаммама), солярия и очень жарких помещений. Макияж можно наносить через несколько часов. Возможна лёгкая головная боль; она проходит после приёма простых обезболивающих.
3–14-й день	Эффект проявляется постепенно. Небольшие синяки в местах уколов, **если они появятся**, проходят в течение недели. В этот период не делайте косметических процедур для лица, процедур на коже и массажа лица.
2-я неделя	

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Эффект достигает максимума. При необходимости проводится контрольный осмотр; при асимметрии или недостаточном эффекте после оценки врача может быть запланирована небольшая дополнительная коррекция.
3–4-й месяц и далее	Эффект постепенно ослабевает. Между повторными процедурами обычно рекомендуется интервал не менее 3 месяцев.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Лёгкая боль, покраснение и небольшие припухлости в местах уколов (проходят в течение от нескольких минут до нескольких часов)
- Небольшие синяки; **если они появятся**, проходят в течение от нескольких дней до недели
- Лёгкое ощущение тяжести или стянутости в области лба (первые 1–2 недели)

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Головная боль** — Особенно после первой процедуры примерно у **1–10 из 100** пациентов в первые дни бывает лёгкая головная боль; обычно она проходит в течение нескольких дней.
- **Лёгкая асимметрия или недостаточный эффект** — Поскольку сила мышц у всех разная, между сторонами может сохраняться небольшая разница или эффект может оказаться слабее ожидаемого. Это оценивается на контрольном осмотре через 2 недели.
- **Чрезмерно приподнятый наружный край брови («бровь Спока»)** — После введения в лоб наружный конец брови может подняться слишком сильно; обычно это исправляется небольшой дополнительной инъекцией.

Нечастые состояния

- **Опущение верхнего века (птоз)** — После введения в межбровье или лоб примерно у **1–5 из 100** пациентов может возникнуть лёгкое опущение верхнего века. Оно **временное** и обычно проходит в течение 2–6 недель. В этот период могут быть назначены глазные капли, которые временно приподнимают веко и улучшают внешний вид.
- **Опущение брови и тяжесть в области лба** — Связаны с чрезмерным расслаблением лобной мышцы; проходят по мере ослабления эффекта (от нескольких недель до нескольких месяцев).
- **Асимметричная улыбка, слабость движений губ, подтекание слюны** — Могут возникать при введении в нижнюю часть лица и массетер, если препарат воздействует на соседние мышцы; явление временное, но может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
- **Сухость глаз, слезотечение или двоение в глазах** — Встречаются нечасто при введении вокруг глаз; временные. Если появится двоение в глазах, сообщите врачу.
- **Затруднённое глотание, слабость мышц шеи** — Могут возникать при введении в шею; обычно лёгкие и временные.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Снижение силы жевания, впалый вид щёк** — После введения в массетер жевание твёрдой пищи какое-то время может вызывать усталость; очень редко щека может выглядеть слегка впалой или улыбка — неровной.
- **Слабость кисти после введения в ладони** — После инъекций в ладони при потливости сила захвата пальцами может временно снизиться, а сами инъекции могут быть довольно болезненными. Слабость обычно проходит в течение нескольких недель.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Распространение действия на отдалённые области** — Очень редко, особенно при высоких дозах, действие препарата может распространиться за пределы зоны введения, вызывая общую мышечную слабость, нечёткость зрения или **затруднение речи, глотания или дыхания**. Это требует **неотложного лечения**; может понадобиться госпитализация и поддержка дыхания. При дозах, применяемых в эстетических целях, это встречается крайне редко.
- **Тяжёлая аллергическая реакция** — Тяжёлая аллергическая реакция (анафилаксия) с крапивницей, отёком лица и губ или одышкой встречается крайне редко; она требует неотложной помощи.
- **Потеря эффекта (образование антител)** — Очень редко организм вырабатывает антитела к препарату, и последующие процедуры могут оказаться неэффективными. Частые процедуры с высокими дозами повышают этот риск.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Предобморочное состояние (вазовагальная реакция):** Во время инъекции или забора крови могут возникнуть головокружение, потливость и кратковременный обморок; это быстро проходит, если лечь.
- **Инфекция:** При обработке кожи антисептиком и использовании стерильных материалов риск очень низкий; если инфекция всё же возникает, её обычно лечат антибиотиками.
- **Аллергическая реакция:** На используемый препарат, местный анестетик или антисептик — от лёгкого покраснения до, очень редко, тяжёлой аллергической реакции (анафилаксии). Наша клиника оснащена оборудованием и лекарствами для оказания неотложной помощи.
- **Обострение герпеса («простуды» на губах):** Если у вас раньше бывал герпес, он может снова появиться в обработанной области; пожалуйста, сообщите нам об этом.
- **Результат, не соответствующий ожиданиям:** Степень и продолжительность эффекта у разных людей различаются; могут потребоваться дополнительные сеансы или коррекция.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Затруднение глотания, речи или дыхания**, выраженная мышечная слабость
- **Нечёткость зрения или двоение в глазах**, полная невозможность открыть веко
- Быстро нарастающий отёк лица, губ или языка, крапивница или одышка (аллергическая реакция)
- Нарастающие боль, покраснение, жар или гнойные выделения в зоне введения

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 4 часа не ложитесь и не массируйте зону введения; в первый день избегайте интенсивных физических нагрузок, сауны и турецкой бани (хаммама).
- Пока сохраняется эффект, если вы собираетесь делать инъекции ботулинотоксина, массаж лица или процедуры на коже у другого врача, сообщите ему об этой процедуре.
- Если вы планируете беременность в период лечения, посоветуйтесь с врачом.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

12 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Меня расспросили о состояниях, препятствующих проведению процедуры (беременность, кормление грудью, нервно-мышечные заболевания, лекарственные препараты), и я предоставил(а) достоверную информацию.
- ☐ Я понимаю, что эффект ботулинотоксина временный и что для его поддержания процедуру необходимо регулярно повторять. Мне объяснили, что некоторые зоны введения могут выходить за рамки утверждённой инструкции по применению препарата.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.