Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Эндоларингеальная микрохирургия

Микрохирургия голосовых складок / гортани (микроларингоскопия)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Образование / предварительный диагноз: _____

Сторона:
☐ Правая голосовая складка ☐ Левая голосовая складка
☐ С обеих сторон ☐ Другая область гортани _____

Планируемая методика:
☐ Холодные инструменты ☐ CO2-лазер
☐ Будет определена хирургом во время операции

Биопсия / патогистологическое исследование:
☐ Планируется ☐ Если будет сочтено необходимым
☐ Не планируется _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Гортань расположена в передней части шеи. Она образует голос, защищает дыхательные пути и закрывает вход в трахею во время глотания. Голосовые складки (голосовые связки) — это две тонкие структуры внутри гортани, которые вибрируют и создают звук.

На голосовых складках или в другом отделе гортани могут возникать образования, такие как **узелки, полипы, кисты, отёк Рейнке, папилломы или лейкоплакия (белые бляшки)**, либо образование, вызывающее подозрение на рак. Они могут вызывать осиплость, быструю утомляемость голоса, ощущение кома в горле и, в редких случаях, затруднение дыхания. К причинам относятся неправильное или чрезмерное использование голоса, курение, рефлюкс, инфекции (например, ВПЧ), а иногда и неизвестные факторы.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Цель операции — удалить образование, максимально сохранив здоровую ткань голосовых складок, **улучшить ваш голос**, при необходимости расширить дыхательные пути и **установить точный диагноз с помощью патогистологического исследования** удалённой ткани.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общим наркозом в условиях операционной через рот; разрез на шее не делается.

1. **Доступ к гортани:** После того как вы уснёте, через рот вводят металлическую трубку (ларингоскоп) и проводят её к гортани. Ваши зубы защищают специальной капой.
2. **Осмотр под микроскопом:** Голосовые складки рассматривают в увеличении с помощью операционного микроскопа или эндоскопа и подробно изучают. На этом этапе могут быть выявлены дополнительные изменения, которые не были видны при осмотре в кабинете врача.
3. **Удаление образования:** Образование удаляют очень тонкими микрохирургическими инструментами или CO2-лазером, максимально сохраняя вибрирующую поверхность голосовой складки. При необходимости берут только небольшой кусочек ткани для диагностики (биопсию).
4. **Дополнительные действия:** В зависимости от ситуации для остановки кровотечения могут использоваться небольшие тампоны с лекарством, а для уменьшения рубцевания в голосовую складку может быть введено лекарство.
5. **Завершение:** Ларингоскоп извлекают, проверяют состояние полости рта и зубов. На шее нет ни швов, ни видимых рубцов.

Очень редко из-за ограниченного открывания рта, особенностей зубов или анатомии челюсти или шеи безопасный доступ к гортани может оказаться невозможным. В этом случае процедура может быть прекращена, и вам объяснят альтернативные методы.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз	Около 20–60 минут	Обычно выписка в тот же день или одна ночь в больнице

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Уменьшение осиплости, более чистый и менее утомляемый голос
- Установление **точного диагноза** с помощью патогистологического исследования удалённой ткани, чтобы заболевание, выявленное на ранней стадии, можно было своевременно лечить
- Облегчение дыхания, если образование сужает дыхательные пути

При доброкачественных образованиях, таких как узелки, полипы и кисты, голос значительно улучшается у большинства пациентов. Однако результат зависит от вида и размера образования, исходного состояния голосовых складок, таких факторов, как курение и рефлюкс, а также от того, насколько тщательно после операции соблюдаются **голосовой покой и рекомендации по голосовой терапии**. Некоторые заболевания, например папилломы, могут рецидивировать и потребовать более одной операции.

4 Другие варианты лечения

- **Голосовая терапия (с логопедом-фониатром):** Может быть методом первого выбора, особенно при узелках голосовых складок, и часто делает операцию ненужной.
- **Медикаментозное лечение:** Если причиной являются рефлюкс или воспаление, могут помочь препараты, снижающие кислотность желудка или уменьшающие воспаление.
- **Отказ от курения и правильный уход за голосом:** Способствует уменьшению некоторых образований (например, отёка Рейнке).
- **Амбулаторная процедура под местной анестезией:** При правильно отобранных небольших образованиях или для биопсии процедуру можно провести, пока вы бодрствуете, с помощью эндоскопа, введённого через нос или рот; это подходит не для любого образования.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Тщательное наблюдение:** Небольшие образования без подозрения на рак можно наблюдать с помощью регулярных осмотров.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, осиплость может сохраняться или усиливаться. Поскольку точная природа образования неизвестна, диагностика лежащего в его основе серьёзного заболевания (например, рака на ранней стадии или образования, которое может перерасти в рак) может, хотя и редко, задержаться. Растущие образования в редких случаях могут вызвать затруднение дыхания.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови, и вас осмотрит анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (следуйте указаниям анестезиолога).
- Обязательно сообщите нам о **шатающихся зубах, коронках, мостах, имплантах или съёмных протезах**; съёмные протезы снимают перед операцией.
- Если вам рекомендовано лечение рефлюкса, вас могут попросить начать его до операции.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24–48 часов	Возможны боль или жжение в горле, лёгкий дискомфорт при глотании, осиплость и небольшое количество мокроты с примесью крови. Вы можете заметить онемение языка, изменение вкуса или боль в челюсти; обычно это проходит в течение нескольких дней.
1-я неделя	Обычно врач рекомендует **полный голосовой покой в течение 3–7 дней** (не разговаривать, не шептать), а затем постепенное возвращение к использованию голоса. Большинство людей могут вернуться к сидячей работе через 2–3 дня; людям, профессионально использующим голос (учителям, певцам, сотрудникам колл-центров), следует подождать дольше.
2–4-я недели	Голос постепенно восстанавливается. При необходимости начинается голосовая терапия. Избегайте крика, пения и длительных разговоров. Результат патогистологического исследования обычно готов в этот период и будет обсуждён с вами.
1–3-й месяцы	

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Заживление голосовых складок завершается; окончательный голос обычно формируется в течение **6–12 недель**. На контрольном визите голосовые складки осматривают с помощью эндоскопа.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Боль в горле и лёгкий дискомфорт при глотании (несколько дней)
- Временная осиплость или изменение высоты голоса после операции
- Небольшое количество мокроты с примесью крови (первые 1–2 дня)
- Чувствительность челюсти, губ или зубов; небольшие трещины в уголках рта

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Онемение языка и изменение вкуса** — Вызвано давлением ларингоскопа на язык; возникает примерно у **5–15 из 100** пациентов и обычно проходит в течение от нескольких дней до нескольких недель, очень редко сохраняется несколько месяцев.
- **Боль в височно-нижнечелюстном суставе** — Вызвана длительным пребыванием рта в открытом положении; обычно проходит через несколько дней. У людей с уже имеющимися проблемами височно-нижнечелюстного сустава она может возникать чаще и длиться дольше.
- **Голос улучшается меньше, чем ожидалось** — Голос после операции не всегда полностью возвращается к норме; может потребоваться голосовая терапия или дополнительное лечение.

Нечастые состояния

- **Повреждение зубов** — Несмотря на использование защитной капы, примерно у **1–5 из 100** пациентов возможны скол, трещина или расшатывание зуба либо повреждение коронки/моста. Риск выше при шатающихся, кариозных или искусственных зубах; может потребоваться стоматологическое лечение.
- **Ухудшение голоса или стойкое изменение голоса** — Если на поверхности голосовой складки образуется рубцовая ткань, голос может стать более осиплым, слабым или быстрее утомляться, чем до операции. Это может потребовать голосовой терапии, а иногда и дополнительных операций; в редких случаях изменение может быть стойким.
- **Рецидив образования** — Образование может появиться снова, особенно если продолжается неправильное использование голоса или курение, а также при таких заболеваниях, как папилломы; может потребоваться повторная операция.
- **Образование спайки (мембраны) в передней части голосовых складок** — Если вмешательство проводится на обеих голосовых складках вблизи их переднего отдела, они могут срастись между собой; это может ухудшить качество голоса, и для их разделения может потребоваться повторная операция.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Дополнительное лечение в зависимости от результата патогистологического исследования** — Результат патогистологического исследования может отличаться от ожидаемого (например, образование со склонностью к перерождению в рак или рак). В этом случае может потребоваться дополнительная операция, лучевая терапия или тщательное наблюдение; это будет подробно объяснено вам.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Отёк гортани и затруднение дыхания** — После операции может развиться отёк гортани. Обычно он проходит при лечении лекарствами; очень редко может потребоваться наблюдение в отделении интенсивной терапии или временное отверстие на шее для обеспечения проходимости дыхательных путей (трахеостомия).
- **Кровотечение** — Значительное кровотечение бывает редко. Из-за риска попадания крови в дыхательные пути серьёзное кровотечение может потребовать срочного вмешательства и повторного взятия в операционную.
- **Риски, связанные с лазером** — При использовании CO2-лазера существует риск ожога окружающих тканей и, очень редко, возгорания дыхательной трубки (возгорание в дыхательных путях). Применяются специальные меры безопасности при работе с лазером (специальная трубка, влажные тампоны, защита глаз). Если бы это произошло, это могло бы вызвать тяжёлый ожог дыхательных путей и потребовать длительного лечения в отделении интенсивной терапии и трахеостомии.
- **Травма полости рта, языка, губ или глотки** — Небольшие травмы от инструментов обычно заживают сами; очень редко может потребоваться наложение швов. Крайне редко разрыв стенки глотки может привести к проникновению воздуха под кожу шеи (ощущение хруста) или к инфекции шеи; это может потребовать наблюдения в больнице, внутривенного введения антибиотиков и, в редких случаях, операции.
- **Проблемы с шеей** — Поскольку голову запрокидывают назад, может возникнуть боль в шее — особенно у людей с заболеваниями шейного отдела позвоночника — и, очень редко, более серьёзные проблемы с позвоночником. Пожалуйста, сообщите нам, если у вас была грыжа межпозвонкового диска в шейном отделе или операция на шее.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Одышка** или свистящий либо грубый шум при вдохе (стридор)
- **Откашливание крови или рвота кровью** либо увеличение, а не уменьшение количества мокроты с кровью
- **Невозможность глотать** или настолько сильная боль либо отёк, что вы не можете проглотить слюну
- **Температура выше 38,5 °C** вместе с болью в горле, которая продолжает усиливаться
- Отёк шеи или лица либо ощущение хруста под кожей

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Строго соблюдайте рекомендованный **голосовой покой**; шёпот тоже напрягает голосовые складки. Общаться можно письменно или с помощью приложений в телефоне.
- Пейте много воды и поддерживайте влажность воздуха в комнате. По возможности избегайте откашливания и кашля.
- Не курите и избегайте табачного дыма; курение и нарушает заживление, и повышает риск рецидива образования.
- Если вам назначены препараты от рефлюкса, принимайте их в течение рекомендованного срока; не ешьте в течение 2–3 часов перед сном и ограничьте острую и кислую пищу.
- Авиаперелёт обычно безопасен уже на следующий день; во время поездки продолжайте соблюдать голосовой покой.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**,

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что если во время операции выяснится, что безопасный доступ к гортани невозможен, процедура может быть прекращена, и что в зависимости от результата патогистологического исследования удалённой ткани может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.
- ☐ Я понимаю, что окончательный голос зависит также от того, буду ли я после операции соблюдать голосовой покой и рекомендации по голосовой терапии, откажусь ли от курения и буду ли лечить рефлюкс.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.