Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Субментальная липосакция

Удаление жира под подбородком (липосакция второго подбородка)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Планируемая методика:
- ☐ Классическая (тумесцентная)
- ☐ С применением энергии (лазер/РЧ)
- ☐ Будет определена хирургом

Анестезия:
- ☐ Местная анестезия ☐ Местная анестезия + седация
- ☐ Общий наркоз _____

Вмешательства, выполняемые одновременно:
- ☐ Нет ☐ С отдельной формой согласия: _____

Жалобы и ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Жир, скапливающийся под подбородком («второй подбородок»), может сглаживать угол между подбородком и шеей, из-за чего линия челюсти выглядит менее чёткой, усталой или более полной, чем на самом деле. Жировые отложения в этой области часто обусловлены **генетической предрасположенностью** и могут не исчезать полностью даже при снижении веса или физических упражнениях. Возрастная потеря эластичности кожи также делает их более заметными.

Субментальная липосакция — это удаление **подкожного жира** путём отсасывания через тонкие канюли. Цель — сделать линию челюсти более чёткой и получить **естественный, гармоничный угол между подбородком и шеей**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Важнейший фактор, определяющий результат, — **качество и эластичность кожи**. Эластичная кожа после удаления жира подстраивается под новый контур; кожа с низкой эластичностью может выглядеть более дряблой. Глубокий жир под мышцей шеи (платизмой), крупные слюнные железы, выраженные тяжи шейной мышцы и сильная дряблость кожи не поддаются коррекции липосакцией; в этих случаях могут потребоваться другие методы, например глубокая подтяжка шеи.

2 Как выполняется процедура?

Перед операцией осматривают область подбородка и шеи, оценивают эластичность кожи, выполняют фотографирование и размечают обрабатываемую зону в положении сидя.

1. **Обезболивание и введение раствора:** В зону вводят специальный раствор (тумесцентный раствор), содержащий местный анестетик и препарат, уменьшающий кровотечение. Этот раствор предотвращает боль, а также уменьшает кровоточивость и образование синяков.
2. **Небольшие разрезы:** В естественной складке под подбородком и при необходимости за мочками ушей делают небольшие входные проколы размером около **3–5 мм**.
3. **Удаление жира:** Жир аккуратно и равномерно отсасывают через тонкие канюли (металлические трубки). Под кожей оставляют тонкий слой жира, чтобы поверхность оставалась ровной.
4. **Воздействие энергией (если запланировано):** С помощью лазерной или радиочастотной энергии жир размягчают и в определённой степени способствуют подтягиванию кожи. Это может способствовать подтягиванию кожи, но не устраняет выраженную дряблость.
5. **Завершение операции и компрессионное бельё:** Входные проколы закрывают одним швом или оставляют заживать самостоятельно. В конце операции на область подбородка и шеи надевают **эластичное компрессионное изделие (бандаж для подбородка)**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Местная анестезия, местная анестезия + седация или общий наркоз	Около 45–90 минут (если выполняется отдельно)	Обычно выписка в тот же день

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Уменьшение избытка жира под подбородком
- Более чёткая линия челюсти и угол между подбородком и шеей; более гармоничный профиль лица
- **Долговременный** результат при условии стабильного веса, поскольку удалённые жировые клетки не восстанавливаются (естественные возрастные изменения кожи и тканей будут продолжаться)

Большинство пациентов с хорошей эластичностью кожи довольны результатом. Результат проявляется в течение **3–6 месяцев** по мере спадания отёка. Примерно **3–5 из 100** пациентов может потребоваться небольшая корректирующая процедура из-за неровностей, остаточного жира или асимметрии. Значительная прибавка в весе и старение со временем могут повлиять на результат.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от процедуры:** Поскольку это эстетическое вмешательство, у вас всегда есть возможность от него отказаться.
- **Снижение веса и изменение образа жизни:** Уменьшают общее количество жира в организме, но не всегда устраняют стойкий жир под подбородком.
- **Инъекции, растворяющие жир (например, дезоксихолевая кислота):** Требуют нескольких сеансов, могут вызывать выраженный отёк и боль и дают более ограниченный эффект.
- **Криолиполиз (уменьшение жира охлаждением) и аппаратные методы:** Не являются хирургическими, но требуют нескольких сеансов и дают более ограниченный эффект.
- **Глубокая подтяжка шеи / операция по подтяжке шеи:** Более подходящий вариант при выраженной дряблости кожи, тяжах шейной мышцы или глубоком жире под мышцей.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если процедуру не проводить, вид области под подбородком останется прежним и может усилиться с возрастом или при прибавке в весе. Это не представляет опасности для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови; если планируется седация или общий наркоз, вас осмотрит анестезиолог, и перед операцией нужно будет соблюдать голод.
- Желательно, чтобы перед процедурой ваш вес был стабильным; если в ближайшее время вы планируете значительно изменить вес, обсудите это с врачом.
- В день операции не наносите крем или макияж на лицо и шею; наденьте удобную одежду с застёжкой спереди, а не с высоким воротом.
- После седации или общего наркоза нельзя садиться за руль; пожалуйста, возвращайтесь домой с сопровождающим.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	Под подбородком будут отёк, стянутость и лёгкая боль, а из входных проколов может подтекать немного розоватой жидкости; это нормально. Синяки, **если они появляются**, могут распространяться вниз по шее и проходят в течение 1–2 недель. Спите с приподнятой головой и носите компрессионное изделие постоянно.
1-я неделя	Компрессионное изделие обычно носят **днём и ночью в течение первой недели**, а затем **по ночам ещё 2–3 недели**. Швы, если они есть, снимают на 5–7-й день. Большинство пациентов возвращаются к сидячей работе и общественной жизни в течение 3–7 дней.
2–6-я недели	Отёк в основном спадает. В этой зоне могут ощущаться уплотнение, небольшие узелки и онемение; со временем они смягчаются. К интенсивным физическим нагрузкам обычно можно вернуться через **2–3 недели**. Если рекомендовано, мягко массируйте эту область.
3–6-й месяцы	Оставшиеся отёк и уплотнение проходят, кожа подстраивается под новый контур, и результат становится отчётливым.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Отёк, стянутость и лёгкая боль под подбородком и на шее; синяки, **если они появляются**, проходят в течение 1–2 недель
- Подтекание розоватой жидкости из входных проколов в первые 24–48 часов
- Временное онемение и снижение чувствительности в этой зоне
- Лёгкое уплотнение и небольшие прощупываемые узелки, сохраняющиеся несколько недель

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Длительное уплотнение и узелки (фиброз)** — Уплотнение и бугристость под кожей часто встречаются в процессе заживления; в большинстве случаев они смягчаются в течение нескольких месяцев благодаря массажу и со временем.
- **Длительное онемение** — Снижение чувствительности кожи под подбородком может сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев; очень редко оно бывает стойким.
- **Небольшая асимметрия** — Поскольку две половины лица никогда не бывают идеально симметричными, небольшие различия могут сохраниться.

Нечастые состояния

- **Неровность контура и впадины** — Примерно у **2–5 из 100** пациентов могут появиться волнистость, вмятины или остаточные жировые отложения. Если удалено слишком много жира, под подбородком может появиться впалый или «скелетированный» вид, а тяжи шейной мышцы могут стать более заметными. Для коррекции может потребоваться введение жира, повторная липосакция или другая процедура.
- **Дряблость кожи или недостаточное подтягивание** — Особенно у людей со сниженной эластичностью кожи после удаления жира кожа может подтянуться недостаточно, и дряблость может стать более заметной. В этом случае в будущем может потребоваться подтяжка шеи.
- **Асимметрия улыбки (воздействие на ветвь нерва нижней губы)** — Тонкая ветвь нерва, проходящая вдоль края нижней челюсти и двигающая нижнюю губу, может пострадать от отёка или давления, что вызывает асимметрию нижней губы при улыбке. Это происходит примерно у **1 из 100** пациентов и почти всегда проходит самостоятельно **в течение от нескольких недель до нескольких месяцев**; стойкая слабость бывает очень редко.
- **Скопление крови или жидкости (гематома, серома)** — Возникает **менее чем у 1 из 100** пациентов. Небольшие скопления рассасываются сами; более крупные может потребоваться удалить иглой или с помощью небольшой процедуры.
- **Инфекция** — Возникает **менее чем у 1 из 100** пациентов; обычно проходит при лечении антибиотиками, в редких случаях может потребоваться вскрытие абсцесса.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Рубцы или изменение цвета кожи в местах проколов** — Маленькие рубцы от проколов обычно становятся незаметными; в редких случаях может остаться потемнение, утолщение или небольшая вмятина.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Ожог кожи (при методах с применением энергии)** — При использовании лазера или радиочастотной энергии, несмотря на меры безопасности, в редких случаях возможны ожог кожи, пузыри и стойкие рубцы; может потребоваться уход за раной и лечение рубцов.
- **Повреждение кожи или потеря ткани** — Очень редко, особенно у курящих, нарушение кровоснабжения кожи может привести к образованию раны и рубцов.
- **Стойкое повреждение нерва** — Стойкая слабость движений нижней губы бывает крайне редко; если она возникает, может потребоваться дополнительное лечение.
- **Реакция на местный анестетик** — Возможна аллергия на местный анестетик, а его высокая концентрация в крови может вызвать головокружение, звон в ушах, металлический привкус во рту и, очень редко, судороги или нарушение сердечного ритма. Дозы поддерживаются в безопасных пределах.
- **Жировая эмболия и повреждение глубоких структур или дыхательных путей** — Попадание капель жира в кровоток или повреждение канюлей глубоких структур при субментальной липосакции небольшого объёма — это **крайне редкое** явление; если бы это произошло, могло бы потребоваться экстренное лечение в больнице и в отделении интенсивной терапии.
- **Психологическая неудовлетворённость** — Несмотря на технически успешный результат, человеку может быть трудно привыкнуть к своему новому виду. Открытое обсуждение ожиданий до операции снижает этот риск.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Быстро нарастающий, плотный, напряжённый отёк** шеи, особенно с одной стороны
- **Затруднение дыхания или глотания** либо изменение голоса
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающая боль, покраснение, ощущение жара или выделения с неприятным запахом
- Побеление, тёмно-фиолетовый или чёрный цвет кожи; пузыри, наполненные жидкостью
- Боль в груди, одышка или спутанность сознания

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Регулярно носите компрессионное изделие в течение рекомендованного срока; следите, чтобы оно не было ни слишком тугим, ни слишком свободным.
- В первые 1–2 недели спите на спине с приподнятой головой; избегайте резкого или чрезмерного вытягивания шеи.
- В первые 2–3 недели избегайте интенсивных физических нагрузок, сауны, турецкой бани (хаммама) и длительного горячего душа.
- В первые месяцы защищайте эту зону от солнца; это снижает риск образования рубцов и изменения цвета кожи.
- Чтобы сохранить результат, старайтесь поддерживать стабильный вес.
- Если вы приехали из-за рубежа, авиаперелёт обычно безопасен начиная со 2–3-го дня.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что результат зависит от эластичности моей кожи и что липосакция не устраняет дряблость кожи, тяжи шейной мышцы и глубокий жир под мышцей.
- ☐ Я понимаю, что ношение компрессионного изделия и соблюдение данных мне рекомендаций напрямую повлияют на результат.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.