Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Ринопластика

Эстетическая операция на носу (при необходимости — в сочетании с восстановлением носового дыхания)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Планируемая техника: ☐ Открытая техника ☐ Закрытая техника ☐ Будет определена хирургом во время операции

Процедуры, выполняемые одновременно: ☐ Септопластика ☐ Уменьшение носовых раковин ☐ Нет _____

Источник хрящевого трансплантата: ☐ Из полости носа (перегородка) ☐ Ухо ☐ Ребро ☐ Не ожидается, что потребуется _____

Жалобы и ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Ринопластика — это операция по изменению внешней формы носа (спинки, горбинки, кончика, ширины носа, ноздрей и его гармонии с лицом). Если у вас есть искривление центральной стенки носа, затрудняющее дыхание (искривление носовой перегородки), западение боковых стенок носа или увеличенные носовые раковины, их можно исправить в ходе той же операции.

Форма носа определяется врождёнными особенностями, изменениями в период роста или перенесёнными травмами (ударом, переломом). Эти структуры сами по себе не меняются. Цель операции — достичь **реалистичных целей**, которые мы определим вместе, и получить нос, который выглядит **естественно, гармонирует с вашим лицом и позволяет свободно дышать**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общей анестезией в операционной. Перед операцией ваш нос осматривают и фотографируют, и план составляется вместе с вами.

1. **Разрез:** При закрытой технике все разрезы находятся внутри носа, и снаружи рубца не видно. При открытой технике дополнительно делается небольшой разрез длиной около 4–5 мм на тонкой кожной перемычке между ноздрями (колумелле); со временем этот рубец обычно становится малозаметным.
2. **Изменение формы каркаса носа:** Кожу и мягкие ткани бережно отслаивают. Если есть горбинка, её уменьшают за счёт кости и хряща или исправляют с помощью техник, сохраняющих спинку носа. Хрящи кончика носа моделируют с помощью швов.
3. **Сужение/выпрямление костей (остеотомия):** Если необходимо сузить или выпрямить широкие или искривлённые носовые кости, выполняют контролируемые костные распилы. Этот этап может повысить вероятность синяков и отёка.
4. **Опора и трансплантаты:** Чтобы нос долгосрочно сохранял форму, а дыхательные пути оставались свободными, при необходимости используют хрящевые опоры (трансплантаты). Хрящ в первую очередь берут из полости носа (из перегородки); если его недостаточно, может быть использован хрящ уха или ребра. Это обсуждается с вами до операции.
5. **Функциональная коррекция:** При необходимости выпрямляют центральную стенку носа (перегородку) и уменьшают носовые раковины.
6. **Ушивание и шина:** Разрезы закрывают тонкими швами. На спинку носа накладывают защитную шину; при необходимости в полость носа устанавливают мягкие силиконовые шины или тампоны, позволяющие дышать.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общая анестезия	Около 2–4 часов	Обычно одна ночь в больнице

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более естественная, сбалансированная форма носа, гармонирующая с вашим лицом
- Устранение заложенности носа (если она есть) и более свободное дыхание
- Помощь в том, чтобы вы чувствовали себя увереннее

Большинство пациентов довольны результатом. Однако нос находится в центре лица и заживает долго; окончательный результат становится виден в течение **12–18 месяцев**. По данным публикаций, примерно **5–15%** пациентов может потребоваться небольшая или более обширная корригирующая операция (ревизия). Результат труднее предсказать при толстой коже, после предыдущих операций или тяжёлых травм носа.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции:** Поскольку это эстетическая процедура, у вас всегда есть возможность от неё отказаться.
- **Коррекция формы носа филлерами («безоперационная ринопластика»):** Может временно замаскировать небольшую горбинку или впадину; она не уменьшает нос, не улучшает дыхание и имеет собственные риски, например закупорку кровеносного сосуда.
- **Только функциональная операция (септопластика/уменьшение носовых раковин):** Если единственная проблема — дыхание, её можно выполнить без изменения внешней формы носа.
- **Медикаментозное лечение:** Назальные спреи могут помочь при заложенности, вызванной аллергией или отёком слизистой; структурные деформации они не исправляют.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, нынешняя форма вашего носа останется без изменений. Если у вас есть проблемы с дыханием, имеющие структурную причину (искривление, западение боковых стенок), они сами по себе не пройдут, но обычно не представляют срочной угрозы для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Если в последние 6–12 месяцев вы принимали **изотретиноин** (препарат от акне, например Роаккутан), обязательно сообщите нам; он может влиять на заживление кожи, и сроки операции могут быть спланированы с учётом этого.
- Перед операцией проводятся анализы крови и, при необходимости, другие обследования; вас также осмотрит врач-анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (пожалуйста, следуйте указаниям анестезиолога).
- В день операции не наносите макияж, лак для ногтей, не надевайте украшения и контактные линзы. Желательно, чтобы в первый день после операции рядом с вами был родственник или друг.
- Операция может быть отложена, если у вас есть активные высыпания акне или кожная инфекция на лице, грипп или инфекция верхних дыхательных путей.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	Заложенность носа, небольшие выделения, головная боль и отёк лица — это нормально. Боль обычно слабая или умеренная и снимается обезболивающими. Сон с приподнятой головой и холодные компрессы помогают уменьшить отёк. **Если** появляются синяки, они возникают вокруг глаз и проходят за 7–10 дней.
1-я неделя	Силиконовые шины/тампоны в носу (если они есть) обычно удаляют на 2–5-й день, а наружную шину и швы — примерно на **7-й день**. Вас попросят промывать полость носа физиологическим раствором. Большинство пациентов возвращаются к офисной работе и общественной жизни в течение 7–10 дней.
2–6-я недели	Бóльшая часть отёка спадает, но кончик носа ещё может ощущаться плотным и слегка онемевшим. Интенсивные физические нагрузки, контактные виды спорта и плавание следует отложить примерно на **4–6 недель**. Очки нельзя носить как минимум **6 недель**, если только их не закрепить пластырем так, чтобы они не давили на спинку носа.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3–12-й месяцы	Остаточный отёк, особенно в области кончика носа, постепенно уменьшается. В этот период форма носа продолжает меняться; небольшие неровности, заметные на раннем этапе, обычно исчезают.
12–18-й месяцы	Становится виден окончательный результат. Если корригирующая процедура (ревизия) будет сочтена необходимой, её обычно проводят не ранее чем через 12 месяцев.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Заложенность носа, небольшие выделения и выделения с примесью крови (в первые дни)
- Отёк лица и области вокруг глаз; **если** появляются синяки, они проходят в течение 1–2 недель
- Временное онемение кончика носа и передних зубов; плотность кончика носа
- Временное снижение обоняния (улучшается по мере спадания отёка)
- Продолжающееся в течение месяцев изменение формы носа

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Длительный отёк** — Особенно при толстой коже отёк кончика носа может сохраняться год или дольше. При необходимости можно помочь инъекциями кортикостероидов.
- **Лёгкая асимметрия и небольшие неровности** — Поскольку само лицо не бывает идеально симметричным, в носу могут оставаться небольшие различия; могут прощупываться небольшие костные/хрящевые выступы, которые обычно не видны.
- **Необходимость ревизии (коррекции)** — Примерно у **5–15 из 100** пациентов может потребоваться корригирующая процедура — от небольшой доработки до более обширной операции.
- **Корки и сухость в носу** — Часто встречаются в первые недели; проходят при регулярном промывании и увлажнении.

Нечастые состояния

- **Носовое кровотечение** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов может возникнуть кровотечение, требующее тампонады или вмешательства. Очень редко кровотечение приходится останавливать в операционной.
- **Инфекция** — Возникает **менее чем у 1 — до 3 из каждых 100** пациентов. Обычно проходит при лечении антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование очага инфекции или удаление трансплантата.
- **Дыхание улучшается не так, как ожидалось** — Заложенность носа может пройти не полностью или, в редких случаях, усилиться; может потребоваться дополнительное лечение или операция.
- **Отверстие в перегородке (перфорация)** — Отверстие в центральной стенке носа образуется примерно у **1 из 100** пациентов. Часто оно не вызывает никаких симптомов; если оно вызывает свист, образование корок или кровотечения, может потребоваться лечение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Скопление крови или гноя в перегородке (гематома / абсцесс)** — При вмешательстве на перегородке встречается **менее чем у 1 из 100** пациентов. Проявляется нарастающей заложенностью, болью и повышением температуры в дни после операции. Чтобы не допустить повреждения хряща носа, необходимо **срочное дренирование**; без лечения возможны потеря хряща и западение спинки носа («седловидный нос»), для исправления которых может потребоваться дополнительная операция.
- **Спайки в полости носа (синехии)** — Сращение тканей внутри носа; если они вызывают заложенность, их можно разделить с помощью простой процедуры.
- **Заметный рубец** — При открытой технике рубец на колумелле в редких случаях может оставаться заметным; если ноздри сужают, в складке крыла носа образуется тонкий рубец.
- **Длительное онемение** — Снижение чувствительности кончика носа или передних зубов может сохраняться несколько месяцев; в редких случаях оно может быть постоянным.
- **Проблемы, связанные с трансплантатом** — Со временем хрящевые трансплантаты могут сместиться, изогнуться, частично рассосаться или стать заметными через кожу. Если хрящ берут из уха или ребра, существует риск боли, рубца и кровотечения в этой области, а при заборе с ребра — очень редко повреждения оболочки лёгкого (пневмоторакс).

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Проблемы с кожей** — Истончение кожи, покраснение, мелкие видимые сосуды или избыточное образование рубцовой ткани при толстой коже. Очень редко, особенно у курящих и при ранее оперированном носе, нарушение кровоснабжения кожи может привести к образованию раны и потере ткани. В этом случае может потребоваться длительный уход за раной и реконструктивная операция, а также может остаться постоянный рубец или деформация.
- **Стойкое снижение или потеря обоняния** — Встречается очень редко.
- **Проблемы со слёзным каналом и кровоизлияние вокруг глаза** — Очень редко костные распилы могут привести к слезотечению или кровоизлиянию вокруг глаза.
- **Истечение спинномозговой жидкости (ликворея), менингит, потеря зрения** — Крайне редкие осложнения, встречающиеся **значительно реже чем в 1 случае из 10 000** и вызванные повреждением тонких костей, отделяющих нос от основания черепа и глаза. Если они возникают, может потребоваться дополнительное лечение в больнице (иногда в отделении интенсивной терапии) и операция; потеря зрения, если она произойдёт, может быть необратимой.
- **Синдром токсического шока** — Очень редкое, но тяжёлое инфекционное состояние, связанное с использованием носовых тампонов (внезапное повышение температуры, сыпь, низкое артериальное давление), требующее срочного лечения. Оно требует лечения в больнице, иногда в отделении интенсивной терапии, и может угрожать жизни.
- **Психологическая неудовлетворённость** — Несмотря на технически успешный результат, человеку может быть трудно привыкнуть к своей новой внешности. Открытое обсуждение ожиданий до операции снижает этот риск.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Носовое кровотечение, которое не останавливается или очень сильное**, несмотря на прижатие и лёд в течение нескольких минут
- **Нарастающая заложенность носа, сильная боль и отёк носа** в дни после операции (может быть признаком гематомы/абсцесса перегородки)
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающая боль, покраснение или выделения из носа с неприятным запахом
- **Внезапное повышение температуры, кожная сыпь, головокружение или слабость**, пока в носу стоят тампоны
- **Прозрачные водянистые выделения** из носа, особенно усиливающиеся при наклоне вперёд; или сильная головная боль и ригидность (скованность) мышц шеи
- **Нечёткое зрение или двоение в глазах**, либо быстро нарастающий отёк и боль вокруг глаза
- Удар по носу или внезапное изменение его формы
- Одышка или боль в груди

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Не сморкайтесь в первые 2 недели; если нужно чихнуть, чихайте с открытым ртом.
- Очищайте полость носа так, как вам показали, и с рекомендованной частотой.
- Как минимум 6 недель избегайте ударов по носу, не допускайте, чтобы очки опирались на спинку носа, и не спите лицом вниз.
- Защищайте кожу носа от солнца как минимум 3 месяца (солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, головной убор).
- Если вы приехали из-за рубежа, перелёт обычно безопасен после снятия шины (примерно на 7-й день).
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что сравнение моих фотографий до и после операции является частью оценки результата и что компьютерное моделирование или примеры фотографий служат лишь для того, чтобы дать представление, и не гарантируют результат.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.