Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Темпоральный лифтинг

Подтяжка наружной части брови и уголка глаза через височную область (латеральный лифтинг бровей)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Справа ☐ Слева ☐ С обеих сторон

Место разреза: ☐ В волосистой части головы (висок) ☐ По линии роста волос ☐ Будет определено во время операции _____

Способ фиксации: ☐ Нерассасывающиеся швы ☐ Рассасывающееся устройство ☐ Другое _____

Процедуры, выполняемые одновременно: ☐ Верхняя блефаропластика (отдельное согласие) ☐ Введение жира (липофилинг) ☐ Нет _____

Жалобы и ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

С возрастом ткани лба и височной области становятся менее упругими; в особенности опускаются **наружный конец брови** и **наружный уголок глаза**. Из-за этого взгляд может выглядеть усталым, грустным или тяжёлым, может создаваться впечатление избытка кожи верхнего века, появляются морщины в уголке глаза. У некоторых людей такая форма бывает и врождённой.

Темпоральный лифтинг — это операция, при которой через небольшие разрезы в волосистой части височной области **наружная часть брови и уголок глаза подтягиваются вверх и назад**. Её цель — получить **более свежий и открытый взгляд**, гармонирующий с вашим лицом. Сама по себе она не исправляет внутреннюю часть брови, весь лоб и избыток кожи век; при необходимости её сочетают с другими процедурами.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Операция обычно проводится в операционной под общим наркозом или под седацией в сочетании с местной анестезией. Перед операцией положение ваших бровей и уголков глаз оценивается в положении стоя и сидя, выполняется фотографирование, а направление подтяжки размечается вместе с вами.

1. **Разрез:** С каждой стороны в волосистой части виска или по линии роста волос делаются разрезы длиной около 3–5 см. Волосы не сбривают либо подравнивают лишь очень узкую полоску вдоль линии разреза.
2. **Освобождение тканей:** Хирург работает в глубоком слое височной области так, чтобы сохранить лобную ветвь лицевого нерва. Соединительные ткани вокруг наружной части брови и уголка глаза бережно освобождаются, чтобы их можно было сместить.
3. **Подтяжка и фиксация:** Освобождённые ткани подтягиваются вверх и назад в запланированном направлении и закрепляются к плотному тканевому слою виска **нерассасывающимися швами** или **рассасывающимися фиксирующими устройствами**. Проверяется симметрия обеих сторон.
4. **Ушивание:** При необходимости удаляется небольшой избыток кожи волосистой части головы. Разрезы закрываются скобами или швами, иногда устанавливается тонкий дренаж, накладывается лёгкая повязка на голову.

Если одновременно будет выполняться операция на верхних веках (блефаропластика) или другая процедура, на неё подписывается **отдельная форма информированного согласия**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз или седация + местная анестезия	Около 1–2 часов	Обычно выписка в тот же день или одна ночь в больнице

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более свежий, открытый и молодой взгляд благодаря подъёму наружной части брови и уголка глаза
- Уменьшение тяжести и видимого избытка кожи в наружной части верхнего века
- Отсутствие видимых рубцов на лице, так как разрезы скрыты в волосах

Большинство правильно отобранных пациентов довольны результатом. В первые недели брови могут выглядеть немного выше запланированного; по мере того как ткани занимают своё место, это смягчается. Окончательный результат виден через **3–6 месяцев**. Со временем под действием старения и силы тяжести подтянутые ткани могут несколько опуститься; продолжительность эффекта индивидуальна и обычно составляет **несколько лет**. Примерно у **5–10 из 100** пациентов может потребоваться коррекция из-за асимметрии или раннего ослабления подтяжки.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции:** Поскольку это эстетическая процедура, у вас всегда есть возможность от неё отказаться.
- **Подъём бровей ботулотоксином:** Может приподнять наружный конец брови на несколько миллиметров, временно (на 3–4 месяца).
- **Нитевой лифтинг:** Выполняется через меньшее количество разрезов, но эффект обычно более ограниченный и менее продолжительный.
- **Поддержка виска/брови филлерами:** Может дать временное улучшение, если опущение связано с потерей объёма; у этого метода есть собственные риски, например закупорка кровеносного сосуда.
- **Другие операции по подъёму бровей:** Если опущены также весь лоб и внутренняя часть брови, более подходящими могут быть эндоскопический лифтинг лба или методы с разрезом над бровью или по линии роста волос.
- **Только верхняя блефаропластика:** Может быть достаточной, если основная проблема — избыток кожи век; низкое положение брови она не исправляет.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операция не проводится, нынешний вид ваших бровей и уголков глаз сохранится, а естественное старение будет продолжаться. Это не представляет опасности для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводятся анализы крови и при необходимости другие обследования; если планируется общий наркоз, вас осмотрит анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции ничего не ешьте и не пейте (следуйте указаниям анестезиолога).
- Вымойте голову накануне вечером или утром в день операции; в день операции не пользуйтесь лаком для волос, гелем, косметикой и контактными линзами. Стричь волосы обычно не требуется.
- Если в последние **3–4 месяца** вам вводили ботулотоксин в область лба или бровей, сообщите об этом врачу; это может повлиять на планирование.
- Рекомендуется, чтобы в первые сутки после операции рядом с вами был кто-то из близких.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	Будут ощущаться стянутость, лёгкая головная боль и отёк в области висков и лба; боль обычно слабая и снимается обезболивающими. Отёк может спускаться к глазам; синяки, **если они появятся**, будут видны на веках. Сон с приподнятой головой и холодные компрессы помогают уменьшить отёк. Если был установлен дренаж, его обычно удаляют на следующий день.
1-я неделя	Мыть голову мягким шампунем обычно можно **со 2–3-го дня**. В этот период брови и уголки глаз могут выглядеть выше и напряжённее, чем запланировано. Большинство пациентов возвращаются к повседневной жизни и офисной работе в течение 5–7 дней.
7–14-й день	Снимаются скобы или швы. Онемение и зуд в области висков, а также чувствительность вдоль линии разреза могут сохраняться.
2–6-я неделя	Отёк в основном проходит, и взгляд становится более естественным. Интенсивных физических нагрузок и тугих повязок/шлемов, давящих на виски, следует избегать не менее **3–4 недель**, а окрашивания волос и подобных химических процедур — не менее **4–6 недель**; феном пользуйтесь в тёплом режиме.
3–6-й месяц	

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ткани занимают своё место, и становится виден окончательный результат. Изменения чувствительности кожи головы в основном восстанавливаются; рубец бледнеет.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Стянутость, ощущение давления и лёгкая головная боль в области висков и лба
- Отёк лба и области вокруг глаз; синяки, **если они появятся**, проходят в течение 1–2 недель
- В первые недели брови выглядят выше запланированного, или взгляд кажется удивлённым
- Онемение, зуд или покалывание в области висков и кожи головы
- Чувствительность и уплотнение вдоль линии разреза

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Лёгкая асимметрия** — Брови изначально не бывают идеально симметричными; после операции между сторонами может сохраниться или в процессе заживления появиться небольшая разница.
- **Поредение волос вдоль линии разреза** — Временное выпадение волос вокруг разреза (шоковое выпадение) встречается часто, и волосы обычно отрастают в течение **2–4 месяцев**. Разрез остаётся в виде тонкой линии, скрытой волосами.
- **Длительное онемение и зуд** — Изменение чувствительности кожи головы может сохраняться несколько месяцев; зуд в период заживления — это нормально.
- **Частичное ослабление подтяжки** — В первые месяцы ожидается некоторое опускание подтянутых тканей; поэтому во время операции может выполняться небольшая гиперкоррекция.

Нечастые состояния

- **Временная слабость при подъёме брови (лобная ветвь лицевого нерва)** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов может возникнуть временная слабость при подъёме брови или наморщивании лба с одной стороны. Обычно это связано с натяжением нерва или отёком и проходит самостоятельно в течение **от нескольких недель до нескольких месяцев**.
- **Стойкое выпадение волос или широкий рубец** — Вдоль линии разреза в редких случаях может образоваться участок без волос или расширенный рубец; особенно заметнее могут быть рубцы по линии роста волос. При необходимости их можно исправить коррекцией рубца или пересадкой волос.
- **Гематома (скопление крови)** — Примерно у **1–2 из 100** пациентов в области виска может скопиться кровь; может потребоваться её удаление иглой или с помощью небольшого вмешательства.
- **Инфекция** — Возникает **менее чем у 1 из 100** пациентов. Обычно проходит на фоне антибиотиков; в редких случаях требуется дренирование гноя или удаление фиксирующего шва.
- **Гиперкоррекция: «удивлённый» или чрезмерно раскосый («лисий взгляд», fox eye) вид** — Наружный конец брови или уголок глаза могут выглядеть поднятыми сильнее, чем хотелось бы. Обычно это смягчается в первые недели по мере того, как ткани занимают своё место; если это сохраняется, может потребоваться коррекция.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Раннее опускание или недостаточный эффект** — Из-за ослабления фиксации или особенностей тканей бровь может опуститься раньше, чем ожидалось; может потребоваться повторная подтяжка.
- **Проблемы, связанные с фиксирующим материалом** — Нерассасывающийся шов или устройство может прощупываться под кожей, быть болезненным при прикосновении или в редких случаях выйти наружу через кожу; в этом случае может потребоваться его удаление.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Стойкое повреждение нерва** — Стойкое повреждение нервной ветви, иннервирующей мышцу, поднимающую бровь, **встречается очень редко** (значительно реже, чем у 1 из 100 пациентов). В этом случае бровь на этой стороне не поднимается и лоб не морщится; для уменьшения асимметрии может потребоваться введение ботулотоксина на противоположной стороне или дополнительная операция.
- **Стойкое онемение или хроническая боль** — Очень редко могут возникать стойкая потеря чувствительности кожи головы, длительная боль из-за ущемления нерва или головные боли; может потребоваться дополнительное лечение.
- **Нарушение кровоснабжения кожи** — Особенно у курящих возможны нарушения заживления по краям разреза, что приводит к более широкому рубцу и выпадению волос.
- **Затруднённое закрывание глаз и сухость глаз** — Если в ту же сессию была выполнена и верхняя блефаропластика, в редких случаях могут возникнуть затруднения при полном закрывании глаза и симптомы сухости глаз; в большинстве случаев они временные.
- **Психологическая неудовлетворённость** — Несмотря на технически успешный результат, человеку может быть трудно привыкнуть к своему новому взгляду. Открытое обсуждение ожиданий перед операцией снижает этот риск.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Быстро нарастающий, напряжённый и болезненный отёк** виска или лба
- **Не прекращающееся кровотечение** из разрезов
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающие покраснение, боль, жар или гнойные выделения в области разрезов
- **Сильная головная боль**, не снимаемая обезболивающими, рвота или ригидность (напряжение) мышц шеи
- **Нечёткость зрения или двоение в глазах**, боль в глазу или невозможность закрыть глаз
- Потемнение кожи, багрово-чёрная окраска или расхождение краёв раны

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Первые 1–2 недели спите на спине с приподнятой головой; не спите лицом вниз или на висках.
- Первые 3–4 недели не трите брови и лоб, не массируйте виски и избегайте движений, оттягивающих лицо вниз.
- Отложите химические и термические процедуры, такие как окрашивание волос, химическая завивка и выпрямитель для волос, как минимум на **4–6 недель**. Пользуйтесь феном в тёплом режиме.
- Первые 3–4 недели избегайте интенсивных физических нагрузок, наклонов, подъёма тяжестей, сауны и турецкой бани (хаммама).
- Если вы приехали из-за рубежа, перелёт обычно безопасен после первого контрольного осмотра, как правило начиная с 3–5-го дня.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что темпоральный лифтинг поднимает наружную часть брови и уголок глаза и что сам по себе он не исправляет весь лоб, внутреннюю часть брови и избыток кожи век.
- ☐ Я понимаю, что в первые недели брови могут выглядеть выше и напряжённее, что подтянутые ткани со временем могут несколько опуститься и что эффект не является постоянным.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.