Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Botulinum Toksin (Botoks) Uygulaması

Mimik kırışıklıkları, çene kası (masseter) büyümesi veya aşırı terleme için iğne ile uygulama

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

Uygulama yeri: _____

Ürün adı / marka: _____

LOT numarası ve son kullanma tarihi: _____

Toplam ünite ve dilüsyon (sulandırma) miktarı: _____

Uygulama bölgeleri:
☐ Alın ☐ Kaş arası ☐ Göz kenarı (kaz ayağı)
☐ Masseter (çene kası) ☐ Boyun ☐ Terleme (koltuk altı / el)
☐ Diğer _____

Uygulamanın amacı:
☐ Estetik ☐ Tıbbi (diş sıkma, terleme vb.) _____

Kullanım talimatı dışı (endikasyon dışı) uygulama bölgesi:
☐ Yok ☐ Var — bölge: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Botulinum toksin, uygulandığı kasın siniri ile bağlantısını geçici olarak azaltarak o kasın kasılmasını hafifleten, saflaştırılmış bir proteindir. Estetik amaçla alın, kaş arası ve göz kenarındaki **mimik çizgilerini** yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca diş sıkma (bruksizm) ve çene kası (masseter) büyümesi, boyun bantları ve **aşırı terleme** (hiperhidroz) gibi durumlarda da tedavi amacıyla uygulanır.

Mimik çizgileri, yıllar içinde aynı kasların tekrar tekrar kasılması ve cildin esnekliğinin azalmasıyla oluşur. Etki **geçicidir**; kas zamanla eski işlevine kavuşur ve uygulama tekrarlanmazsa görünüm yavaş yavaş başlangıçtaki hâline döner. Amaç, yüz ifadesini dondurmadan **doğal ve dinlenmiş** bir görünüm elde etmektir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 İşlem nasıl yapılır?

Uygulama muayenehanede, kısa bir görüşme ve muayeneden sonra yapılır. Yüzünüzün mimikleri değerlendirilir, uygulama noktaları belirlenir ve gerekirse işlem öncesi fotoğraf çekilir.

1. **Hazırlık:** Makyaj temizlenir, cilt antiseptik bir solüsyonla silinir. Ağrıya hassassanız buz veya anestezik krem uygulanabilir.
2. **Uygulama:** Çok ince bir iğneyle, önceden belirlenen noktalara az miktarda ürün enjekte edilir. Her iğne batışı birkaç saniye sürer; hafif bir batma veya yanma hissedilir.
3. **Bitiş:** İğne noktalarına hafifçe baskı uygulanır. Küçük kabarcıklar birkaç dakika içinde kaybolur.
4. **Kayıt:** Kullanılan ürünün adı, LOT numarası, toplam ünite ve uygulama bölgeleri dosyanıza kaydedilir.

Bazı uygulama bölgeleri ve amaçları, kullanılan ürünün Türkiye'deki onaylı kullanım talimatında yer almayabilir (**kullanım talimatı dışı / endikasyon dışı kullanım**); örneğin masseter (çene kası) ve diş sıkma, boyun ve avuç içi terlemesi uygulamaları birçok ürünün onaylı kullanım alanları arasında yer almaz. Bu tür kullanım tıbbi literatürde yaygın ve kabul görmüş olsa da, sizin için planlanan bölgenin bu kapsamda olup olmadığı hekiminiz tarafından ayrıca açıklanır ve formdaki ilgili alana kaydedilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genellikle gerekmez; istenirse buz veya anestezik krem	Yaklaşık 10–20 dakika	Aynı gün; işlem sonrası 15–30 dk gözlem

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Alın, kaş arası ve göz kenarındaki mimik çizgilerinin yumuşaması, daha dinlenmiş bir görünüm
- Masseter uygulamasında diş sıkma şikâyetlerinin azalması ve çene hattının incelmesi
- Terleme uygulamasında terlemenin belirgin şekilde azalması
- Cerrahi kesi gerektirmeyen, kısa süreli ve günlük yaşama hemen dönülebilen bir işlem olması

Etki genellikle **3–14 gün** içinde başlar, yaklaşık 2. haftada en belirgin hâline ulaşır ve mimik bölgelerinde ortalama **3–4 ay** (terleme ve masseter uygulamalarında daha uzun olabilir) sürer. Etkinin derecesi ve süresi kişiden kişiye değişir. Çok derin, kalıcı çizgiler tamamen kaybolmayabilir. Gerekirse yaklaşık 2. haftada kontrol yapılır ve hekimin uygun gördüğü durumlarda küçük bir ek uygulama (rötuş) yapılabilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Uygulama yaptırmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Dolgu uygulamaları:** Hareketle değil, hacim kaybıyla oluşan çizgiler için daha uygun olabilir.
- **Cilt bakımı ve cilt yenileme yöntemleri:** Retinoid içeren kremler, kimyasal peeling, lazer, mezoterapi gibi yöntemler cilt kalitesini artırabilir; mimik kaslarının hareketini azaltmaz.
- **Cerrahi yöntemler:** Kaş kaldırma veya yüz germe gibi ameliyatlar sarkma varsa daha kalıcı bir çözüm sunabilir.
- **Tıbbi uygulamalarda:** Diş sıkma için gece plağı, terleme için ter önleyici (antiperspiran) ürünler ve ilaçlar.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Uygulama yapılmazsa mevcut görünümünüz veya şikâyetiniz doğal seyrinde devam eder. Mimik çizgileri yaşla birlikte yavaş yavaş belirginleşebilir; bu durum sağlığınız için bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 İşlem öncesi hazırlık

- Aşağıdaki durumlarda uygulama **yapılmaz veya ertelenir:** hamilelik, emzirme, **myastenia gravis**, ALS, Lambert-Eaton sendromu gibi sinir-kas hastalıkları, uygulama bölgesinde aktif enfeksiyon, ürüne karşı bilinen alerji, bazı ürünler için inek sütü proteini alerjisi. Lütfen bu durumlardan biri varsa mutlaka söyleyiniz.
- **Aminoglikozid grubu antibiyotikler** (ör. gentamisin) ve bazı kas gevşeticiler botulinum toksinin etkisini artırabilir; kullanıyorsanız bildiriniz.
- Daha önce botulinum toksin uygulaması yaptırdıysanız tarihini, ürünü ve sonucunu belirtiniz.
- Morarma riskini azaltmak için mümkünse işlemden birkaç gün önce, hekiminize danışarak, aspirin ve benzeri ilaçlara ara veriniz.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 4 saat	Uzanmayınız, uygulama bölgesine masaj yapmayınız veya bastırmayınız. Bu süre ürünün yerinde kalmasına yardımcı olur. İğne noktalarında hafif kızarıklık ve kabarıklık görülebilir.
İlk gün	Ağır egzersiz, sauna, hamam, solaryum ve çok sıcak ortamlardan kaçınınız. Makyaj birkaç saat sonra yapılabilir. Hafif baş ağrısı olabilir; basit ağrı kesicilerle geçer.
3–14. gün	Etki yavaş yavaş başlar. İğne noktalarında küçük morluklar **olursa** 1 hafta içinde kaybolur. Yüz bakımı, cilt işlemleri veya masajı bu dönemde yaptırmayınız.
2. hafta	Etki en belirgin hâline ulaşır. Gerekirse kontrol muayenesi yapılır; asimetri veya yetersiz etki varsa hekim değerlendirmesiyle küçük ek uygulama planlanabilir.
3–4. aylar ve sonrası	Etki yavaş yavaş azalır. Tekrar uygulamalar arasında genellikle en az 3 ay beklenmesi önerilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- İğne noktalarında hafif ağrı, kızarıklık ve kabarıklık (dakikalar–saatler içinde geçer)
- Küçük morluklar; morarma **olursa** birkaç gün ile 1 hafta içinde kaybolur
- Alında hafif ağırlık veya gerginlik hissi (ilk 1–2 hafta)

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Baş ağrısı** — Özellikle ilk uygulamada, 100 hastadan yaklaşık **1–10**'unda ilk günlerde hafif baş ağrısı olabilir; genellikle birkaç gün içinde geçer.
- **Hafif asimetri veya yetersiz etki** — Kasların kişiden kişiye farklı güçte olması nedeniyle iki taraf arasında küçük farklar kalabilir veya etki beklenenden az olabilir. 2. hafta kontrolünde değerlendirilir.
- **Kaşın dış kenarında aşırı kalkma ("Spock kaşı")** — Alın uygulamasından sonra kaşın dış ucu fazla kalkabilir; genellikle küçük bir ek uygulamayla düzeltilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Göz kapağı düşüklüğü (pitozis)** — Kaş arası veya alın uygulamasından sonra 100 hastadan yaklaşık **1–5**'inde üst göz kapağında hafif düşme olabilir. **Geçicidir**; genellikle 2–6 hafta içinde düzelir. Bu süreçte göz kapağını geçici olarak kaldırıp görünümü düzelten göz damlası verilebilir.
- **Kaş düşüklüğü ve alında ağırlık** — Alın kasının fazla gevşemesine bağlıdır; etki azaldıkça (haftalar–birkaç ay) düzelir.
- **Gülümsemede asimetri, dudak hareketinde zayıflık, ağızdan sızıntı** — Alt yüz ve masseter uygulamalarında ürünün komşu kaslara etkisiyle görülebilir; geçicidir, ancak birkaç hafta–ay sürebilir.
- **Göz kuruluğu, sulanma veya çift görme** — Göz çevresi uygulamalarında seyrek görülür; geçicidir. Çift görme olursa hekiminize haber veriniz.
- **Yutma güçlüğü, boyunda zayıflık** — Boyun uygulamalarında görülebilir; çoğunlukla hafif ve geçicidir.
- **Çiğneme gücünde azalma, yanakta çökme görünümü** — Masseter uygulamasında sert yiyecekleri çiğnerken geçici yorgunluk hissedilebilir; çok nadiren yanakta hafif çökme veya gülerken düzensiz görünüm olabilir.
- **Avuç içi uygulamasında elde güçsüzlük** — Avuç içi terlemesi için yapılan uygulamadan sonra parmaklarda kavrama gücü geçici olarak azalabilir; uygulamanın kendisi de belirgin şekilde ağrılı olabilir. Güçsüzlük genellikle birkaç hafta içinde düzelir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Etkinin uzak bölgelere yayılması** — Çok nadiren, özellikle yüksek dozlarda, ürünün etkisi uygulama bölgesinden uzağa yayılabilir: genel kas güçsüzlüğü, görme bozukluğu, **konuşma, yutma veya nefes alma güçlüğü** görülebilir. Bu durum **acil tedavi** gerektirir; hastanede yatış ve solunum desteği gerekebilir. Estetik amaçlı dozlarda bu tablo son derece nadirdir.
- **Ciddi alerjik reaksiyon** — Kurdeşen, yüzde ve dudakta şişme, nefes darlığı gibi bulgularla seyreden ağır alerjik reaksiyon (anafilaksi) son derece nadirdir; acil müdahale gerektirir.
- **Etkisizlik (antikor gelişimi)** — Çok nadiren vücut ürüne karşı antikor geliştirir ve sonraki uygulamalar etkisiz kalabilir. Sık aralıklarla ve yüksek dozda uygulama riski artırır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Bayılma hissi (vazovagal reaksiyon):** İğne veya kan alma sırasında baş dönmesi, terleme ve kısa süreli bayılma olabilir; uzanarak kısa sürede geçer.
- **Enfeksiyon:** Cilt temizliği ve steril malzemeyle risk çok düşüktür; gelişirse genellikle antibiyotikle tedavi edilir.
- **Alerjik reaksiyon:** Kullanılan ürüne, lokal anesteziğe veya antiseptiğe karşı hafif kızarıklıktan çok nadiren ciddi alerjik reaksiyona (anafilaksi) kadar değişebilir. Muayenehanemizde acil müdahale ekipmanı ve ilaçları bulunur.
- **Uçuk (herpes) aktivasyonu:** Daha önce uçuk geçirdiyseniz işlem bölgesinde yeniden ortaya çıkabilir; lütfen bildiriniz.
- **Beklentiyi karşılamayan sonuç:** Etki derecesi ve süresi kişiden kişiye değişir; ek seans veya düzeltme uygulaması gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Yutma, konuşma veya nefes alma güçlüğü**, belirgin kas güçsüzlüğü
- **Görmede bulanıklık veya çift görme**, göz kapağını hiç açamama
- Yüzde, dudakta veya dilde hızla gelişen şişlik, kurdeşen, nefes darlığı (alerjik reaksiyon)
- Uygulama bölgesinde giderek artan ağrı, kızarıklık, sıcaklık veya iltihaplı akıntı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Uygulamadan sonraki ilk 4 saat uzanmayınız ve bölgeye masaj yapmayınız; ilk gün ağır egzersiz, sauna ve hamamdan kaçınınız.
- Etki sürerken başka bir hekimden botulinum toksin, yüz masajı veya cilt işlemi yaptıracaksanız bu uygulamayı yaptırdığınızı belirtiniz.
- Tedavi süresince hamile kalmayı planlıyorsanız hekiminize danışınız.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

12 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Uygulama için engel oluşturan durumlar (hamilelik, emzirme, sinir-kas hastalıkları, ilaçlar) bana soruldu; doğru bilgi verdim.
- ☐ Botulinum toksinin etkisinin geçici olduğunu ve devam etmesi için uygulamanın düzenli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini biliyorum. Bazı uygulama bölgelerinin ürünün kullanım talimatı dışında olabileceği bana açıklandı.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: “Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum.”

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.