Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

# PRP (Trombositten Zengin Plazma) Uygulaması

Kendi kanınızdan hazırlanan plazmanın cilde veya saçlı deriye uygulanması

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

### HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

Uygulama yeri: _____

Kullanılan kit adı / LOT no: _____

Alınan kan miktarı (mL): _____

Aktivatör / katkı maddesi: ☐ Yok ☐ Kalsiyum klorür ☐ Diğer _____

Uygulama bölgesi: ☐ Yüz ☐ Saçlı deri ☐ Göz altı ☐ Boyun / dekolte ☐ Diğer _____

Seans no / planlanan seans sayısı: _____

## 1 Durumunuz ve işlemin amacı

PRP (Platelet Rich Plasma – Trombositten Zengin Plazma), **kendi kanınızdan** hazırlanan ve kan pulcukları (trombositler) bakımından zenginleştirilmiş bir plazmadır. Trombositler, dokuların onarımında rol oynayan doğal büyüme faktörleri içerir.

PRP; cilt kalitesini, parlaklığını ve elastikiyetini desteklemek, ince çizgilerin ve göz altı yorgunluğunun görünümünü azaltmak, akne izlerinin iyileşmesine katkı sağlamak veya **saç dökülmesinde** saç köklerini desteklemek amacıyla kullanılır. Kendi kanınızdan hazırlandığı için ürünün kendisine karşı alerji veya vücudun reddetmesi beklenmez.

## 2 İşlem nasıl yapılır?

İşlem muayenehanede, steril koşullarda ve **tek kullanımlık, kapalı sistem kitlerle** yapılır. Kullanılan kitin adı ve LOT numarası dosyanıza kaydedilir.

1. **Kan alma:** Kolunuzdaki damardan, normal bir kan tahlilindeki gibi, genellikle 10–30 mL kan alınır.
2. **Hazırlama:** Kan, içinde pıhtılaşmayı önleyici madde bulunan özel tüpte santrifüj cihazında ayrıştırılır ve trombositten zengin plazma bölümü steril şekilde ayrılır. Tüplerin size ait olduğu her aşamada kontrol edilir.
3. **Bölgenin hazırlanması:** Uygulama bölgesi temizlenip antiseptikle silinir; isteğe bağlı olarak uyuşturucu krem uygulanır.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4. **Uygulama:** Plazma ince iğne veya kanülle cilde ya da saçlı deriye çok sayıda küçük noktadan enjekte edilir; bazen mikroiğne işlemiyle birlikte cilde yayılır.
5. **Bitiş:** Bölge temizlenir, gerekirse soğuk uygulama yapılır ve bakım önerileri verilir.

Genellikle **4–6 hafta arayla 3–4 seanslık** bir kür, ardından 4–6 ayda bir idame seansı önerilir.

| ANESTEZİ | TAHMİNİ SÜRE | HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK |
|---|---|---|
| Uyuşturucu krem (isteğe bağlı) | Yaklaşık 45–60 dakika (hazırlık dahil) | Aynı gün; işlem sonrası kısa gözlem |

## 3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Cildin daha canlı, parlak ve sıkı görünmesi, ince çizgilerin daha az belirgin olması
- Göz altında koyuluk ve yorgun görünümde hafifleme
- Saç dökülmesinde dökülmenin azalmasına ve saç kalınlığının artmasına destek
- Kendi kanınız kullanıldığı için plazmanın kendisine karşı alerji beklenmemesi

Sonuçlar kişiden kişiye değişir. Bilimsel kanıtlar uygulama amacına göre farklıdır: **androgenetik (kalıtsal) saç dökülmesinde** olumlu sonuçlar bildiren çok sayıda çalışma vardır; cilt yenileme amaçlı kullanımda ise veriler daha sınırlıdır. Uygulanan teknik ve kitler arasında da farklılık bulunur. Etki kademeli olarak ortaya çıkar ve kalıcı değildir; belirli bir sonuç garanti edilemez.

## 4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Hiçbir işlem yaptırmamak** veya düzenli cilt bakımı ve güneşten korunmayla devam etmek
- **Saç dökülmesinde:** Altta yatan nedenin (demir, tiroid, hormon) araştırılması; minoksidil gibi hekim önerisiyle kullanılan ilaçlar; saç mezoterapisi; ileri dönemde saç ekimi
- **Cilt için:** Topikal ürünler, mezoterapi, cilt kalitesine yönelik hyalüronik asit uygulamaları, kimyasal peeling, lazer veya mikroiğne tedavileri

## 5 İşlem yapılmazsa ne olur?

PRP uygulanmazsa cildiniz veya saçınız doğal seyrini sürdürür. Saç dökülmesi nedenine göre ilerleyebilir; bu durumda diğer tedavi seçenekleri her zaman değerlendirilebilir. PRP yaptırmamanın sağlığınız açısından bir zararı yoktur.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

## 6 İşlem öncesi hazırlık

- **PRP uygulanmayan durumlar:** Trombosit sayısı düşüklüğü veya işlev bozukluğu, kanama-pıhtılaşma hastalıkları, ciddi kansızlık, aktif enfeksiyon veya ateş, aktif kanser tedavisi veya son yıllarda kan kanseri öyküsü, hamilelik ve emzirme. Bu durumlardan biri sizde varsa mutlaka bildiriniz.
- Kan sulandırıcı (varfarin, rivaroksaban, apiksaban, klopidogrel vb.) kullanıyorsanız işlemden önce hekiminize söyleyiniz; bu ilaçları **kendi kendinize kesmeyiniz**.
- Mümkünse işlemden 1 hafta önce aspirin ve ağrı kesici/iltihap giderici ilaçları (ibuprofen, naproksen vb.) hekiminize danışarak bırakınız; bu ilaçlar trombosit işlevini azaltabilir.
- Son 2–3 hafta içinde ağızdan veya iğne şeklinde kortizon tedavisi aldıysanız bildiriniz; PRP'nin etkisini azaltabilir ve işlemin ertelenmesi gerekebilir.
- İşlem günü bol su içiniz ve hafif bir öğün yiyerek geliniz; aç gelmek baş dönmesi riskini artırır.
- Saçlı deri uygulamasında saçınızı işlemden önceki gün veya aynı sabah yıkayınız; jöle, sprey gibi ürünler kullanmayınız.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

## 7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

| | |
|---|---|
| **İlk saatler** | Uygulama bölgesinde kızarıklık, hafif şişlik, gerginlik ve iğne noktalarında küçük kabarıklıklar olur. Kan alınan yerde hafif hassasiyet olabilir. |
| **İlk 24 saat** | Makyaj yapmayınız; sauna, hamam, solaryum, yoğun spor ve doğrudan güneşten kaçınınız. Saçlı deri uygulamasında saçınızı en erken ertesi gün yıkayınız. |
| **2–7. günler** | Kızarıklık ve şişlik geçer. Morarma **olursa** (özellikle göz altında) 3–7 günde çekilir. |
| **Kür süresince** | Seanslar 4–6 hafta arayla tekrarlanır. Ciltte değişiklik genellikle 2.–3. seanstan sonra, saçta ise 3–6 ay içinde fark edilir. |
| **Kür sonrası** | Etki zamanla azalır; korumak için 4–6 ayda bir idame seansı önerilebilir. |

## 8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

**Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)**

- Kan alma ve enjeksiyon sırasında hafif ağrı veya yanma
- Uygulama bölgesinde kızarıklık, hafif şişlik, hassasiyet ve gerginlik (birkaç saat–2 gün)
- İğne noktalarında küçük kanama izleri

**Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)**

- **Morarma** — Uygulama bölgesinde veya kan alınan yerde görülebilir; 3–7 günde kendiliğinden geçer.
- **Baş ağrısı veya saçlı deride hassasiyet** — Saçlı deri uygulamasından sonra 1–2 gün sürebilir; basit ağrı kesicilerle geçer (aspirin yerine parasetamol önerilir).
- **Beklenen etkinin az olması** — Bazı kişilerde belirgin bir değişiklik görülmeyebilir veya etki kısa sürebilir.

**Seyrek görülen durumlar**

- **Bayılma hissi** — Kan alma veya iğne sırasında baş dönmesi, terleme ve kısa süreli bayılma olabilir; uzanarak kısa sürede geçer.
- **Geçici saç dökülmesi artışı** — Saçlı deri uygulamasından sonraki ilk haftalarda geçici bir dökülme artışı görülebilir; genellikle kendiliğinden düzelir.
- **Uzayan şişlik** — Özellikle göz altında şişlik birkaç gün sürebilir.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Renk değişikliği** — Esmer ciltlerde ve güneşe maruz kalınırsa iğne noktalarında geçici koyulaşma görülebilir.

**Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar**

- **Enfeksiyon** — Steril teknikle çok nadirdir; gelişirse antibiyotik tedavisi, nadiren iltihabın boşaltılması gerekebilir.
- **Kitteki maddelere karşı alerji** — Plazmanın kendisine alerji beklenmez; ancak kitteki pıhtılaşma önleyici maddeye, aktivatöre, uyuşturucu kreme veya antiseptiğe karşı çok nadiren alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Damar tıkanıklığı** — Yüz bölgesine derin enjeksiyonda, maddenin bir damarın içine girmesi veya damara bası yapmasıyla **son derece nadir** olarak ciltte beslenme bozukluğu, iz ve çok daha nadir olarak görme bozukluğu bildirilmiştir. Erken fark edilip acil tedavi uygulanması çok önemlidir.
- **Sinir etkilenmesi** — Kan alma veya enjeksiyon sırasında bir sinire temas edilirse geçici uyuşma veya karıncalanma olabilir; çok nadiren uzun sürebilir.

**Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler**

- **Bayılma hissi (vazovagal reaksiyon):** İğne veya kan alma sırasında baş dönmesi, terleme ve kısa süreli bayılma olabilir; uzanarak kısa sürede geçer.
- **Enfeksiyon:** Cilt temizliği ve steril malzemeyle risk çok düşüktür; gelişirse genellikle antibiyotikle tedavi edilir.
- **Alerjik reaksiyon:** Kullanılan ürüne, lokal anesteziğe veya antiseptiğe karşı hafif kızarıklıktan çok nadiren ciddi alerjik reaksiyona (anafilaksi) kadar değişebilir. Muayenehanemizde acil müdahale ekipmanı ve ilaçları bulunur.
- **Uçuk (herpes) aktivasyonu:** Daha önce uçuk geçirdiyseniz işlem bölgesinde yeniden ortaya çıkabilir; lütfen bildiriniz.
- **Beklentiyi karşılamayan sonuç:** Etki derecesi ve süresi kişiden kişiye değişir; ek seans veya düzeltme uygulaması gerekebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

## 9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Uygulama sırasında veya sonrasında **ani şiddetli ağrı, ciltte beyazlaşma veya morumsu ağsı renk değişikliği**
- **Görmede bulanıklık, görme kaybı**, çift görme veya göz ağrısı
- Uygulama bölgesinde **giderek artan kızarıklık, sıcaklık, şişlik veya iltihaplı akıntı**, 38 °C üzerinde ateş
- Yüzde, dudakta veya dilde şişme, **nefes darlığı**, yaygın kaşıntılı döküntü
- Kan alınan kolda giderek artan şişlik, ağrı veya uyuşma

**Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.**

## 10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 24 saat makyaj yapmayınız; sauna, hamam, solaryum, yoğun spor ve havuzdan uzak durunuz.
- İşlemden sonraki 3 gün iltihap giderici ağrı kesici (ibuprofen, naproksen, aspirin) kullanmamanız önerilir; ağrı olursa parasetamol kullanabilirsiniz.
- Kür süresince her gün yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanınız; saçlı deri uygulamasında saç boyası ve perma için en az 3 gün bekleyiniz.
- Sigara, trombositlerin etkisini ve iyileşmeyi olumsuz etkiler; mümkünse bırakmanız önerilir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

## 11 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

## 12 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

*Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.*

## 13 Hasta beyanı

☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.

☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.

☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.

☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.

☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ PRP'nin kendi kanımdan hazırlanacağını, kullanılan kitin bilgilerinin dosyama kaydedileceğini ve tüplerin bana ait olduğunun her aşamada kontrol edileceğini biliyorum.
- ☐ PRP uygulanmasına engel olabilecek kan hastalıkları, kanser öyküsü, kan sulandırıcı kullanımı ve hamilelik konularında doğru bilgi verdim.
- ☐ Etkinin kişiden kişiye değiştiğini, birkaç seans gerektiğini ve sonucun kalıcı olmadığını anladım.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

*Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."*

## 14 İmzalar

| | ADI SOYADI | İMZA | TARİH / SAAT |
|---|---|---|---|
| **Hasta** | | | |
| **Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:** | | | |
| **Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim** | | | |
| **Tercüman (gerekirse) — dil:** | | | |
| **Tanık (gerekirse)** | | | |

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

### 18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

- ☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.
- ☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

**Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

**ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)**

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.