Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Behandlung mit Botulinumtoxin (Botox)

Injektionsbehandlung bei mimischen Falten, vergrößertem Kaumuskel (Masseter) oder übermäßigem Schwitzen

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Behandlungsort: _____

Produktname / Marke: _____

LOT-Nummer und Verfallsdatum: _____

Gesamteinheiten und Verdünnung: _____

Behandlungsareale: ☐ Stirn ☐ Zornesfalte ☐ Krähenfüße ☐ Masseter (Kaumuskel) ☐ Hals ☐ Schwitzen (Achseln / Hände) ☐ Sonstiges _____

Zweck der Behandlung: ☐ Ästhetisch ☐ Medizinisch (Zähneknirschen, Schwitzen usw.) _____

Behandlungsareal(e) außerhalb der Zulassung (Off-Label): ☐ Keine ☐ Ja — Areal: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Botulinumtoxin ist ein gereinigtes Eiweiß, das die Verbindung zwischen dem behandelten Muskel und seinem Nerv vorübergehend abschwächt, sodass sich der Muskel weniger stark zusammenzieht. In der Ästhetik wird es eingesetzt, um **mimische Falten** an der Stirn, zwischen den Augenbrauen und um die Augen zu glätten. Außerdem wird es medizinisch zur Behandlung von Zähneknirschen (Bruxismus) und einer Vergrößerung des Kaumuskels (Masseter), von Halsbändern (Platysmabändern) sowie von **übermäßigem Schwitzen** (Hyperhidrose) angewendet.

Mimische Falten entstehen im Laufe der Jahre dadurch, dass sich dieselben Muskeln immer wieder zusammenziehen und die Haut an Elastizität verliert. Die Wirkung ist **vorübergehend**: Der Muskel gewinnt seine Funktion allmählich zurück, und wenn die Behandlung nicht wiederholt wird, kehrt das Erscheinungsbild langsam in den Ausgangszustand zurück. Ziel ist ein **natürliches, erholtes** Aussehen, ohne dass Ihre Mimik erstarrt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Behandlung erfolgt in der Praxis nach einem kurzen Gespräch und einer Untersuchung. Ihre Gesichtsbewegungen werden beurteilt, die Injektionspunkte werden markiert und bei Bedarf werden vor der Behandlung Fotos angefertigt.

1. **Vorbereitung:** Das Make-up wird entfernt und die Haut mit einer antiseptischen Lösung gereinigt. Wenn Sie schmerzempfindlich sind, können Eis oder eine betäubende Creme aufgetragen werden.
2. **Injektion:** Mit einer sehr feinen Nadel wird eine kleine Menge des Präparats in die markierten Punkte gespritzt. Jeder Einstich dauert wenige Sekunden; dabei ist ein leichtes Stechen oder Brennen zu spüren.
3. **Abschluss:** Auf die Einstichstellen wird leichter Druck ausgeübt. Kleine Quaddeln verschwinden innerhalb weniger Minuten.
4. **Dokumentation:** Produktname, LOT-Nummer, Gesamteinheiten und Behandlungsareale werden in Ihrer Akte vermerkt.

Einige Behandlungsareale und -zwecke sind möglicherweise nicht in der in der Türkei zugelassenen Gebrauchsinformation des Präparats enthalten (**Off-Label-Anwendung**); so gehören beispielsweise die Behandlung des Masseters (Kaumuskels) und des Zähneknirschens, des Halses sowie schwitzender Handflächen bei vielen Präparaten nicht zu den zugelassenen Anwendungsgebieten. Obwohl eine solche Anwendung in der medizinischen Fachliteratur verbreitet und anerkannt ist, erklärt Ihnen Ihr Arzt gesondert, ob das bei Ihnen geplante Areal darunter fällt; dies wird im entsprechenden Feld dieses Bogens vermerkt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Meist nicht erforderlich; auf Wunsch Eis oder betäubende Creme	Etwa 10–20 Minuten	Ambulant; anschließend 15–30 Minuten Beobachtung

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Glättung mimischer Falten an der Stirn, zwischen den Augenbrauen und um die Augen für ein erholteres Aussehen
- Bei Masseterbehandlung weniger Beschwerden durch Zähneknirschen und eine schmalere Kieferlinie
- Bei Behandlung des Schwitzens eine deutliche Verringerung der Schweißbildung
- Ein kurzer Eingriff ohne chirurgische Schnitte, nach dem Sie sofort in den Alltag zurückkehren können

Die Wirkung setzt in der Regel innerhalb von **3–14 Tagen** ein, erreicht nach etwa 2 Wochen ihren Höhepunkt und hält in den mimischen Arealen durchschnittlich **3–4 Monate** an (bei Behandlung von Schwitzen und Masseter möglicherweise länger). Stärke und Dauer der Wirkung sind individuell verschieden. Sehr tiefe, eingegrabene Falten verschwinden unter Umständen nicht vollständig. Bei Bedarf erfolgt nach etwa 2 Wochen eine Kontrolle, und wenn Ihr Arzt es für sinnvoll hält, kann eine kleine Nachbehandlung (Touch-up) erfolgen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Behandlung:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, können Sie sich jederzeit auch dagegen entscheiden.
- **Hautfüller (Filler):** Können bei Falten, die nicht durch Bewegung, sondern durch Volumenverlust entstehen, besser geeignet sein.
- **Hautpflege und Hautverjüngung:** Retinoidhaltige Cremes, chemische Peelings, Laser oder Mesotherapie können die Hautqualität verbessern, verringern aber nicht die Bewegung der mimischen Muskulatur.
- **Operation:** Eingriffe wie ein Brauen- oder Facelift können bei erschlafftem Gewebe eine länger anhaltende Lösung bieten.
- **Bei medizinischen Anwendungen:** Eine Aufbissschiene für die Nacht bei Zähneknirschen; Antitranspirantien und Medikamente bei Schwitzen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Behandlung nicht durchgeführt, nehmen Ihr derzeitiges Erscheinungsbild bzw. Ihre Beschwerden ihren natürlichen Verlauf. Mimische Falten können mit dem Alter allmählich deutlicher werden; eine Gefahr für Ihre Gesundheit besteht dadurch nicht.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- In folgenden Situationen wird die Behandlung **nicht durchgeführt oder verschoben:** Schwangerschaft, Stillzeit, Nerven-Muskel-Erkrankungen wie **Myasthenia gravis**, ALS oder Lambert-Eaton-Syndrom, aktive Infektion im Behandlungsareal, bekannte Allergie gegen das Präparat oder – bei einigen Präparaten – eine Kuhmilcheiweißallergie. Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft.
- **Aminoglykosid-Antibiotika** (z. B. Gentamicin) und einige Muskelrelaxanzien können die Wirkung von Botulinumtoxin verstärken; bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie diese einnehmen.
- Wenn Sie bereits früher mit Botulinumtoxin behandelt wurden, nennen Sie uns bitte Zeitpunkt, Präparat und Ergebnis.
- Um das Risiko von Blutergüssen zu verringern, setzen Sie Aspirin und ähnliche Medikamente nach Möglichkeit und nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einige Tage vor der Behandlung ab.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 4 Stunden	Legen Sie sich nicht hin und massieren oder drücken Sie das behandelte Areal nicht. Dies hilft, dass das Präparat an der Stelle bleibt, an der es eingebracht wurde. An den Einstichstellen können leichte Rötungen und kleine Quaddeln sichtbar sein.
Erster Tag	Vermeiden Sie anstrengenden Sport, Sauna, Hamam (türkisches Bad), Solarium und sehr heiße Umgebungen. Make-up kann nach einigen Stunden aufgetragen werden. Leichte Kopfschmerzen können auftreten; sie vergehen mit einfachen Schmerzmitteln.
Tag 3–14	Die Wirkung setzt allmählich ein. **Falls** an den Einstichstellen kleine Blutergüsse entstehen, verschwinden sie innerhalb einer Woche. Lassen Sie in dieser Zeit keine Gesichtsbehandlungen, Hautbehandlungen oder Gesichtsmassagen durchführen.
2. Woche	Die Wirkung erreicht ihren Höhepunkt. Bei Bedarf erfolgt eine Kontrolluntersuchung; besteht eine Asymmetrie oder eine unzureichende Wirkung, kann nach ärztlicher Beurteilung eine kleine Nachbehandlung geplant werden.
Ab Monat 3–4	Die Wirkung lässt allmählich nach. Zwischen den Behandlungen wird im Allgemeinen ein Abstand von mindestens 3 Monaten empfohlen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Schmerzen, Rötung und kleine Quaddeln an den Einstichstellen (vergehen innerhalb von Minuten bis Stunden)
- Kleine Blutergüsse; **falls** ein Bluterguss auftritt, verschwindet er innerhalb von einigen Tagen bis einer Woche
- Ein leichtes Schwere- oder Spannungsgefühl in der Stirn (erste 1–2 Wochen)

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Kopfschmerzen** — Insbesondere nach der ersten Behandlung haben etwa **1–10 von 100** Patienten in den ersten Tagen leichte Kopfschmerzen; diese klingen meist innerhalb weniger Tage ab.
- **Leichte Asymmetrie oder unzureichende Wirkung** — Da die Muskelkraft von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, können kleine Unterschiede zwischen beiden Seiten bestehen bleiben oder die Wirkung geringer ausfallen als erwartet. Dies wird bei der Kontrolle nach 2 Wochen beurteilt.
- **Zu stark angehobene äußere Augenbraue („Spock-Braue“)** — Nach einer Stirnbehandlung kann sich das äußere Ende der Augenbraue zu stark anheben; dies wird meist durch eine kleine zusätzliche Injektion korrigiert.

Gelegentliche Beschwerden

- **Herabhängen des Oberlids (Ptosis)** — Nach einer Behandlung zwischen den Augenbrauen oder an der Stirn kann bei etwa **1–5 von 100** Patienten ein Oberlid leicht herabhängen. Dies ist **vorübergehend** und bildet sich meist innerhalb von 2–6 Wochen zurück. In dieser Zeit können Augentropfen verordnet werden, die das Lid vorübergehend anheben und das Erscheinungsbild verbessern.
- **Absinken der Augenbraue und Schweregefühl der Stirn** — Ursache ist eine zu starke Entspannung des Stirnmuskels; bessert sich, wenn die Wirkung nachlässt (Wochen bis einige Monate).
- **Ungleichmäßiges Lächeln, Schwäche der Lippenbewegung, Speichelaustritt aus dem Mund** — Kann bei Behandlungen im unteren Gesicht und des Masseters auftreten, wenn das Präparat benachbarte Muskeln beeinflusst; vorübergehend, kann aber mehrere Wochen bis Monate anhalten.
- **Trockenes Auge, Tränenfluss oder Doppelbilder** — Gelegentlich bei Behandlungen um die Augen; vorübergehend. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Doppelbilder bemerken.
- **Schluckbeschwerden, Schwäche der Halsmuskulatur** — Kann bei Behandlungen am Hals auftreten; meist leicht und vorübergehend.
- **Verminderte Kaukraft, eingefallen wirkende Wangen** — Nach einer Masseterbehandlung kann das Kauen harter Speisen eine Zeit lang ermüdend sein; sehr selten können die Wangen leicht eingefallen oder das Lächeln ungleichmäßig wirken.
- **Schwäche der Hand nach Behandlung der Handflächen** — Nach Injektionen in die Handflächen gegen Schwitzen kann die Greifkraft der Finger vorübergehend vermindert sein; die Injektionen selbst können recht schmerzhaft sein. Die Schwäche bildet sich meist innerhalb weniger Wochen zurück.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Ausbreitung der Wirkung auf entfernte Bereiche** — Sehr selten, vor allem bei hohen Dosen, kann sich die Wirkung des Präparats über das behandelte Areal hinaus ausbreiten und zu allgemeiner Muskelschwäche, Sehstörungen oder **Sprech-, Schluck- oder Atembeschwerden** führen. Dies erfordert eine **Notfallbehandlung**; eine stationäre Aufnahme und Unterstützung der Atmung können notwendig werden. Bei den in der Ästhetik verwendeten Dosen ist dies äußerst selten.
- **Schwere allergische Reaktion** — Eine schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie) mit Nesselsucht, Schwellung von Gesicht und Lippen oder Atemnot ist äußerst selten; sie erfordert eine Notfallbehandlung.
- **Wirkungsverlust (Antikörperbildung)** — Sehr selten bildet der Körper Antikörper gegen das Präparat, sodass spätere Behandlungen wirkungslos bleiben können. Häufige Behandlungen in hoher Dosis erhöhen dieses Risiko.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Ohnmachtsgefühl (vasovagale Reaktion):** Während einer Injektion oder Blutabnahme können Schwindel, Schwitzen und eine kurze Ohnmacht auftreten; im Liegen geht dies rasch vorüber.
- **Infektion:** Durch Hautdesinfektion und sterile Materialien ist das Risiko sehr gering; tritt dennoch eine Infektion auf, wird sie in der Regel mit Antibiotika behandelt.
- **Allergische Reaktion:** Auf das verwendete Präparat, das örtliche Betäubungsmittel oder das Desinfektionsmittel – von leichter Rötung bis, sehr selten, zu einer schweren allergischen Reaktion (Anaphylaxie). Unsere Praxis ist mit Notfallausrüstung und Notfallmedikamenten ausgestattet.
- **Wiederauftreten von Lippenherpes (Herpes):** Wenn Sie schon einmal Lippenherpes hatten, kann er im behandelten Bereich erneut auftreten; bitte teilen Sie uns dies mit.
- **Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen:** Ausmaß und Dauer der Wirkung sind individuell verschieden; zusätzliche Sitzungen oder eine Nachbehandlung können erforderlich sein.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Schluck-, Sprech- oder Atembeschwerden** oder ausgeprägte Muskelschwäche
- **Verschwommenes Sehen oder Doppelbilder** oder Unfähigkeit, ein Augenlid überhaupt zu öffnen
- Rasch zunehmende Schwellung von Gesicht, Lippen oder Zunge, Nesselsucht oder Atemnot (allergische Reaktion)
- Zunehmende Schmerzen, Rötung, Überwärmung oder Eiter im Behandlungsareal

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Legen Sie sich in den ersten 4 Stunden nicht hin und massieren Sie das Areal nicht; vermeiden Sie am ersten Tag anstrengenden Sport, Sauna und Hamam (türkisches Bad).
- Wenn Sie sich, solange die Wirkung anhält, bei einem anderen Arzt mit Botulinumtoxin, einer Gesichtsmassage oder einer Hautbehandlung behandeln lassen, informieren Sie ihn über diese Behandlung.
- Wenn Sie während des Behandlungszeitraums eine Schwangerschaft planen, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

12 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

13 Erklärung der Patientin / des Patienten

☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.

☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich wurde nach Umständen gefragt, die gegen eine Behandlung sprechen (Schwangerschaft, Stillzeit, Nerven-Muskel-Erkrankungen, Medikamente), und habe wahrheitsgemäße Angaben gemacht.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Wirkung von Botulinumtoxin vorübergehend ist und die Behandlung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss, um sie aufrechtzuerhalten. Mir wurde erklärt, dass einige Behandlungsareale außerhalb der zugelassenen Gebrauchsinformation des Präparats liegen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

14 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.