Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Behandlung mit Hautfüllern (Hyaluronsäure)

Hyaluronsäure-Injektion bei Volumenverlust, zur Konturierung und bei Falten im Gesicht

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Behandlungsort: _____

Produktname / Marke: _____

LOT-Nummer und Verfallsdatum: _____

Gesamtmenge (mL): _____

Behandlungsareale:
☐ Lippen ☐ Nasolabialfalten ☐ Wangen / Wangenknochen ☐ Kinn
☐ Kieferlinie ☐ Unter den Augen (Tränenrinne) ☐ Nase
☐ Sonstiges _____

Injektionsinstrument: ☐ Nadel ☐ Kanüle ☐ Beides _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Hyaluronsäure ist eine Substanz, die natürlicherweise in unserer Haut vorkommt; sie bindet Wasser und verleiht dem Gewebe seine Fülle. Filler-Präparate sind eine im Labor hergestellte, gelartige Form dieser Substanz. Sie werden eingesetzt, um mit dem Alter verlorenes **Volumen wiederherzustellen**, die **Kontur** von Lippen, Wangen, Kinn und Kieferlinie **zu betonen** oder **Falten und Vertiefungen** zu mildern.

Volumenverlust und Falten im Gesicht entstehen durch Alterung, Veränderungen von Knochen und Fettgewebe, Gewichtsverlust, Sonneneinstrahlung und Veranlagung. Die Wirkung von Hyaluronsäure-Fillern ist **vorübergehend**; sie werden vom Körper allmählich abgebaut. **In unserer Praxis werden keine dauerhaften (permanenten) Filler verwendet.**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Behandlung erfolgt in der Praxis. Zunächst wird Ihr Gesicht beurteilt, Ihre Erwartungen werden besprochen, ein Behandlungsplan wird erstellt und vor der Behandlung werden Fotos angefertigt.

1. **Vorbereitung:** Das Make-up wird entfernt und die Haut mit einer antiseptischen Lösung gereinigt. Für Ihren Komfort kann eine betäubende Creme aufgetragen werden; die meisten Filler-Präparate enthalten zusätzlich ein örtliches Betäubungsmittel (Lidocain).
2. **Injektion:** Das Gel wird mit einer feinen Nadel oder einer flexiblen Kanüle mit stumpfer Spitze langsam und in kleinen Mengen in der geplanten Tiefe und im geplanten Areal eingebracht. Um das Risiko einer Injektion in ein Blutgefäß zu verringern, werden sichere Techniken angewendet.
3. **Modellieren:** Bei Bedarf wird das Präparat behutsam mit den Fingern geformt; das Ergebnis wird gemeinsam mit Ihnen im Spiegel beurteilt.
4. **Dokumentation:** Produktname, LOT-Nummer, Menge und Behandlungsareale werden in Ihrer Akte vermerkt. Sie erhalten möglicherweise eine Karte bzw. ein Etikett mit den Produktangaben; wir empfehlen Ihnen, diese aufzubewahren.

Ein wichtiger Sicherheitsvorteil von Hyaluronsäure-Fillern besteht darin, dass sie bei Bedarf mit einem Enzym namens **Hyaluronidase** aufgelöst werden können. Dieses Medikament und eine Notfallausrüstung werden in unserer Praxis stets bereitgehalten.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Betäubende Creme und/oder im Präparat enthaltenes örtliches Betäubungsmittel	Etwa 20–45 Minuten	Ambulant; anschließend 15–30 Minuten Beobachtung

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Ersatz verlorenen Volumens für ein frischeres und ausgewogeneres Erscheinungsbild
- Definiertere und harmonischere Konturen von Lippen, Wangen, Kinn und Kieferlinie
- Milderung von Falten und Vertiefungen
- Ein sofort sichtbares Ergebnis und eine rasche Rückkehr in den Alltag

Das Ergebnis ist unmittelbar nach der Behandlung sichtbar und lässt sich nach Abklingen der Schwellung, nach etwa **2 Wochen**, besser beurteilen. Je nach Präparat, Areal und Stoffwechsel hält die Wirkung in der Regel **6–18 Monate** an (an den Lippen kürzer, an Wangen und Kinn länger). Um das Ergebnis zu erhalten, muss die Behandlung in Abständen wiederholt werden. Bei ausgeprägter Hauterschlaffung kann die mit Fillern erreichbare Verbesserung begrenzt sein.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Behandlung:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, können Sie sich jederzeit auch dagegen entscheiden.
- **Botulinumtoxin:** Besser geeignet für Falten, die nicht durch Volumenverlust, sondern durch die Mimik entstehen.
- **Hautverjüngung:** Mesotherapie, PRP, Peelings oder Laser können die Hautqualität verbessern, bringen aber kein Volumen.
- **Eigenfetttransfer (mit Ihrem eigenen Fett):** Kann länger anhalten; erfordert einen kleinen chirurgischen Eingriff.
- **Operation:** Ein Facelift, eine Lidoperation, ein Kinnimplantat oder eine Nasenkorrektur (Rhinoplastik) können eine deutlichere oder dauerhafte Veränderung bewirken.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Behandlung nicht durchgeführt, verändert sich Ihr Gesicht weiter im Rahmen der natürlichen Alterung. Eine Gefahr für Ihre Gesundheit besteht dadurch nicht.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- In folgenden Situationen wird die Behandlung **nicht durchgeführt oder verschoben:** Schwangerschaft, Stillzeit, aktive Akne, Lippenherpes oder Infektion im Behandlungsareal, bekannte Allergie gegen das Präparat oder gegen Lidocain, schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie) in der Vorgeschichte oder eine nicht kontrollierte Autoimmunerkrankung. Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft.
- Teilen Sie uns mit, wenn Sie im selben Areal bereits **irgendeinen Filler** (insbesondere dauerhafte Präparate oder Präparate unbekannter Art), Fäden oder Implantate erhalten haben.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit **2 Wochen vor und 2 Wochen nach** der Behandlung Zahnbehandlungen, Impfungen oder andere geplante Operationen, da diese das Risiko einer verzögerten Entzündungsreaktion erhöhen können. Falls sie notwendig sind, informieren Sie uns bitte.
- Wenn Sie einen wichtigen gesellschaftlichen Termin haben, planen Sie die Behandlung wegen möglicher Schwellungen und Blutergüsse mindestens 2 Wochen vorher ein.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24 Stunden	Im behandelten Areal treten Schwellung, Druckempfindlichkeit und Rötung auf; ein kühlender Umschlag hilft. Massieren oder drücken Sie das Areal nicht. Verzichten Sie auf Make-up, Sauna, anstrengenden Sport und Alkohol. Nach einer Lippenbehandlung ist die Schwellung ausgeprägter.
Tag 2–7	Die Schwellung klingt weitgehend ab. **Falls** ein Bluterguss auftritt, verschwindet er innerhalb von 5–10 Tagen. Kleine Verhärtungen können tastbar sein; die meisten werden von selbst weicher. Vermeiden Sie es, auf dem Bauch zu schlafen, und verzichten Sie auf Gesichtsmassagen.
2. Woche	Das Ergebnis stabilisiert sich. Bei Bedarf erfolgt eine Kontrolluntersuchung; besteht eine Asymmetrie oder eine Unterkorrektur, kann nach ärztlicher Beurteilung eine kleine Nachbehandlung geplant werden.
Monat 6–18	Das Präparat wird allmählich abgebaut. Der Zeitpunkt einer erneuten Behandlung wird gemeinsam mit Ihnen geplant.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Schmerzen, Rötung und Druckempfindlichkeit an den Einstichstellen
- Schwellung (kann besonders an den Lippen und unter den Augen einige Tage lang ausgeprägt sein)
- Blutergüsse; **falls** sie auftreten, verschwinden sie innerhalb von 1–2 Wochen
- Kleine tastbare Verhärtungen (werden meist innerhalb weniger Wochen weicher)

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Leichte Asymmetrie oder mehr/weniger Fülle als erwartet** — Die beiden Gesichtshälften sind von Natur aus unterschiedlich; kleine Unterschiede können bestehen bleiben. Diese lassen sich bei der Kontrolle mit zusätzlichem Filler oder mit Hyaluronidase korrigieren.
- **Länger anhaltende Schwellung** — Besonders unter den Augen kann die Schwellung bei manchen Menschen wochenlang anhalten.

Gelegentliche Beschwerden

- **Anhaltende Verhärtungen oder Knötchen** — Können entstehen, wenn sich das Präparat an einer Stelle ansammelt. Sie lassen sich mit Massage, Hyaluronidase oder anderen Behandlungen beseitigen.
- **Bläuliche Verfärbung (Tyndall-Effekt)** — Kann auftreten, wenn das Präparat zu oberflächlich eingebracht wird, besonders in der dünnen Haut unter den Augen; sie lässt sich mit Hyaluronidase korrigieren.
- **Verlagerung des Präparats (Migration)** — Mit der Zeit kann sich das Präparat in ein benachbartes Areal verschieben (z. B. über den Lippenrand hinaus); bei Bedarf kann es aufgelöst werden.
- **Infektion und Biofilm** — Selten können im Behandlungsareal Rötung, Überwärmung, Schmerzen oder ein Abszess entstehen. Antibiotika und gegebenenfalls ein Auflösen des Fillers sowie eine Drainage können erforderlich werden. Bildet sich um das Präparat eine Bakterienschicht (Biofilm), kann die Entzündung wiederkehren und die Behandlung lange dauern.
- **Verzögerte Entzündungsreaktion** — **Wochen oder sogar Monate** nach der Behandlung, häufig nach einem Reiz für das Immunsystem wie einer Grippe, einer Zahnbehandlung oder einer Impfung, können im Filler-Areal eine schmerzhafte Schwellung und Rötung auftreten (bei **weniger als 1 von 100** Patienten). Sie bessert sich durch Medikamente und gegebenenfalls durch Auflösen des Fillers.
- **Wiederaufflammen von Lippenherpes** — Kann vor allem nach einer Lippenbehandlung auftreten; wenn Sie früher bereits Lippenherpes hatten, können vorbeugend Medikamente gegeben werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Verschluss eines Blutgefäßes (vaskuläre Okklusion)** — Dies ist das wichtigste Risiko einer Filler-Behandlung. Gelangt das Präparat in ein Blutgefäß oder drückt es von außen auf ein Gefäß, kann die Durchblutung des betreffenden Areals gestört werden. In der Fachliteratur wird dies bei etwa **1 von 1.000 bis 1 von 10.000 Behandlungen** berichtet; das Risiko ist an **Nase, Zornesfalte und Nasolabialfalten** höher. Anzeichen: **starke Schmerzen** während oder nach der Behandlung, **Abblassen** der Haut, gefolgt von einer **dunklen, violetten, netzartigen Verfärbung** und Kälte. Wird dies nicht früh erkannt und sofort behandelt, kann es zu **Hautschäden und Gewebeverlust (Nekrose)**, dauerhaften Narben und Entstellungen kommen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Notfallbehandlung: Hyaluronidase** — Bei Verdacht auf einen Gefäßverschluss wird die Behandlung sofort abgebrochen und zur Auflösung des Fillers eine hohe Dosis **Hyaluronidase** injiziert; zusätzlich werden warme Umschläge, Massage und Medikamente angewendet. Diese Behandlung ist meist wirksam, kann den Schaden aber **nicht immer vollständig rückgängig machen**. Hyaluronidase selbst kann sehr selten eine allergische Reaktion auslösen. Eine Überweisung ins Krankenhaus, Wundversorgung, eine längere Behandlung oder spätere Korrektureingriffe können erforderlich werden.
- **Sehverlust und Schlaganfall** — Wenn auch äußerst selten, kann das Präparat, wenn es in die Gefäße gelangt, die das Auge oder das Gehirn versorgen, einen **teilweisen oder vollständigen, dauerhaften Sehverlust** oder einen **Schlaganfall** verursachen. Dies steht am häufigsten im Zusammenhang mit Behandlungen der Nase und der Zornesfalte. In dieser Situation **zählt jede Minute**; Sie werden zur notfallmäßigen augenärztlichen und neurologischen Untersuchung ins Krankenhaus überwiesen.
- **Schwere allergische Reaktion** — Eine schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie) auf Hyaluronsäure oder Lidocain ist äußerst selten; sie erfordert eine Notfallbehandlung.
- **Granulom** — Der Körper bildet als Reaktion auf das Präparat feste, entzündliche Knoten; dies ist sehr selten und kann eine langfristige Behandlung erfordern.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Ohnmachtsgefühl (vasovagale Reaktion):** Während einer Injektion oder Blutabnahme können Schwindel, Schwitzen und eine kurze Ohnmacht auftreten; im Liegen geht dies rasch vorüber.
- **Infektion:** Durch Hautdesinfektion und sterile Materialien ist das Risiko sehr gering; tritt dennoch eine Infektion auf, wird sie in der Regel mit Antibiotika behandelt.
- **Allergische Reaktion:** Auf das verwendete Präparat, das örtliche Betäubungsmittel oder das Desinfektionsmittel – von leichter Rötung bis, sehr selten, zu einer schweren allergischen Reaktion (Anaphylaxie). Unsere Praxis ist mit Notfallausrüstung und Notfallmedikamenten ausgestattet.
- **Wiederauftreten von Lippenherpes (Herpes):** Wenn Sie schon einmal Lippenherpes hatten, kann er im behandelten Bereich erneut auftreten; bitte teilen Sie uns dies mit.
- **Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen:** Ausmaß und Dauer der Wirkung sind individuell verschieden; zusätzliche Sitzungen oder eine Nachbehandlung können erforderlich sein.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Starke Schmerzen** nach der Behandlung, die nicht abklingen oder immer stärker werden
- **Abblassen oder eine dunkle, violette, netzartige (marmorierte) Verfärbung** der Haut, Kälte, Blasen oder eine Wunde
- **Verschwommenes Sehen oder Sehverlust**, Augenschmerzen oder Doppelbilder — **jede Minute zählt**: Rufen Sie sofort an oder suchen Sie die nächste Notaufnahme auf
- Plötzliche **starke Kopfschmerzen, Sprachstörungen, Schwäche im Gesicht, in Arm oder Bein** (Anzeichen eines Schlaganfalls) — rufen Sie sofort die 112 an
- Rasch zunehmende Schwellung von Gesicht, Lippen oder Zunge, Nesselsucht oder Atemnot
- Fieber, Rötung, Überwärmung und zunehmende Verhärtung/Schwellung (auch noch Wochen später)

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Verzichten Sie in den ersten 24 Stunden auf Make-up, Sauna, Hamam (türkisches Bad), anstrengenden Sport und Alkohol; vermeiden Sie in den ersten 2 Wochen Massagen des Areals, Gesichtsbehandlungen und das Schlafen auf dem Bauch.
- Schützen Sie das Areal in den ersten 2 Wochen vor Sonne, Solarium und großer Kälte.
- Wenn künftig ein anderer Arzt eine Behandlung in Ihrem Gesicht durchführt (Filler, Laser, Operation, Zahnbehandlung), teilen Sie ihm mit, dass Sie einen Filler erhalten haben, und nennen Sie den Namen des Präparats.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

12 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir wurde erklärt, dass das Risiko eines Gefäßverschlusses mit daraus folgender Hautschädigung und – wenn auch sehr selten – eines Sehverlusts und Schlaganfalls besteht, welche Notfallbehandlung (Hyaluronidase) in diesem Fall erfolgen würde und dass diese Behandlung nicht immer vollständig erfolgreich sein muss.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Wirkung von Fillern vorübergehend ist und in dieser Praxis keine dauerhaften Filler verwendet werden, und ich erkläre, dass ich alle früheren Filler- oder Implantatbehandlungen vollständig angegeben habe.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.