Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Глубокая подтяжка шеи

Подтяжка шеи с коррекцией также глубоких структур шеи (глубокая подтяжка шеи, deep-plane)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Планируемые компоненты:
- ☐ Платизмопластика
- ☐ Удаление глубокого жира
- ☐ Уменьшение двубрюшной мышцы
- ☐ Уменьшение поднижнечелюстной железы
- ☐ Иссечение избытка кожи

Одновременная подтяжка лица: ☐ Нет ☐ Да (с отдельной формой согласия) _____

Другие вмешательства, выполняемые одновременно: _____

Жалобы и ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

С возрастом, при изменениях веса или из-за наследственных особенностей на шее могут появиться **полнота под подбородком**, утрата угла между челюстью и шеей, **вертикальные тяжи** (тяжи платизмы) и **дряблость кожи**. Такой вид часто обусловлен не только подкожным жиром, но и **глубоким жиром под мышцей шеи, мышцами под подбородком (двубрюшными мышцами) и опущением слюнных желёз (поднижнечелюстных желёз)**.

Глубокая подтяжка шеи затрагивает и эти глубокие структуры, чтобы сделать линию челюсти более чёткой и добиться **более молодого, подтянутого и естественного** вида шеи. Результат зависит от эластичности вашей кожи, строения костей, веса и возраста. Операция не останавливает старение; со временем шея будет постепенно снова расслабляться.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Операция обычно проводится под общим наркозом в условиях операционной. Перед ней вашу шею осматривают в положении сидя и стоя, фотографируют и размечают, а также вместе с вами определяют, какие структуры будут корректироваться.

1. **Разрезы:** В естественной складке под подбородком делают разрез длиной около 3–5 см. Если планируется удаление избытка кожи, добавляют разрезы вокруг мочки уха, продолжающиеся за ухо к линии роста волос. По возможности разрезы скрывают в естественных складках и в волосистой части головы.
2. **Отслойка кожи:** Кожу шеи бережно отделяют от лежащей под ней мышцы; при необходимости поверхностный жир равномерно истончают.
3. **Удаление глубокого жира:** Глубокий жир, расположенный под мышцей шеи (платизмой), до которого невозможно добраться с помощью наружной липосакции, контролируемо уменьшают.
4. **Двубрюшные мышцы и поднижнечелюстные железы:** При необходимости истончают переднюю часть двубрюшной мышцы, создающую полноту под подбородком. Если слюнная железа (поднижнечелюстная железа) опущена и выступает, её выступающая часть при необходимости может быть частично уменьшена; железа полностью не удаляется.
5. **Платизмопластика:** Края платизмы, разошедшиеся по средней линии шеи и образующие тяжи, сшивают между собой, создавая «внутренний корсет»; при необходимости мышцу также подвешивают с боков.
6. **Удаление избытка кожи и завершение операции:** Кожу без натяжения перераспределяют вверх и назад, а избыток удаляют. Тщательно останавливают кровотечение, обычно устанавливают **дренаж** (тонкую трубку для отвода жидкости), разрезы зашивают тонкими швами и накладывают повязку на шею.

Планируемые компоненты различаются у разных людей; не каждый этап выполняется у каждого пациента. Если одновременно будет выполняться подтяжка лица, для неё подписывается **отдельная форма согласия**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз (у отдельных пациентов — седация + местная анестезия)	Около 2–4 часов (дольше при сочетании с другими вмешательствами)	Обычно одна ночь в больнице

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более чёткая линия челюсти и угол между челюстью и шеей
- Уменьшение полноты под подбородком и вертикальных тяжей на шее
- Подтягивание дряблой кожи шеи и более молодой, свежий вид

Большинство правильно отобранных пациентов довольны результатом. Основная часть отёка спадает в первые 4–6 недель; окончательный результат виден через **6–12 месяцев**. У пациентов с плохим качеством кожи, в пожилом возрасте, после значительного похудения или ранее перенесённой операции на шее результаты могут быть более ограниченными. Примерно **5–10 из каждых 100** пациентов может потребоваться небольшая корректирующая процедура.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции:** Поскольку это эстетическое вмешательство, у вас всегда есть возможность от него отказаться.
- **Только субментальная липосакция (липосакция подбородка):** Может быть достаточной для людей с хорошей эластичностью кожи, у которых полнота обусловлена только подкожным жиром; она не устраняет глубокий жир и не корректирует мышцы или железы.
- **Инъекции, растворяющие жир (дезоксихолевая кислота), или аппаратные методы (радиочастотное воздействие, ультразвук):** Дают ограниченное улучшение при небольшой полноте и дряблости; обычно требуется несколько сеансов.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Ботулотоксин для смягчения тяжей платизмы:** Временно (на 3–4 месяца) уменьшает тяжи; не устраняет провисание и жир.
- **Более ограниченная подтяжка шеи:** Менее объёмные операции, при которых только удаляют избыток кожи или выполняют только платизмопластику; их эффект более ограничен.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, нынешний вид вашей шеи сохранится, а естественное старение будет продолжаться. Это не представляет угрозы для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови и при необходимости ЭКГ и другие исследования; вас осмотрит анестезиолог.
- **Очень важно, чтобы ваше артериальное давление было хорошо контролируемым.** Высокое давление значительно повышает риск скопления крови в области шеи (гематомы) после операции. Уточните у анестезиолога, нужно ли вам принять препарат от давления также утром в день операции (с глотком воды).
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (следуйте указаниям анестезиолога).
- Перед операцией избегайте интенсивных физических нагрузок, сауны и употребления большого количества алкоголя. В день операции не используйте макияж, украшения и цепочки на шее; возьмите с собой одежду с застёжкой спереди, которую не нужно надевать через голову.
- Рекомендуется, чтобы в первые 24–48 часов после операции рядом с вами кто-то находился.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24–48 часов	На шее будут повязка и дренаж. Вы будете ощущать отёк, стянутость и дискомфорт при глотании; боль обычно лёгкая или умеренная. Важно спать с приподнятой головой (30–45°), не сгибать шею чрезмерно и не допускать повышения давления (не натуживаться, держать кашель под контролем). Дренаж обычно удаляют на **1–2-й день**.
1-я неделя	Отёк и синяки, **если они появляются**, наиболее заметны именно в этот период, а затем начинают уменьшаться. Онемение шеи и области под подбородком — это нормально. **Компрессионное изделие/повязку для шеи** носят днём и ночью согласно рекомендациям. Швы снимают на **5–10-й день**.
2–4-я недели	Большинство пациентов возвращаются к сидячей работе и общественной жизни в течение 10–14 дней. Уплотнение, ощущение неровности и стянутость шеи могут

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	сохраняться. Интенсивных физических нагрузок, наклонов, подъёма тяжестей и движений, нагружающих шею, следует избегать не менее **3–4 недель**.
1–3-й месяцы	Оставшиеся отёк и уплотнение постепенно уменьшаются. Онемение в основном проходит. В этот период рубцы могут быть розовыми и слегка приподнятыми.
6–12-й месяцы	Становится виден окончательный результат; рубцы светлеют и становятся тоньше. Если коррекция будет сочтена необходимой, её обычно проводят не ранее чем через 6 месяцев.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Отёк шеи и области под подбородком; синяки, **если они появляются**, проходят в течение 1–3 недель
- Временное онемение кожи шеи и области вокруг ушей
- Стянутость и уплотнение шеи, лёгкий дискомфорт при глотании
- Лёгкая боль, зуд и розовые рубцы в местах разрезов
- Неровности и уплотнения, прощупываемые под кожей в первые недели

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Длительный отёк и уплотнение** — Уплотнение шеи и области под подбородком может сохраняться несколько месяцев; оно проходит благодаря массажу и со временем.
- **Небольшая асимметрия и неровности контура** — Могут сохраниться небольшие различия между двумя сторонами шеи или мелкие впадины/бугорки под кожей; большинство из них со временем сглаживаются, некоторые могут потребовать небольшой коррекции.
- **Серома (скопление жидкости)** — Скопление прозрачной жидкости под кожей; обычно лечится её откачиванием иглой в кабинете врача.
- **Необходимость коррекции** — Примерно **5–10 из каждых 100** пациентов может потребоваться небольшая коррекция из-за остаточной полноты, неровностей или рубцов.

Нечастые состояния

- **Гематома (скопление крови в области шеи)** — Возникает примерно у **2–5 из каждых 100** пациентов; чаще встречается **у мужчин и у людей с высоким артериальным давлением** и обычно появляется в первые 24 часа. Небольшие гематомы можно удалить иглой; при больших требуется **повторное взятие в операционную** для удаления крови и остановки кровотечения. Быстро увеличивающаяся гематома может **сдавить трахею и затруднить дыхание**; это требует неотложной помощи. Поздно распознанная гематома может нарушить кровоснабжение кожи и привести к проблемам с заживлением раны и рубцами.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Временная слабость движений нижней губы (краевая ветвь нижней челюсти / шейная ветвь лицевого нерва)** — Примерно у **1–10 из каждых 100** пациентов одна сторона нижней губы при улыбке может выглядеть асимметричной. В большинстве случаев это связано с натяжением нерва или отёком и проходит самостоятельно в течение **от нескольких недель до нескольких месяцев**.
- **Подтекание слюны / скопление слюны (сиалоцеле)** — У пациентов, которым уменьшали поднижнечелюстную железу, слюна может подтекать из железы и скапливаться под кожей. Обычно это проходит после повторных откачиваний иглой, наложения давящей повязки и при необходимости приёма лекарств; в редких случаях требуется дополнительное вмешательство.
- **Деформация из-за избыточного удаления тканей** — Удаление слишком большого количества жира или ткани железы может привести к образованию впадины в средней части шеи, выступанию мышц и «скелетированному» виду (деформация «шея кобры»). Для коррекции может потребоваться пересадка жира или повторная операция; поэтому ткани удаляют сбалансированно и контролируемо.
- **Заметные или широкие рубцы** — Рубцы под подбородком и за ушами в редких случаях могут утолщаться, расширяться или менять цвет. Их можно лечить инъекциями стероидов, силиконовым гелем или хирургической коррекцией рубца. Если разрез за ухом продолжается к линии роста волос, вдоль него волосы могут поредеть. Если разрезы делают вокруг мочки уха, мочка в редких случаях может выглядеть оттянутой вниз и вперёд; при необходимости выполняется небольшая коррекция.
- **Длительное онемение** — Снижение чувствительности шеи и области вокруг мочки уха может сохраняться несколько месяцев; в редких случаях оно может остаться частично стойким.
- **Инфекция** — Возникает у **от менее чем 1 до 2 из каждых 100** пациентов. Обычно проходит при лечении антибиотиками; в редких случаях требуется дренирование.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Нарушение кровоснабжения кожи и потеря ткани (некроз)** — Особенно у **курящих**, у людей с сахарным диабетом и у пациентов, у которых развилась гематома, возможны расхождение раны и потеря кожи по краям. Заживление затягивается, требуются перевязки, а иногда и дополнительная операция; может остаться стойкий рубец.
- **Стойкое повреждение нерва** — Стойкая слабость движений нижней губы возникает **менее чем у 1 из 100** пациентов. Очень редко могут пострадать нервы, которые двигают язык (подъязычный нерв) или обеспечивают чувствительность языка (язычный нерв), либо нерв, обеспечивающий чувствительность мочки уха (большой ушной нерв).
- **Проблемы с дыхательными путями и затруднение глотания** — В очень редких случаях из-за большой гематомы или выраженного отёка может потребоваться экстренное обеспечение проходимости дыхательных путей с последующим наблюдением в отделении интенсивной терапии. После коррекции глубоких структур может возникнуть временное затруднение глотания.
- **Повреждение кровеносного сосуда или слюнного протока** — Кровотечение из-за повреждения вен шеи или проблемы с протоком слюнной железы бывают очень редко; они могут потребовать дополнительного лечения или вмешательства.
- **Повторное провисание** — С годами шея может снова расслабиться из-за старения и изменений веса; это естественный процесс, а не осложнение. Со временем тяжи шейной мышцы также могут снова стать заметными. Выраженное раннее провисание бывает редко.
- **Психологическая неудовлетворённость** — Несмотря на технически успешный результат, человеку может быть трудно привыкнуть к своему новому виду. Открытое обсуждение ожиданий до операции снижает этот риск.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Быстро нарастающий отёк, напряжение или выраженное одностороннее увеличение** шеи, особенно в первые 24–48 часов
- **Затруднение дыхания, изменение голоса, невозможность глотать** или ощущение удушья (немедленно звоните 112)
- **Непрекращающееся кровотечение** под повязкой или быстрое увеличение количества крови в дренажной ёмкости
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающее покраснение, боль, ощущение жара или гной в местах разрезов
- **Потемнение, фиолетово-чёрный цвет** кожи или расхождение раны
- Внезапная сильная боль или боль, которая не проходит после приёма обезболивающих
- Одышка, боль в груди или односторонний отёк и боль в ноге

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 2 недели спите на спине с приподнятой головой; избегайте чрезмерного сгибания шеи, резких движений головой и шеей и наклонов вперёд.
- Носите компрессионное изделие/повязку для шеи в течение рекомендованного срока (обычно 1–3 недели).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Регулярно измеряйте артериальное давление и не пропускайте приём лекарств; избегайте натуживания, подъёма тяжестей и неконтролируемого кашля.
- В первые 3–4 недели избегайте интенсивных физических нагрузок, сауны, турецкой бани (хаммама) и горячего душа.
- Защищайте рубцы от солнца не менее 3–6 месяцев.
- Если вы приехали из-за рубежа, авиаперелёт обычно безопасен после удаления дренажа и проведения первых контрольных осмотров — как правило, начиная с 5–7-го дня.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.

☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.

☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.

☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.

☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.

☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.

☐ Я понимаю, что операция не останавливает старение, что со временем шея может снова расслабиться и что результат ограничен качеством моей кожи, моим весом и строением костей.

☐ Я понимаю, что контроль артериального давления и соблюдение послеоперационных указаний важны для снижения риска кровотечения (гематомы).

☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**

☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.