Modul 2 : Siapa yang Paling Beresiko? Fokus Pada Ibu Hamil dan Janin

Written by

Muhammad Farel Alfathir	240535607790
Ferdiansyah Dwana Putra Santoso	240535607961
Putu Alvin Mahendra Putra	240535606978
Qurrotul A'ini	240535603434

Siapa yang Paling Berisiko? Fokus pada Ibu Hamil dan Janin

Membicarakan risiko penyakit saat hamil memang sering kali membuat hati berdebar dan cemas. Namun, tarik napas dalam-dalam, karena tujuan modul ini bukanlah untuk menakut-nakuti Anda. Sebaliknya, modul ini ditulis dengan penuh empati untuk membekali Anda dengan "perisai" pengetahuan. Dengan mengenali siapa yang paling rentan terhadap *Toxoplasma gondii* dan bagaimana cara kerjanya, Anda bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat tanpa perlu menjauhi kucing kesayangan Anda secara berlebihan. Mari kita pahami bersama mengapa ibu hamil, janin, dan kelompok dengan imun rendah menjadi fokus utama dalam pencegahan infeksi ini.

Mengapa Ibu Hamil dan Janin Sangat Rentan?

Bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat, infeksi *Toxoplasma gondii* sering kali lewat tanpa disadari. Sistem kekebalan tubuh kita yang kuat akan melawan parasit ini dan memaksanya "tertidur" dalam bentuk kista di dalam otot, tanpa menimbulkan gejala berarti,.

Namun, ceritanya berbeda jika infeksi ini terjadi pada ibu hamil. Janin yang sedang berkembang di dalam rahim belum memiliki sistem kekebalan tubuh sendiri. Jika seorang ibu **baru pertama kali terinfeksi** pada saat ia sedang hamil (atau tepat sebelum pembuahan), parasit yang aktif di dalam darah ibu dapat menembus plasenta dan masuk ke tubuh janin. Inilah yang disebut dengan **Toxoplasmosis Kongenital** (bawaan lahir).

Kabar baiknya, jika ibu sudah pernah terinfeksi jauh sebelum hamil, tubuhnya sudah memiliki antibodi pelindung, sehingga janin di dalam kandungan akan aman,.

Risiko Infeksi Berdasarkan Trimester: Waktu Menentukan Dampak

Kapan tepatnya ibu terinfeksi selama kehamilan akan sangat menentukan seberapa besar risiko penularan ke janin dan seberapa parah dampaknya,,. Mari kita lihat perbedaannya:

- **Trimester Pertama (Bulan 1-3): Waspada Tertinggi** Jika ibu terinfeksi di awal kehamilan, risiko parasit berhasil menembus plasenta ke janin sebenarnya lebih kecil, yaitu sekitar **25%**. Namun, **jika penularan terjadi, dampaknya adalah yang paling parah dan fatal**. Pada fase ini, organ-organ penting janin baru mulai terbentuk. Infeksi dapat menyebabkan keguguran spontan atau kerusakan organ yang sangat berat,.
- **Trimester Kedua (Bulan 4-6): Risiko Menengah** Risiko parasit menular ke janin meningkat menjadi sekitar **54%**. Dampak pada janin mungkin tidak sefatal di trimester pertama, tetapi tetap berpotensi menimbulkan kelainan bawaan yang serius.
- **Trimester Ketiga (Bulan 7-9): Penularan Tinggi, Gejala Terselubung** Risiko penularan dari ibu ke janin di akhir kehamilan mencapai angka tertinggi, yakni sekitar **65%**. Uniknya, bayi yang tertular di trimester ini sering kali **tampak sehat dan normal saat dilahirkan** tanpa tanda-tanda sakit yang jelas,. Namun, masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan atau lambatnya perkembangan belajar bisa muncul bertahun-tahun kemudian saat anak tumbuh besar,,.

Dampak Nyata pada Sang Buah Hati

Kita harus menghadapi fakta medis dengan pikiran jernih. Jika tidak didiagnosis dan tidak diobati, *Toxoplasma* yang menginfeksi janin dapat

merusak sel-sel tubuh dengan cepat. Beberapa dampak serius pada bayi meliputi,,,:

- **Keguguran atau Lahir Mati (Stillbirth):** Terutama jika infeksi terjadi di awal kehamilan.
- **Gangguan Otak:** Seperti *Hidrosefalus* (penumpukan cairan di otak yang membuat kepala membesar) atau *Mikrosefali* (ukuran kepala yang sangat kecil karena otak tidak berkembang).
- **Gangguan Mata:** *Chorioretinitis* atau peradangan pada retina mata yang dapat memicu kebutaan permanen.
- **Gejala Fisik Lainnya:** Keterlambatan mental/intelektual, pembengkakan hati dan limpa, penyakit kuning (jaundice), dan epilepsi (kejang).

KOTAK PERINGATAN: DETEKSI DINI ADALAH KUNCI! Hanya sekitar 10% ibu hamil yang menunjukkan gejala saat terinfeksi (seperti demam, kelelahan, atau kelenjar getah bening bengkak di leher),. Sisanya merasa sehat-sehat saja! Inilah mengapa infeksi ini sangat berbahaya jika diabaikan. Jika Anda ragu atau merasa memiliki faktor risiko, segeralah berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk melakukan tes darah (TORCH/Toxoplasma). Pengobatan dengan antibiotik khusus selama kehamilan dapat secara drastis mengurangi kerusakan pada janin,.

Kelompok Rentan Lainnya: Imun Rendah & ODHA

Selain ibu hamil, ada satu kelompok lagi yang sangat berisiko, yaitu individu dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah (Immunocompromised). Ini termasuk,,:

1. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA).
2. Pasien kanker yang sedang menjalani terapi kemoterapi.
3. Pasien yang baru menerima transplantasi organ.

Pada kelompok ini, parasit *Toxoplasma* yang selama ini "tertidur" di dalam tubuh (dari infeksi masa lalu) dapat tiba-tiba bangun dan aktif kembali (*reaktivasi*). Karena tidak ada "tentara" imun yang melawannya, infeksi bisa menyebar dengan beringas, menyerang sistem saraf pusat dan otak, menyebabkan *meningoencephalitis* (radang otak), kejang, disorientasi, hingga kematian jika tidak segera ditangani,.

KOTAK TIPS PRAKTIS: UNTUK IBU HAMIL YANG MEMILIKI KUCING

Jangan panik dan membuang kucing Anda! Anda tetap bisa aman dengan langkah konkret berikut:

1. Delegasikan tugas: Mintalah suami atau anggota keluarga lain untuk menyendok pasir kotoran kucing (litter box) setiap hari. Parasit butuh waktu 1-5 hari untuk menetas di luar tubuh kucing, jadi buanglah setiap hari sebelum parasit itu menular!

2. Jika terpaksa mandiri: Gunakan sarung tangan karet sekali pakai dan masker wajah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir segera setelah selesai
3. Diet Kucing: Hanya beri kucing Anda makanan kering (dry food) atau kalengan yang sudah matang. Jangan pernah berikan daging mentah
4. Pelihara di dalam (Indoor): Jangan biarkan kucing keluar rumah agar mereka tidak berburu tikus atau burung liar yang membawa parasit

Mengapa Pengetahuan Ibu Hamil Masih Sangat Rendah?

Di balik tingginya angka infeksi, ada satu fakta sedih: minimnya edukasi. Sebuah survei komprehensif yang dilakukan oleh Jones et al. (2003) terhadap ibu hamil di Amerika Serikat menunjukkan tingkat ketidaktahuan yang membahayakan:

- Meskipun 48% ibu hamil mengaku pernah mendengar tentang toxoplasmosis, **hanya 7% yang sadar bahwa mereka pernah dites** untuk penyakit ini,.
- Pemahaman medisnya pun keliru: hanya 40% yang tahu bahwa ini adalah penyakit infeksi, sementara **21% ibu hamil mengira toxoplasmosis disebabkan oleh racun (poison)**,.
- Pemahaman soal risiko kucing cukup lumayan (sekitar 60% tahu), **tetapi** pemahaman tentang daging mentah sangat rendah. Hanya **30%** ibu hamil yang tahu bahwa parasit ini bisa bersembunyi di dalam daging yang dimasak kurang matang,.

Rendahnya literasi inilah yang menyebabkan tingginya kasus yang sebenarnya *100% bisa dicegah* melalui perubahan perilaku. Sebagai calon ibu cerdas, Anda kini selangkah lebih maju dari statistik ini!

Tabel: Ringkasan Dampak *Toxoplasma* Berdasarkan Trimester Kehamilan

Waktu Infeksi Ibu	Risiko Janin Tertular	Tingkat Keparahan pada Janin	Risiko/Dampak Nyata yang Mungkin Terjadi
Trimester 1	Rendah (~25%)	**Sangat Parah**	Keguguran, kelainan otak (hidrosefalus/mikrosefali), lahir mati
Trimester 2	Menengah (~54%)	Parah - Menengah	Kerusakan retina mata, gangguan perkembangan organ
Trimester 3	**Tinggi (~65%)**	Tampak Ringan (Saat Lahir)	Kebutaan lambat, keterlambatan intelektual muncul saat anak mulai besar

Ringkasan Poin Penting

1. Toxoplasma gondii sangat berbahaya jika menginfeksi ibu hamil (yang belum punya kekebalan) karena dapat merusak perkembangan organ vital janin.
2. Infeksi di trimester pertama memiliki risiko penularan yang lebih rendah, namun memberikan dampak kerusakan yang paling fatal (termasuk keguguran).
3. Bayi yang tertular di akhir kehamilan (trimester ketiga) sering kali terlihat sehat saat lahir, namun dapat mengalami masalah saraf dan kebutaan di kemudian hari.
4. Selain ibu hamil, penderita HIV/AIDS atau pasien kanker sangat berisiko mengalami reaktivasi parasit yang berujung pada radang otak mematikan.
5. Secara global 36,6% ibu hamil pernah terpapar, bahkan di wilayah tropis seperti Ethiopia mencapai 67-83%. Namun sayang, pengetahuan ibu hamil masih sangat rendah (banyak yang tidak tahu bahwa daging mentah adalah sumber utama, dan hanya 7% yang sadar pernah dites).

Sumber Referensi :

CDC., 2000. *Preventing Congenital Toxoplasmosis.*

Salari N. et al., 2025. *Global seroprevalence of Toxoplasma gondii in pregnant women: a systematic review and meta-analysis.*

Zemene E. et al., 2012. *Seroprevalence of Toxoplasma gondii and associated risk factors among pregnant women in Jimma town, Southwestern Ethiopia.*

Mulugeta S. et al., 2020. *Seroprevalence of Anti-Toxoplasma gondii Antibodies and Associated Factors Among Pregnant Women Attending Antenatal Care at Debre Markos Referral Hospital, Northwest Ethiopia.*

Jones J.L. et al., 2003. *Toxoplasmosis-related knowledge and practices among pregnant women in the United States.*