

Die Lebensraumnummer im Katalog gl_biotope.beschreibung_catalogue ist eine Klassierung nach Art der Lebensräume. Daraus sollte man die Lebensraumtypen des BAFU's ableiten können.

1.

Für die folgenden Biototypen

BIO_TYP1; Quellfluren, Gewässer
BIO_TYP2; Uferbereiche, Verlandungsgesellschaften
BIO_TYP3; Schluchtwälder, Wälder an Steilhängen und Trockenwälder
BIO_TYP4; Saumgesellschaften, Gebüsche und Heiden
BIO_TYP5; Fels-, Felsgrus- und Karstfluren sowie Schuttfluren
BIO_TYP6; Ackerbegleitvegetation, Ruderalfluren
BIO_TYP7; Anderer Biototyp

in den drei Modellen zu den «übrigen Biotopen...» (Flächen, Linien, Punkte) gibt es ein obligatorisches Attribut «BIO_TYP», ein Katalog mit sieben Einträgen, ich schlage aufgrund Lebensraumtypologie, die wir abgebildet haben ([vgl. auch rote Liste der Lebensräume der Schweiz von Infoflora, Anhang A1](#)), die Zuordnungen gemäss dem Feld bafu_bio_typ_uebr_biotope vor. Ist jetzt nicht wirklich systematisch, aber ein bisschen ;-))

2.

Für die Auen und die Hochmoore (teilweise) ist die Sache schwieriger, weil hier der Typ der Aue bzw. der Typ der Hochmoorfläche gemeint ist, d.h. wenn das Biotop eine Aue oder ein Hochmoor ist, dann müsste man dem Biotop diese Typen zuordnen

Bundeskataloge AU_TYP:

AU_TYP1	Fliessgewässer
AU_TYP2	Delta
AU_TYP3	Seeufer
AU_TYP4	Alpine Schwemmebene
AU_TYP5	Gletschervorfeld

Bundeskatalog HM_Typ

HM_TYP1	Primäre Hochmoorfläche
HM_TYP2	Sekundäre Hochmoorfläche
HM_TYP3	Hochmoorumfeld
HM_TYP4	Offene Wasserfläche
HM_TYP5	Vegetationslose Torffelder

Das Klassifikation, die nicht direkt aus den Vegetationsdaten ableitbar ist, weil z.B primäre Hochmoorfläche eine unbeeinflusste Fläche ist, die aber die gleiche Vegetation aufweisen kann wie eine sekundäre, beeinflusste und allenfalls wiederhergestellte Hochmoorfläche und in einem Delta kann die gleiche Vegetation (Silberweidenwald) vorkommen, wie in einer Flussaue.

Die HM_KE klassifikation ist ausserordentlich detailliert. Sie ist speziell für Hochmoore ausgerichtet und so wie ich das sehe auf Hochmoorstrukturen (Rüllen, Schlenken, Bulten, nackte Torflächen, beweideter Wald etc.) und nicht Pflanzengesellschaften ausgerichtet. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass KE1 bis KE6 (ich meine das KE stehe für Kartiereinheit) und KE21 bis KE26 identisch bezeichnet sind

Ich meine das Modell sieht vor, dass man bei der Felderhebung den HM_Typ definiert und dann die jeweilige Kartiereinheit zuordnet. Das Modell wurde höchstwahrscheinlich von Hochmoorexperten erstellt. Sehr speziell und schlecht nicht generalisierbar und irgendwo integrierbar.

HM_KE1	Bultgesellschaften
HM_KE2	Schlenkengesellschaften
HM_KE3	Bergföhrenhochmoor
HM_KE4	Rüllengesellschaften
HM_KE5	Birken- und Fichtenmoore

HM_KE6	Hochmoormischvegetation
HM_KE7	Wald
HM_KE8	Waldweide
HM_KE9	Weide
HM_KE10	Gebüsch,Aufforstung
HM_KE11	Niedermoor,Verlandung
HM_KE12	Wasserflächen
HM_KE13	Torffelder
HM_KE14	Dauerwiese,Matte
HM_KE15	Acker,Kunstwiese
HM_KE16	Siedlung,Garten
HM_KE17	Dolinen
HM_KE18	Mischvegetation
HM_KE19	Hochstaudenfluren
HM_KE20	Deponie,Aufschüttung
HM_KE21	Bultgesellschaften
HM_KE22	Schlenkengesellschaften
HM_KE23	Bergföhrenhochmoor
HM_KE24	Rüllengesellschaften
HM_KE25	Birken- und Fichtenmoore
HM_KE26	Hochmoormischvegetation

Mein Vorschlag:

Bei den produktiven Daten füge ich bei der Tabelle biotope_gl_sf drei Spalten zusätzlich ein, um die Klassifikation für Hochmoore und Auen abzubilden.

bafu_au_biotyp
bafu_hm_biottyp
bafu_hm_ke

Dann müsste man das noch im Modell als zusätzliche Informationen abbilden. Mit einer zusätzliche Klasse, die Attribute enthält, die der Bund für die jeweiligen Biotope zusätzlich benötigt? Könnte man dann flexibel ausbauen und die Daten da ablegen, auch wenn die fast immer leer sind, weil es nun ja wirklich nicht die häufigsten Biotoptypen sind und die Kartierungen für nicht national bedeutsame Auen und Hochmoore bei uns nie diese Tiefe aufweisen.

Eine Excel-Tabelle mit dem Versuch der Zuweisung für Ziffer 1 hänge ich (endlich!) an. Sollen wir den Katalog mit einer entsprechenden Spalte ergänzen?