```
ОТЧЁТ: Метод верхней релаксации (SOR)
======================================================

Размерность: n = 5

Матрица A:
    188.5879     -0.0453    182.4665    -60.9656    -36.6119
     -0.0453    116.2801      8.7592     -4.2958    -18.2445
    182.4665      8.7592    262.1738     21.1843    -37.7023
    -60.9656     -4.2958     21.1843    222.3260     29.0666
    -36.6119    -18.2445    -37.7023     29.0666    111.0754

Вектор b:
  -1264.5174    -97.0628  -1898.3739   -624.4453    392.7029

------------------------------------------------------
ρ(T = I − D⁻¹A) = 0.99335788
Формула оптимального ω применима
ω = 1.79361621

Статус: СОШЁЛСЯ за 163 итераций
Начальная невязка ||r₀|| = 2.3992e+03
Финальная невязка ||r||  = 8.5277e-13

Найденное решение x:
  x[0] =      -3.0536129215
  x[1] =      -0.3327899627
  x[2] =      -4.5619623421
  x[3] =      -3.4571050793
  x[4] =       1.8304895324

Точное решение x_true:
  x[0] =      -3.0536129215
  x[1] =      -0.3327899627
  x[2] =      -4.5619623421
  x[3] =      -3.4571050793
  x[4] =       1.8304895324

||x_sor − x_true|| = 1.0591e-14

Проверка: ||Ax − b|| = 8.5277e-13

======================================================
```