

Gradient Descent for Linear Regression

Parameter Learning

Gradient descent algorithm

repeat until convergence {
 $\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta_0, \theta_1)$
 (for $j = 1$ and $j = 0$)
}

Linear Regression Model

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Gradient descent algorithm

repeat until convergence {
 $\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta_0, \theta_1)$
 (for $j = 1$ and $j = 0$)
}

Linear Regression Model

$$\underline{h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x}$$

$$\underline{J(\theta_0, \theta_1)} = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

$$\min_{\theta_0, \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta_0, \theta_1) = \frac{2}{2\theta_j} \cdot \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} \underline{J(\theta_0, \theta_1)} = \frac{2}{2\theta_j} \cdot \underline{\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\underline{h_{\theta}(x^{(i)})} - y^{(i)})^2}$$

$$= \frac{2}{2\theta_j} \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\underline{\theta_0 + \theta_1 x^{(i)}} - y^{(i)})^2$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta_0, \theta_1) = \frac{\partial}{\partial \theta_j} \cdot \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\underline{h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}})^2$$

$$= \frac{\partial}{\partial \theta_j} \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\underline{\theta_0 + \theta_1 x^{(i)} - y^{(i)}})^2$$

$$\theta_0, j = 0 : \underline{\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})$$

$$\theta_1, j = 1 : \underline{\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)}$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Gradient descent algorithm

repeat until convergence {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)}$$

}

Gradient descent algorithm

$$\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)$$

repeat until convergence {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \right]$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)}$$

}

Gradient descent algorithm

repeat until convergence {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \right]$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)} \right]$$

}

$$\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$$

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Gradient descent algorithm

repeat until convergence {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \right]$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)} \right]$$

}

$$\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)$$


$$\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$$

update
 θ_0 and θ_1
simultaneously


Recall that the initial points are important!

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

However we are
lucky!
The cost function of
the LR is...



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.




Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Cost function of the LR

- Convex function.
- It's a bowl shaped function.
- Always converges to global optimum.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$\underline{h_{\theta}(x)}$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$\underline{J(\theta_0, \theta_1)}$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$

(function of the parameters θ_0, θ_1)




Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

07:02


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$


(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.


$$h_{\theta}(x)$$

(for fixed θ_0, θ_1 , this is a function of x)



$$J(\theta_0, \theta_1)$$

(function of the parameters θ_0, θ_1)



Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Gradient Descent for LR

- Batch Gradient Descent:
- Batch: Each step of gradient descent uses all training examples.

Which of the following are true statements? Select all that apply.

- ☐ To make gradient descent converge, we must slowly decrease α over time.
- ☐ Gradient descent is guaranteed to find the global minimum for any function $J(\theta_0, \theta_1)$.
- ☐ Gradient descent can converge even if α is kept fixed. (But α cannot be too large, or else it may fail to converge.)
- ☐ For the specific choice of cost function $J(\theta_0, \theta_1)$ used in linear regression, there are no local optima (other than the global optimum).