Pembahasan Soal

Tryout ETS Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$3 \leq \frac{x^2+2}{x} < x+2$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan ganda, garis bilangan, irisan himpunan.

Penyelesaian:

Pertidaksamaan ganda tersebut dapat dipecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu


$$\boxed{3 \leq \frac{x^2+2}{x}} \quad \text{dan} \quad \boxed{\frac{x^2+2}{x} < x+2}.$$

Diperhatikan bahwa $x \neq 0$ karena x berada pada penyebut.

(i) Untuk $3 \leq \frac{x^2+2}{x}$, pindahkan semua suku ke ruas kiri sehingga ruas kanan bernilai nol:

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{x} - 3 &\geq 0 \\ \frac{x^2+2-3x}{x} &\geq 0 \\ \frac{(x-1)(x-2)}{x} &\geq 0. \end{aligned}$$

Pembuat nolnya adalah $x = 0$, $x = 1$, dan $x = 2$. Dengan uji titik, misalkan $x = -1$ diperoleh $\frac{(-2)(-3)}{-1} < 0$, $x = \frac{1}{2}$ diperoleh $\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{\frac{1}{2}} > 0$, $x = \frac{3}{2}$ diperoleh $\frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{\frac{3}{2}} < 0$, dan $x = 3$ diperoleh $\frac{(2)(1)}{3} > 0$.




Karena yang diminta lebih dari atau sama dengan nol, diperoleh $\boxed{HP_1 = (0,1] \cup [2,\infty)}$.

(ii) Untuk $\frac{x^2+2}{x} < x+2$, dengan cara yang sama diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{x} - (x+2) &< 0 \\ \frac{x^2+2-x^2-2x}{x} &< 0 \\ \frac{2(1-x)}{x} &< 0. \end{aligned}$$

Pembuat nolnya adalah $x = 0$ dan $x = 1$. Dengan uji titik, misalkan $x = -1$ diperoleh $\frac{2(2)}{-1} < 0$, $x = \frac{1}{2}$ diperoleh $\frac{2(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}} > 0$, dan $x = 2$ diperoleh $\frac{2(-1)}{2} < 0$.



Karena yang diminta kurang dari nol, diperoleh $\boxed{HP_2 = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)}$.

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ganda adalah irisan dari kedua himpunan tersebut, yaitu

$$HP_1 \cap HP_2 = \big((0,1] \cup [2,\infty)\big) \cap \big((-\infty,0) \cup (1,\infty)\big) = [2,\infty).$$

Sebagai pengecekan, untuk $x = 2$ diperoleh $\frac{4+2}{2} = 3$, dan berlaku $3 \leq 3 < 4$. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{\{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\} = [2,\infty)}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ dan $g(x) = 3 - \sqrt{x}$.

   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x + 2 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2\}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3 - \sqrt{x}) = \frac{1}{(3-\sqrt{x})+2} = \boxed{\frac{1}{5-\sqrt{x}}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, \infty) : 3 - \sqrt{x} \neq -2\}}.$$

Karena $3 - \sqrt{x} = -2$ jika dan hanya jika $\sqrt{x} = 5$, yang berarti $x = 25$, didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = [0, \infty) \setminus \{25\} = [0, 25) \cup (25, \infty)}.$$

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.

   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (c) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

   Kata kunci materi: fungsi satu-satu, setengah lingkaran, fungsi invers, domain dan range.
   Penyelesaian:

   (a) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif). Diperhatikan bahwa jika $y = 1 + \sqrt{4 - x^2}$, maka $y - 1 = \sqrt{4 - x^2} \geq 0$ dan

   $$(y-1)^2 = 4 - x^2 \iff \boxed{x^2 + (y-1)^2 = 4}, \quad y \geq 1,$$

   sehingga grafik f adalah setengah lingkaran bagian atas dengan pusat $(0, 1)$ dan jari-jari 2. Grafik ini naik pada $[-2, 0]$ dan turun pada $[0, 2]$, sehingga jika domainnya memuat titik di kiri dan kanan $x = 0$, fungsi f tidak satu-satu (misalnya $f(-1) = f(1) = 1 + \sqrt{3}$). Agar f satu-satu pada $[a, 2]$, haruslah $a \geq 0$. Jadi nilai terkecil a adalah $\boxed{a = 0}$.

   (b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \in [0, 2]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

   $$\begin{aligned} y &= 1 + \sqrt{4 - x^2} \\ y - 1 &= \sqrt{4 - x^2} \\ (y-1)^2 &= 4 - x^2 \\ x^2 &= 4 - (y-1)^2 \\ x &= \sqrt{4 - (y-1)^2} \quad \text{(karena } x \geq 0\text{)}. \end{aligned}$$

   Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt{4 - (y-1)^2}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

   $$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{4 - (x-1)^2} = \sqrt{3 + 2x - x^2}}.$$

   (c) Pada domain $[0, 2]$, fungsi f turun dari $f(0) = 1 + \sqrt{4} = 3$ sampai $f(2) = 1 + \sqrt{0} = 1$, sehingga range dari f adalah $R(f) = [1, 3]$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu

   $$\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [1, 3]} \quad \text{dan} \quad \boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [0, 2]}.$$

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-27}{3x-9}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 3$.

   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

   i. $f(a)$ terdefinisi

   ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$

   iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x = 3$, $\boxed{f(3) = k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = 3$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 3$ tetapi $x \neq 3$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3} \frac{x^3-27}{3x-9} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{3(x-3)} = \lim_{x\to 3} \frac{x^2+3x+9}{3} = \frac{9+9+9}{3} = \boxed{9}.$$

   Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\boxed{\lim\limits_{x\to 3} f(x) = f(3)}$, sehingga diperoleh $\boxed{k = 9}$.

   (b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 3$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3-27}{3x-9} = \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{3(x-3)} = \frac{x^2+3x+9}{3} = \frac{1}{3}x^2 + x + 3.$$

   Untuk $x = 3$, nilai polinomial tersebut adalah $\frac{1}{3}(9) + 3 + 3 = 9 = k$. Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 3$ jika $k = 9$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{3}x^2 + x + 3}.$$

5. Diberikan fungsi implisit $x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - y = 3$.

   (a) Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(2, 1)$.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik tersebut.

   Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan perkalian, aturan rantai, persamaan garis singgung.
   Penyelesaian:

   (a) Kita turunkan kedua ruas persamaan terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x (yaitu $y = y(x)$). Dengan aturan rantai, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(2y^2) = 4y\dfrac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan perkalian, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(3xy) = 3y + 3x\dfrac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(2y^2) - \frac{d}{dx}(3xy) + \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}(3)$$
$$2x + 4y\frac{dy}{dx} - 3y - 3x\frac{dy}{dx} + 2 - \frac{dy}{dx} = 0.$$

Selanjutnya, kumpulkan semua suku yang mengandung $\frac{dy}{dx}$ di satu ruas:

$$(4y - 3x - 1)\frac{dy}{dx} = 3y - 2x - 2$$
$$\frac{dy}{dx} = \boxed{\frac{3y - 2x - 2}{4y - 3x - 1}}.$$

Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(2, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $2^2 + 2(1)^2 - 3(2)(1) + 2(2) - 1 = 4 + 2 - 6 + 4 - 1 = 3$. Selanjutnya, substitusi titik $(2, 1)$ ke dalam turunan:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,1)} = \frac{3(1) - 2(2) - 2}{4(1) - 3(2) - 1} = \frac{-3}{-3} = \boxed{1}.$$

(b) Gradien garis singgung di titik $(2, 1)$ adalah $m = 1$. Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (2, 1)$, diperoleh

$$y - 1 = 1(x - 2)$$
$$y = x - 1.$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(2, 1)$ adalah $\boxed{y = x - 1}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diketahui garis $g_1 : y = -2x + 8$ dan garis $g_2 : y = x + 2$.

   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

   (b) Tentukan titik potong g_1 dan g_2 masing-masing dengan garis $x = 4$.


   (c) Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 4$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

   Kata kunci materi: persamaan garis, titik potong garis, luas segitiga.
   Penyelesaian:

   (a) Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu $-2x+8 = x + 2$, sehingga $6 = 3x$, dan diperoleh $x = 2$. Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam salah satu persamaan garis, misalkan g_2, diperoleh $y = 2 + 2 = 4$. Jadi titik potong kedua garis adalah $\boxed{(2, 4)}$, misalkan sebagai titik A.

   (b) Untuk menentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 4$, substitusi $x = 4$ ke dalam persamaan g_1, yaitu $y = -2(4) + 8 = 0$. Jadi titik potong g_1 dengan garis $x = 4$ adalah $\boxed{(4, 0)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik B.
   Untuk menentukan titik potong g_2 dengan garis $x = 4$, substitusi $x = 4$ ke dalam persamaan g_2, yaitu $y = 4+2 = 6$. Jadi titik potong g_2 dengan garis $x = 4$ adalah $\boxed{(4, 6)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik C.

   (c) Dengan melakukan plot titik-titik potong tersebut dan menarik garis di antara dua titik potong, didapatkan sketsa dari ketiga garis dan segitiga tersebut adalah sebagai berikut



Pandang garis BC sebagai alas segitiga, sehingga panjang alasnya adalah $|6-0| = \boxed{6}$. Selanjutnya, pandang titik A sebagai titik puncak segitiga, sehingga tinggi segitiga adalah jarak dari titik A ke garis BC, yaitu jarak dari titik $(2, 4)$ ke garis $x = 4$, yang panjangnya adalah $|4 - 2| = \boxed{2}$. Dengan demikian, luas segitiga tersebut adalah

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = \boxed{6}.$$

2. Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9}$ dan $g(x) = \sqrt{x + 2}$.

   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -3,\ x \neq 3\} = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif, yaitu $x + 2 \geq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -2\} = [-2, \infty)}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x + 2}) = \frac{1}{(\sqrt{x + 2})^2 - 9} = \frac{1}{x + 2 - 9} = \boxed{\frac{1}{x - 7}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [-2, \infty) : \sqrt{x+2} \neq \pm 3\}.$$

Karena $\sqrt{x+2} \geq 0$, maka $\sqrt{x+2} \neq -3$ selalu berlaku. Selanjutnya, $\sqrt{x+2} = 3$ jika dan hanya jika $x + 2 = 9$, yang berarti $x = 7$. Didapatkan

$$D(f \circ g) = [-2, \infty) \setminus \{7\} = [-2, 7) \cup (7, \infty).$$

Catatan: meskipun bentuk akhir $\frac{1}{x-7}$ terdefinisi untuk $x < -2$, nilai-nilai tersebut tidak termasuk domain karena $g(x)$ tidak terdefinisi di sana.

3. Diberikan fungsi sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{2}{x-1}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{x+2}{x}$$

(a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.

(b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi rasional, fungsi invers, fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Fungsi $f(x) = \frac{2}{x-1}$ terdefinisi untuk $x - 1 \neq 0$, sehingga $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Untuk menentukan range, misalkan $y = \frac{2}{x-1}$, maka

$$y(x-1) = 2 \iff x - 1 = \frac{2}{y} \iff x = 1 + \frac{2}{y}.$$

Nilai x tersebut ada untuk setiap $y \neq 0$ (dan memang $\frac{2}{x-1}$ tidak pernah bernilai nol karena pembilangnya $2 \neq 0$). Jadi $R(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Fungsi $g(x) = \frac{x+2}{x}$ terdefinisi untuk $x \neq 0$, sehingga $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Diperhatikan bahwa $g(x) = \frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$. Karena $\frac{2}{x}$ dapat bernilai sebarang bilangan real kecuali nol, maka $g(x)$ dapat bernilai sebarang bilangan real kecuali 1. Jadi $R(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

(b) Dua fungsi f dan g saling invers jika

$$(f \circ g)(x) = x, \ \forall x \in D(g) \quad \text{dan} \quad (g \circ f)(x) = x, \ \forall x \in D(f).$$

Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 0$,

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{x+2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{x+2}{x} - 1} = \frac{2}{\frac{x+2-x}{x}} = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x,$$

dan untuk $x \neq 1$,

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{2}{x-1}\right) = \frac{\frac{2}{x-1} + 2}{\frac{2}{x-1}} = \frac{\frac{2+2(x-1)}{x-1}}{\frac{2}{x-1}} = \frac{2x}{2} = x.$$

Selain itu, dari (a) terlihat bahwa $D(f) = R(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ dan $R(f) = D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Jadi f dan g saling invers, yaitu $g = f^{-1}$ dan $f = g^{-1}$.

4. Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 1, & x < 2 \\ 3x + k, & x \geq 2 \end{cases}$$

kontinu di $x = 2$.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit sepihak, fungsi sepotong-sepotong.

Penyelesaian:

Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

(a) $f(a)$ terdefinisi

(b) $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

(c) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$ digunakan rumus $3x + k$, sehingga $\boxed{f(2) = 6 + k \text{ terdefinisi}}$. Selanjutnya, limit kiri dan limit kanannya adalah

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} (kx^2 - 1) = 4k - 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (3x + k) = 6 + k.$$

Agar f kontinu di $x = 2$, haruslah $\boxed{\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = f(2)}$, sehingga

$$4k - 1 = 6 + k \implies 3k = 7 \implies k = \frac{7}{3}.$$

Jadi nilai k yang membuat f kontinu di $x = 2$ adalah $\boxed{k = \frac{7}{3}}$. Sebagai pengecekan, untuk $k = \frac{7}{3}$ diperoleh $4\left(\frac{7}{3}\right) - 1 = \frac{25}{3}$ dan $6 + \frac{7}{3} = \frac{25}{3}$.

5. Dapatkan $f'(x)$ untuk $x > \frac{1}{2}$, dimana $f(x) = \sqrt{\dfrac{(2x-1)^3}{x}}$.

Kata kunci materi: turunan fungsi, aturan perkalian, aturan rantai.

Penyelesaian:

Karena $x > \frac{1}{2}$, maka $2x - 1 > 0$ dan $x > 0$, sehingga fungsi dapat ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu

$$f(x) = \frac{(2x-1)^{3/2}}{x^{1/2}} = \boxed{(2x-1)^{3/2} \cdot x^{-1/2}}.$$

Ingat kembali aturan perkalian, yaitu $\boxed{(uv)' = u'v + uv'}$. Misalkan $u = (2x-1)^{3/2}$ dan $v = x^{-1/2}$. Dengan aturan rantai diperoleh

$$\boxed{u' = \frac{3}{2}(2x-1)^{1/2} \cdot 2 = 3(2x-1)^{1/2}} \quad \text{dan} \quad \boxed{v' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(2x-1)^{1/2}x^{-1/2} + (2x-1)^{3/2}\left(-\frac{1}{2}x^{-3/2}\right) \\ &= (2x-1)^{1/2}x^{-3/2}\left[3x - \frac{1}{2}(2x-1)\right] \\ &= (2x-1)^{1/2}x^{-3/2} \cdot \frac{6x-2x+1}{2} \\ &= \boxed{\frac{(4x+1)\sqrt{2x-1}}{2x\sqrt{x}}}. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2-2x-8}{x^2-4x+3} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2-2x-8}{x^2-4x+3} = \frac{(x-4)(x+2)}{(x-1)(x-3)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x-4=0 & \vee & x+2=0 & \vee & x-1=0 & \vee & x-3=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-2} & \vee & \boxed{x=1} & \vee & \boxed{x=3} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+2)}{(x-1)(x-3)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -2$, misalkan $x = -3$:

$$\frac{(-3-4)(-3+2)}{(-3-1)(-3-3)} = \frac{(-7)(-1)}{(-4)(-6)} = \frac{7}{24} > 0$$

- Untuk $-2 < x < 1$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{(0-4)(0+2)}{(0-1)(0-3)} = \frac{(-4)(2)}{(-1)(-3)} = \frac{-8}{3} < 0$$

- Untuk $1 < x < 3$, misalkan $x = 2$:


$$\frac{(2-4)(2+2)}{(2-1)(2-3)} = \frac{(-2)(4)}{(1)(-1)} = 8 > 0$$

- Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

$$\frac{(3.5-4)(3.5+2)}{(3.5-1)(3.5-3)} = \frac{(-0.5)(5.5)}{(2.5)(0.5)} = \frac{-2.75}{1.25} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-4)(5+2)}{(5-1)(5-3)} = \frac{(1)(7)}{(4)(2)} = \frac{7}{8} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -2$ dan $x = 4$). Pembuat nol dari penyebut ($x = 1$ dan $x = 3$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -2$ atau $1 < x < 3$ atau $x \geq 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -2] \cup (1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 3 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x + 1 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x+1}\right) = 3 - \sqrt{\frac{1}{x+1}} = \boxed{3 - \frac{1}{\sqrt{x+1}}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq -1 : \frac{1}{x+1} \geq 0\right\}}.$$

Karena pembilangnya bernilai $1 > 0$, maka $\frac{1}{x+1} \geq 0$ jika dan hanya jika $x + 1 > 0$, yang berarti $x > -1$. Didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = (-1, \infty)}.$$

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = x^2 + 4x - 5$ and $g(x) = x + 2$ for $x \neq -2$.
   Kata kunci materi: turunan, aturan pembagian.
   Penyelesaian:
   Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}.$$

   Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 4x - 5) = 2x + 4}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{d}{dx}(x + 2) = 1}$$

   Dengan demikian, turunan dari $\frac{f}{g}$ adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \frac{(2x+4)(x+2) - (x^2+4x-5)(1)}{(x+2)^2} \\ &= \frac{(2x^2+8x+8) - (x^2+4x-5)}{(x+2)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^2+4x+13}{(x+2)^2}}.\end{aligned}$$

4. Given $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3+27}{x+3}, & x \neq -3 \\ 3k, & x = -3 \end{cases}$.
   a. Determine k such that $f(x)$ is continuous at $x = -3$.
   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah
      i. $f(a)$ terdefinisi
      ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$
      iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x = -3$, $\boxed{f(-3) = 3k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = -3$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = -3$ tetapi $x \neq -3$, dan dengan rumus $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to -3} f(x) = \lim_{x\to -3} \frac{x^3+27}{x+3} = \lim_{x\to -3} \frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x+3} = \lim_{x\to -3}(x^2-3x+9) = 9+9+9 = \boxed{27}.$$

   Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim\limits_{x\to -3} f(x) = f(-3)$, sehingga diperoleh $27 = 3k$, dan didapatkan $\boxed{k = 9}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq -3$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3 + 27}{x + 3} = \frac{(x+3)(x^2 - 3x + 9)}{x + 3} = x^2 - 3x + 9.$$

Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = -3$ jika $k = 9$, yaitu $f(-3) = 27$, yang sama dengan nilai polinomial di atas saat $x = -3$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = x^2 - 3x + 9}.$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 - 2y - 3$. (Explain the process).

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

Penyelesaian:

Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 - 2y - 3$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 - 2y - 3 \\ &= (y^2 - 2y + 1) - 1 - 3 \\ &= \boxed{(y-1)^2 - 4}. \end{aligned}$$


Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y - 1$ berarti menggeser grafik sejauh 1 satuan ke atas, dan menambahkan konstanta -4 pada x berarti menggeser grafik sejauh 4 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 1 satuan ke atas, sehingga diperoleh kurva $x = (y-1)^2$ dengan titik puncak $(0, 1)$.

(iii) Geser kurva $x = (y-1)^2$ sejauh 4 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y-1)^2 - 4$ dengan titik puncak $\boxed{(-4, 1)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = -3$, yaitu titik $(-3, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y-1)^2 = 4$, yaitu $y = -1$ dan $y = 3$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 - 2y - 3$ adalah

parabola $x = y^2$ yang digeser 1 satuan ke atas dan 4 satuan ke kiri.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2+2x-15}{x^2-x-2} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2+2x-15}{x^2-x-2} = \frac{(x+5)(x-3)}{(x-2)(x+1)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x+5=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-5} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x+5)(x-3)}{(x-2)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -5$, misalkan $x = -6$:

$$\frac{(-6+5)(-6-3)}{(-6-2)(-6+1)} = \frac{(-1)(-9)}{(-8)(-5)} = \frac{9}{40} > 0$$

- Untuk $-5 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2+5)(-2-3)}{(-2-2)(-2+1)} = \frac{(3)(-5)}{(-4)(-1)} = \frac{-15}{4} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:


$$\frac{(0+5)(0-3)}{(0-2)(0+1)} = \frac{(5)(-3)}{(-2)(1)} = \frac{15}{2} > 0$$

- Untuk $2 < x < 3$, misalkan $x = 2.5$:

$$\frac{(2.5+5)(2.5-3)}{(2.5-2)(2.5+1)} = \frac{(7.5)(-0.5)}{(0.5)(3.5)} = \frac{-3.75}{1.75} < 0$$

- Untuk $x > 3$, misalkan $x = 4$:

$$\frac{(4+5)(4-3)}{(4-2)(4+1)} = \frac{(9)(1)}{(2)(5)} = \frac{9}{10} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -5$ dan $x = 3$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -1$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -5$ atau $-1 < x < 2$ atau $x \geq 3$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -5] \cup (-1, 2) \cup [3, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 1 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \dfrac{4}{x-2}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 2 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 2\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{4}{x-2}\right) = 1 - \sqrt{\frac{4}{x-2}} = \boxed{1 - \frac{2}{\sqrt{x-2}}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq 2 : \frac{4}{x-2} \geq 0\right\}}.$$

Karena pembilangnya bernilai $4 > 0$, maka $\frac{4}{x-2} \geq 0$ jika dan hanya jika $x - 2 > 0$, yang berarti $x > 2$. Didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = (2, \infty)}.$$

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$ and $g(x) = x - 2$ for $x \neq 2$.
   Kata kunci materi: turunan, aturan pembagian.
   Penyelesaian:
   Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}.$$

   Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2 - 5x - 2) = 6x - 5}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{d}{dx}(x - 2) = 1}$$

   Dengan demikian, turunan dari $\frac{f}{g}$ adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \frac{(6x-5)(x-2) - (3x^2-5x-2)(1)}{(x-2)^2} \\ &= \frac{(6x^2 - 17x + 10) - (3x^2 - 5x - 2)}{(x-2)^2} \\ &= \frac{3x^2 - 12x + 12}{(x-2)^2} \\ &= \frac{3(x-2)^2}{(x-2)^2} \\ &= \boxed{3}, \quad x \neq 2.\end{aligned}$$

   Hasil ini masuk akal, karena $f(x) = 3x^2 - 5x - 2 = (3x + 1)(x - 2)$, sehingga untuk $x \neq 2$ berlaku $\frac{f(x)}{g(x)} = 3x + 1$ yang turunannya adalah 3.

4. Given $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 1}{2x - 2}, & x \neq 1 \\ 3k, & x = 1 \end{cases}$.

   a. Determine k such that $f(x)$ is continuous at $x = 1$.

   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

   i. $f(a)$ terdefinisi

   ii. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

   iii. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x = 1$, $\boxed{f(1) = 3k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = 1$ artinya nilai

fungsi di sekitar $x = 1$ tetapi $x \neq 1$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{2x-2} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{2(x-1)} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+x+1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$, sehingga diperoleh $\frac{3}{2} = 3k$, dan didapatkan $\boxed{k = \frac{1}{2}}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 1$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3-1}{2x-2} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{2(x-1)} = \frac{x^2+x+1}{2} = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}.$$

Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 1$ jika $k = \frac{1}{2}$, yaitu $f(1) = \frac{3}{2}$, yang sama dengan nilai polinomial di atas saat $x = 1$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}.$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 6y + 5$. (Explain the process).

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

Penyelesaian:

Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 + 6y + 5$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 + 6y + 5 \\ &= (y^2 + 6y + 9) - 9 + 5 \\ &= \boxed{(y+3)^2 - 4}. \end{aligned}$$


Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y + 3$ berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke bawah, dan menambahkan konstanta -4 pada x berarti menggeser grafik sejauh 4 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 3 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $x = (y+3)^2$ dengan titik puncak $(0, -3)$.

(iii) Geser kurva $x = (y+3)^2$ sejauh 4 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y+3)^2 - 4$ dengan titik puncak $\boxed{(-4, -3)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 5$, yaitu titik $(5, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y + 3)^2 = 4$, yaitu $y = -1$ dan $y = -5$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 + 6y + 5$ adalah

parabola $x = y^2$ yang digeser 3 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan penyelesaian dari $|x+1| = |2x-3| + 1$.

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pembagian kasus.

   Penyelesaian:

   Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu

   $$|x+1| = \begin{cases} x+1, & x \geq -1 \\ -(x+1), & x < -1 \end{cases} \quad \text{dan} \quad |2x-3| = \begin{cases} 2x-3, & x \geq \frac{3}{2} \\ -(2x-3), & x < \frac{3}{2} \end{cases}.$$

   Titik-titik batasnya adalah $\boxed{x = -1}$ dan $\boxed{x = \frac{3}{2}}$, sehingga garis bilangan terbagi menjadi tiga kasus.

   (i) Jika $x < -1$, maka persamaan menjadi

   $$-(x+1) = -(2x-3) + 1 \iff -x - 1 = -2x + 4 \iff x = 5.$$

   Namun $x = 5$ tidak memenuhi syarat $x < -1$, sehingga $\boxed{\text{tidak ada solusi}}$ pada kasus ini.

   (ii) Jika $-1 \leq x < \frac{3}{2}$, maka persamaan menjadi

   $$x + 1 = -(2x-3) + 1 \iff x + 1 = -2x + 4 \iff 3x = 3 \iff x = 1.$$

   Karena $-1 \leq 1 < \frac{3}{2}$, maka $\boxed{x = 1}$ memenuhi.

   (iii) Jika $x \geq \frac{3}{2}$, maka persamaan menjadi

   $$x + 1 = (2x-3) + 1 \iff x + 1 = 2x - 2 \iff x = 3.$$

   Karena $3 \geq \frac{3}{2}$, maka $\boxed{x = 3}$ memenuhi.

   Sebagai pengecekan, untuk $x = 1$ diperoleh $|2| = 2$ dan $|-1|+1 = 2$, sedangkan untuk $x = 3$ diperoleh $|4| = 4$ dan $|3| + 1 = 4$. Jadi penyelesaiannya adalah $\boxed{x = 1 \text{ atau } x = 3}$, atau ditulis $HP = \{1, 3\}$.

2. Diberikan titik $A(1, -2)$, $B(-1, 3)$ dan $C(3, 1)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C.

   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis yang melalui B dan C.

Kata kunci materi: gradien garis, garis sejajar, garis tegak lurus, persamaan garis.
Penyelesaian:
Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dengan substitusi $B(-1, 3)$ dan $C(3, 1)$, diperoleh

$$m_{BC} = \frac{1-3}{3-(-1)} = \frac{-2}{4} = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

(a) Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama, yaitu $\boxed{m_1 = m_2}$, sehingga gradien garis yang dicari adalah $m = -\frac{1}{2}$. Garis tersebut melalui titik $A(1, -2)$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - (-2) &= -\frac{1}{2}(x-1) \\ y + 2 &= -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\ y &= -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garisnya adalah $\boxed{y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}}$ atau $x + 2y + 3 = 0$.

(b) Dua garis saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$, sehingga gradien garis yang dicari memenuhi $-\frac{1}{2} \cdot m = -1$, yaitu $m = 2$. Garis tersebut melalui titik $A(1, -2)$, sehingga

$$\begin{aligned} y - (-2) &= 2(x-1) \\ y + 2 &= 2x - 2 \\ y &= 2x - 4. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garisnya adalah $\boxed{y = 2x - 4}$ atau $2x - y - 4 = 0$.

3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$, $x \geq -2$.

(a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

(b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: fungsi invers, domain dan range, sketsa grafik fungsi invers.
Penyelesaian:

(a) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh


$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{x+2} \\ y^3 &= x + 2 \\ x &= y^3 - 2. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^3 - 2$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $f^{-1}(x) = x^3 - 2$.
Selanjutnya, karena domain f dibatasi pada $x \geq -2$, maka $x + 2 \geq 0$ sehingga $\sqrt[3]{x+2} \geq 0$, dan nilainya membesar tanpa batas. Jadi range dari f adalah $R(f) = [0, \infty)$. Domain dari fungsi

invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [-2, \infty)}$. Jadi fungsi inversnya adalah

$$\boxed{f^{-1}(x) = x^3 - 2, \quad D(f^{-1}) = [0, \infty)}.$$

(b) Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$. Sebagai bantuan, grafik f melalui titik $(-2, 0)$, $(-1, 1)$, dan $(6, 2)$, sehingga grafik f^{-1} melalui titik $(0, -2)$, $(1, -1)$, dan $(2, 6)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Hitunglah $\lim\limits_{y \to -\infty} \dfrac{3 - 2y}{\sqrt{5 + 9y^2}}$.

Kata kunci materi: limit di tak hingga, bentuk akar, nilai mutlak.

Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa jika $y \to -\infty$, pembilang dan penyebut sama-sama menuju tak hingga, sehingga diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Untuk menyelesaikannya, keluarkan y^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{y^2} = |y|}$, dan karena $y \to -\infty$ (yaitu $y < 0$), maka $\boxed{|y| = -y}$. Diperoleh

$$\sqrt{5 + 9y^2} = \sqrt{y^2 \left(\frac{5}{y^2} + 9 \right)} = |y| \sqrt{\frac{5}{y^2} + 9} = -y \sqrt{\frac{5}{y^2} + 9}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \lim_{y \to -\infty} \frac{3 - 2y}{\sqrt{5 + 9y^2}} &= \lim_{y \to -\infty} \frac{3 - 2y}{-y \sqrt{\frac{5}{y^2} + 9}} \\ &= \lim_{y \to -\infty} \frac{-\frac{3}{y} + 2}{\sqrt{\frac{5}{y^2} + 9}} \\ &= \frac{0 + 2}{\sqrt{0 + 9}} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{2y}{x} = \sqrt{x} + 3$ di titik $(1, 1)$.

Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan pembagian, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1,1)$ terletak pada kurva, yaitu $1^2 + 1 + \frac{2(1)}{1} = 4$ dan $\sqrt{1} + 3 = 4$. Selanjutnya, kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan pembagian, diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{2y}{x}\right) = \frac{2\frac{dy}{dx} \cdot x - 2y \cdot 1}{x^2} = \frac{2x\frac{dy}{dx} - 2y}{x^2}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$2x + \frac{dy}{dx} + \frac{2x\frac{dy}{dx} - 2y}{x^2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Selanjutnya, substitusi titik $(1,1)$ ke persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} 2(1) + \frac{dy}{dx} + \frac{2(1)\frac{dy}{dx} - 2(1)}{1^2} &= \frac{1}{2\sqrt{1}} \\ 2 + \frac{dy}{dx} + 2\frac{dy}{dx} - 2 &= \frac{1}{2} \\ 3\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2} \\ \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} &= \boxed{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

Gradien garis singgung di titik $(1,1)$ adalah $m = \frac{1}{6}$. Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (1,1)$, diperoleh

$$\begin{aligned} y - 1 &= \frac{1}{6}(x - 1) \\ y &= \frac{1}{6}x + \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1,1)$ adalah $\boxed{y = \frac{1}{6}x + \frac{5}{6}}$ atau $x - 6y + 5 = 0$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Definisikan $|x-1|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|x-1| \leq 5-2x.$$

Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu

$$|x-1| = \begin{cases} x-1, & x-1 \geq 0 \\ -(x-1), & x-1 < 0 \end{cases}$$
$$= \boxed{\begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ 1-x, & x < 1 \end{cases}}.$$

(b) Berdasarkan definisi tersebut, pertidaksamaan $|x-1| \leq 5-2x$ dapat ditulis menjadi dua kasus:

(i) Jika $x \geq 1$, maka pertidaksamaan menjadi $x-1 \leq 5-2x$, yang dapat diselesaikan menjadi $3x \leq 6$ atau $x \leq 2$. Irisan dengan syarat $x \geq 1$ adalah $\boxed{1 \leq x \leq 2}$.

(ii) Jika $x < 1$, maka pertidaksamaan menjadi $1-x \leq 5-2x$, yang dapat diselesaikan menjadi $x \leq 4$. Irisan dengan syarat $x < 1$ adalah $\boxed{x < 1}$.

Dengan menggabungkan kedua kasus, semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah $(-\infty, 1) \cup [1, 2]$, yaitu $\boxed{x \leq 2}$, atau dalam notasi interval $(-\infty, 2]$.
Sebagai pengecekan, untuk $x = 2$ diperoleh $|1| = 1 \leq 5-4 = 1$, sedangkan untuk $x = 3$ diperoleh $|2| = 2 \not\leq 5-6 = -1$.

2. (a) Tentukan jarak titik $(-3, 4)$ dan $(5, -2)$.

   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis dari titik $(-3, 4)$ ke $(5, -2)$.

Kata kunci materi: jarak titik, titik tengah, persamaan lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali rumus jarak antara dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), yaitu

$$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (-3, 4)$ dan $(x_2, y_2) = (5, -2)$, diperoleh

$$d = \sqrt{(5-(-3))^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10.$$

Jadi jarak antara titik $(-3, 4)$ dan $(5, -2)$ adalah $\boxed{d = 10}$.

(b) Diketahui bahwa diameter lingkaran adalah ruas garis dari titik $(-3, 4)$ ke $(5, -2)$, sehingga jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter, yaitu

$$\boxed{r = \frac{d}{2} = \frac{10}{2} = 5}.$$

Karena kedua titik tersebut merupakan ujung-ujung diameter, maka pusat lingkaran adalah titik tengah dari dua titik tersebut. Titik tengah (a, b) dari dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$(a, b) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (-3, 4)$ dan $(x_2, y_2) = (5, -2)$, diperoleh

$$(a, b) = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2}\right) = \boxed{(1, 1)}.$$

Persamaan lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari-jari r adalah

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

Dengan substitusi $(a, b) = (1, 1)$ dan $r = 5$, diperoleh persamaan lingkarannya adalah

$$\boxed{(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25}.$$

atau dalam bentuk umum $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = -\sqrt{|x^2 - 9|}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.

(a) Dapatkan domain f dan g.

(b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

Kata kunci materi: domain fungsi, nilai mutlak, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah ekspresi di dalam akar tak negatif, yaitu $|x^2 - 9| \geq 0$. Karena nilai mutlak selalu tak negatif, syarat ini berlaku untuk setiap bilangan real x. Jadi

$$\boxed{D(f) = \mathbb{R}}.$$

Selanjutnya, $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga syaratnya adalah $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2,\ x \neq 2\} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa $(f(x))^2 = \left(-\sqrt{|x^2-9|}\right)^2 = |x^2-9|$, sehingga

$$(g\circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{(f(x))^2-4} = \boxed{\frac{1}{|x^2-9|-4}}.$$

Domain dari fungsi komposisi $g\circ f$ adalah semua nilai x pada domain f sehingga nilai dari $f(x)$ berada pada domain g, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(g\circ f) = \{x\in D(f) : f(x)\in D(g)\} = \{x\in\mathbb{R} : f(x)\neq \pm 2\}}.$$

Karena $f(x)\leq 0$, maka $f(x)\neq 2$ selalu berlaku. Selanjutnya, $f(x) = -2$ jika dan hanya jika $\sqrt{|x^2-9|} = 2$, yaitu $|x^2-9| = 4$, sehingga

$$x^2-9 = 4 \quad\vee\quad x^2-9 = -4 \iff x^2 = 13 \quad\vee\quad x^2 = 5 \iff x = \pm\sqrt{13} \quad\vee\quad x = \pm\sqrt{5}.$$

Didapatkan

$$\boxed{D(g\circ f) = \mathbb{R}\setminus\left\{-\sqrt{13}, -\sqrt{5}, \sqrt{5}, \sqrt{13}\right\}}.$$

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x+1), & x\leq 1 \\ (3-k)x, & x>1 \end{cases}$.
Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ada.

Kata kunci materi: limit sepihak, fungsi sepotong-sepotong, persamaan kuadrat.

Penyelesaian:

Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada dan bernilai sama, yaitu $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Untuk $x\to 1^-$ (yaitu $x<1$) digunakan rumus $k^2(x+1)$, dan untuk $x\to 1^+$ (yaitu $x>1$) digunakan rumus $(3-k)x$. Diperoleh

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} k^2(x+1) = 2k^2 \quad\text{dan}\quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (3-k)x = 3-k.$$

Agar limitnya ada, haruslah

$$\begin{aligned} 2k^2 &= 3-k \\ 2k^2+k-3 &= 0 \\ (2k+3)(k-1) &= 0, \end{aligned}$$

sehingga $k = -\frac{3}{2}$ atau $k=1$. Jadi semua nilai k yang memenuhi adalah $\boxed{k = -\frac{3}{2} \text{ atau } k = 1}$.

Sebagai pengecekan, untuk $k=1$ kedua limit sepihak bernilai 2, sedangkan untuk $k=-\frac{3}{2}$ kedua limit sepihak bernilai $\frac{9}{2}$.

5. Diketahui kurva $x^3+xy-y^2 = 1$.

(a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

(b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1,1)$.

Kata kunci materi: turunan implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.
Penyelesaian:

(a) Kita turunkan kedua ruas persamaan $x^3 + xy - y^2 = 1$ terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x (yaitu $y = y(x)$). Dengan aturan perkalian, $\boxed{\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(xy) - \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(1)$$
$$3x^2 + y + x\frac{dy}{dx} - 2y\frac{dy}{dx} = 0.$$

Selanjutnya, kumpulkan semua suku yang mengandung $\frac{dy}{dx}$ di satu ruas:

$$x\frac{dy}{dx} - 2y\frac{dy}{dx} = -3x^2 - y$$
$$(x - 2y)\frac{dy}{dx} = -3x^2 - y$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3x^2 - y}{x - 2y} = \frac{3x^2 + y}{2y - x}.$$

Jadi diperoleh $\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + y}{2y - x}}$.

(b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $1^3 + 1(1) - 1^2 = 1$. Untuk mendapatkan gradien garis singgung di titik $(1, 1)$, substitusi $x = 1$ dan $y = 1$ ke dalam turunan yang telah diperoleh:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = \frac{3(1)^2 + 1}{2(1) - 1} = \frac{4}{1} = \boxed{4}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (1, 1)$ dan $m = 4$, diperoleh:

$$y - 1 = 4(x - 1)$$
$$y = 4x - 3.$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1, 1)$ adalah $\boxed{y = 4x - 3}$ atau $4x - y = 3$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(3x+2)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(3x+2)^2} = 3x+2$.

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat bahwa $\sqrt{x^2} = |x|$, sehingga diperoleh

   $$\boxed{\sqrt{(3x+2)^2} = |3x+2|}.$$

   (b) Berdasarkan (a), persamaan yang diberikan menjadi

   $$|3x+2| = 3x+2.$$

   Kemudian, pertimbangkan definisi nilai mutlak, yaitu

   $$|3x+2| = \begin{cases} 3x+2, & 3x+2 \geq 0 \\ -(3x+2), & 3x+2 < 0 \end{cases}$$

   Berdasarkan definisi tersebut, didapatkan bahwa persamaan $|3x+2| = 3x+2$ berlaku jika $3x+2 \geq 0$, yang berarti $x \geq -\frac{2}{3}$. Untuk $3x+2 < 0$, persamaan menjadi $-(3x+2) = 3x+2$, yaitu $3x+2 = 0$, yang bertentangan dengan $3x+2 < 0$. Jadi semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah $\boxed{x \geq -\frac{2}{3}}$, atau dalam notasi interval $\left[-\frac{2}{3}, \infty\right)$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x+3}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

   Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x+3 \geq 0\} = [-3, \infty)}.$$

Selanjutnya, karena $f(x)$ merupakan fungsi akar kuadrat, maka nilainya selalu tak negatif, dan untuk x yang membesar dari -3, nilai $\sqrt{x+3}$ membesar dari 0 tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, \infty)}.$$

(b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y = f(x) &= \sqrt{x+3} \\ y^2 &= x + 3 \\ x &= y^2 - 3. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^2 - 3$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$f^{-1}(x) = x^2 - 3.$$

Selanjutnya, domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [-3, \infty)}$. Jadi fungsi inversnya adalah

$$\boxed{f^{-1}(x) = x^2 - 3, \quad x \geq 0}.$$

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = -2 - \sqrt{-y^2 + 4y + 12}.$$

(a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

(b) Sketsa grafiknya.


Kata kunci materi: persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa persamaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi

$$\begin{aligned} x + 2 &= -\sqrt{-y^2 + 4y + 12} \\ (x+2)^2 &= -y^2 + 4y + 12 \\ (x+2)^2 + y^2 - 4y - 12 &= 0 \\ (x+2)^2 + (y^2 - 4y + 4) - 4 - 12 &= 0 \\ (x+2)^2 + (y-2)^2 &= 16. \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pusat lingkaran adalah $(-2, 2)$ dan jari-jari lingkaran adalah $\sqrt{16} = 4$. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (-2, 2), \text{ Jari-jari: } 4}$.

(b) Diperhatikan bahwa pada persamaan $x = -2 - \sqrt{-y^2 + 4y + 12}$ berlaku $x + 2 = -\sqrt{-y^2 + 4y + 12} \leq 0$, artinya $\boxed{x \leq -2}$. Sehingga grafik separuh lingkaran yang diberikan dalam soal merupakan bagian kiri dari lingkaran $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 16$, dengan ujung-ujung $(-2, -2)$ dan $(-2, 6)$ serta titik paling kiri $(-6, 2)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Grafik yang dimaksud adalah busur yang berwarna biru (setengah lingkaran bagian kiri).

4. Diberikan fungsi $f(x)=\dfrac{9-x^2}{3-|x|}$.

   (a) Nyatakan fungsi $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong.

   (b) Selidiki apakah $f(x)$ memiliki titik diskontinu.

   (c) Jika memiliki titik diskontinu, apakah titik diskontinu dapat dihilangkan?

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, fungsi sepotong-sepotong, kekontinuan, diskontinuitas yang dapat dihapus.

   Penyelesaian:

   (a) Fungsi f terdefinisi jika $3-|x|\neq 0$, yaitu $x\neq \pm 3$. Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu $|x|=x$ untuk $x\geq 0$ dan $|x|=-x$ untuk $x<0$. Diperoleh

   - Untuk $x\geq 0$ dan $x\neq 3$: $f(x)=\dfrac{9-x^2}{3-x}=\dfrac{(3-x)(3+x)}{3-x}=3+x$.
   - Untuk $x<0$ dan $x\neq -3$: $f(x)=\dfrac{9-x^2}{3+x}=\dfrac{(3-x)(3+x)}{3+x}=3-x$.

   Jadi

   $$f(x)=\begin{cases}3-x, & x<0,\ x\neq -3\\ 3+x, & x\geq 0,\ x\neq 3\end{cases}.$$

   (b) Pada interval-interval $(-\infty,-3)$, $(-3,0)$, $(0,3)$, dan $(3,\infty)$, fungsi f berupa fungsi linear sehingga kontinu. Titik-titik yang perlu diselidiki adalah $x=0$ (titik pergantian rumus) serta $x=-3$ dan $x=3$ (titik yang membuat penyebut nol).


   - Di $x=0$: $f(0)=3+0=3$, $\lim\limits_{x\to 0^-}(3-x)=3$, dan $\lim\limits_{x\to 0^+}(3+x)=3$, sehingga $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=3=f(0)$. Jadi f kontinu di $x=0$.
   - Di $x=3$: $f(3)$ tidak terdefinisi karena penyebutnya nol, sehingga f diskontinu di $x=3$.
   - Di $x=-3$: $f(-3)$ tidak terdefinisi karena penyebutnya nol, sehingga f diskontinu di $x=-3$.

   Jadi $f(x)$ memiliki titik diskontinu, yaitu di $x=-3$ dan $x=3$.

   (c) Suatu titik diskontinu $x=a$ dapat dihilangkan jika $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ ada. Diperhatikan bahwa

   $$\lim_{x\to 3}f(x)=\lim_{x\to 3}(3+x)=6 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to -3}f(x)=\lim_{x\to -3}(3-x)=6.$$

Karena kedua limit tersebut ada, maka kedua titik diskontinu dapat dihilangkan, yaitu dengan mendefinisikan $f(-3) = 6$ dan $f(3) = 6$. Dengan definisi tersebut, $f(x) = 3 + |x|$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Sketsa grafik f (sebelum titik diskontinunya dihilangkan) adalah sebagai berikut:



5. Diketahui fungsi $f(x) = \left(x^2 - \dfrac{4}{x}\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.

Kata kunci materi: turunan fungsi, aturan rantai.

Penyelesaian:

Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi, yaitu

$$\frac{d}{dx}[h(g(x))] = h'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Dapat dimisalkan $u = g(x) = x^2 - \dfrac{4}{x}$ sehingga $h(u) = u^{3/2}$, dan diperoleh

$$h'(u) = \frac{3}{2}u^{1/2} \quad \text{dan} \quad g'(x) = 2x + \frac{4}{x^2}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= h'(u) \cdot g'(x) \\ &= \frac{3}{2}u^{1/2} \cdot \left(2x + \frac{4}{x^2}\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(x^2 - \frac{4}{x}\right)^{1/2}\left(2x + \frac{4}{x^2}\right). \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam $f'(x)$, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(2) &= \frac{3}{2}\left(4 - \frac{4}{2}\right)^{1/2}\left(4 + \frac{4}{4}\right) \\ &= \frac{3}{2}(2)^{1/2}(5) \\ &= \frac{15}{2}\sqrt{2}. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Definisikan $|x+2|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|x+2| \leq 3x - 2.$$

Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu

$$|x+2| = \begin{cases} x+2, & x+2 \geq 0 \\ -(x+2), & x+2 < 0 \end{cases}$$
$$= \boxed{\begin{cases} x+2, & x \geq -2 \\ -x-2, & x < -2 \end{cases}}.$$

(b) Berdasarkan definisi tersebut, pertidaksamaan $|x+2| \leq 3x-2$ dapat ditulis menjadi dua kasus:

(i) Jika $x \geq -2$, maka pertidaksamaan menjadi $x+2 \leq 3x-2$, yang dapat diselesaikan menjadi $4 \leq 2x$ atau $x \geq 2$. Irisan dengan syarat $x \geq -2$ adalah $\boxed{x \geq 2}$.

(ii) Jika $x < -2$, maka pertidaksamaan menjadi $-x-2 \leq 3x-2$, yang dapat diselesaikan menjadi $0 \leq 4x$ atau $x \geq 0$. Namun, karena kita berada pada kasus $x < -2$, $\boxed{\text{tidak ada solusi}}$ pada kasus ini.

Dengan menggabungkan kedua kasus, semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah $\boxed{x \geq 2}$, atau dalam notasi interval $[2, \infty)$.

2. (a) Tentukan jarak titik $(-2, 1)$ dan $(4, 9)$.

   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis dari titik $(-2, 1)$ ke $(4, 9)$.

Kata kunci materi: jarak titik, titik tengah, persamaan lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali rumus jarak antara dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), yaitu

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (-2, 1)$ dan $(x_2, y_2) = (4, 9)$, diperoleh

$$d = \sqrt{(4-(-2))^2 + (9-1)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10.$$

Jadi jarak antara titik $(-2, 1)$ dan $(4, 9)$ adalah $\boxed{d = 10}$.

(b) Diketahui bahwa diameter lingkaran adalah ruas garis dari titik $(-2, 1)$ ke $(4, 9)$, sehingga jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter, yaitu

$$\boxed{r = \frac{d}{2} = \frac{10}{2} = 5}.$$

Karena kedua titik tersebut merupakan ujung-ujung diameter, maka pusat lingkaran adalah titik tengah dari dua titik tersebut. Titik tengah (a, b) dari dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$(a, b) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (-2, 1)$ dan $(x_2, y_2) = (4, 9)$, diperoleh

$$(a, b) = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+9}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}, \frac{10}{2}\right) = \boxed{(1, 5)}.$$

Persamaan lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari-jari r adalah

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

Dengan substitusi $(a, b) = (1, 5)$ dan $r = 5$, diperoleh persamaan lingkarannya adalah

$$\boxed{(x-1)^2 + (y-5)^2 = 25}.$$

atau dalam bentuk umum $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 1 = 0$.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 3 - \sqrt{9 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 3]$.

   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

   Kata kunci materi: fungsi satu-satu, setengah lingkaran, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif). Diperhatikan bahwa jika $y = 3 - \sqrt{9 - x^2}$, maka $3 - y = \sqrt{9 - x^2} \geq 0$ dan

   $$(3-y)^2 = 9 - x^2 \iff \boxed{x^2 + (y-3)^2 = 9}, \quad y \leq 3,$$

   sehingga grafik f adalah setengah lingkaran bagian bawah dengan pusat $(0, 3)$ dan jari-jari 3. Grafik ini turun pada $[-3, 0]$ dan naik pada $[0, 3]$, sehingga jika domainnya memuat titik di kiri dan kanan $x = 0$, fungsi f tidak satu-satu (misalnya $f(-3) = f(3) = 3$). Agar f satu-satu pada $[a, 3]$, haruslah $a \geq 0$. Jadi nilai terkecil a adalah $\boxed{a = 0}$.

(b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \in [0, 3]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh


$$\begin{aligned} y &= 3 - \sqrt{9 - x^2} \\ \sqrt{9 - x^2} &= 3 - y \\ 9 - x^2 &= (3 - y)^2 \\ x^2 &= 9 - (3 - y)^2 = 6y - y^2 \\ x &= \sqrt{6y - y^2} \quad \text{(karena } x \geq 0\text{)}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt{6y - y^2}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{6x - x^2}}.$$

Pada domain $[0, 3]$, fungsi f naik dari $f(0) = 0$ sampai $f(3) = 3$, sehingga $R(f) = [0, 3]$. Akibatnya, $D(f^{-1}) = R(f) = [0, 3]$ dan $R(f^{-1}) = D(f) = [0, 3]$.

(c) Grafik f adalah seperempat lingkaran berpusat di $(0, 3)$ dan berjari-jari 3 dari titik $(0, 0)$ ke $(3, 3)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu seperempat lingkaran $(x - 3)^2 + y^2 = 9$ yang berpusat di $(3, 0)$, juga dari titik $(0, 0)$ ke $(3, 3)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 5}$.

Kata kunci materi: limit di tak hingga, bentuk akar, nilai mutlak.

Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{-\infty}$. Untuk menyelesaikannya, keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$. Diperoleh

$$\sqrt{9x^2 + 1} = \sqrt{x^2 \left(9 + \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} = -x \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5} &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}}{x\left(2-\frac{5}{x}\right)}\\ &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}}{2-\frac{5}{x}}\\ &= \frac{-\sqrt{9+0}}{2-0}\\ &= \boxed{-\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

Hasil negatif ini masuk akal, karena untuk x negatif yang sangat besar, pembilangnya positif sedangkan penyebutnya negatif.

5. Diketahui kurva $x^2y+3x-2y^2=-3$.

   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1,2)$.

   Kata kunci materi: turunan implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.
   Penyelesaian:

   (a) Kita turunkan kedua ruas persamaan $x^2y+3x-2y^2=-3$ terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x (yaitu $y=y(x)$). Dengan aturan perkalian, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(x^2y)=2xy+x^2\dfrac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(2y^2)=4y\dfrac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^2y)+\frac{d}{dx}(3x)-\frac{d}{dx}(2y^2) &= \frac{d}{dx}(-3)\\ 2xy+x^2\frac{dy}{dx}+3-4y\frac{dy}{dx} &= 0.\end{aligned}$$

   Selanjutnya, kumpulkan semua suku yang mengandung $\frac{dy}{dx}$ di satu ruas:

$$\begin{aligned}x^2\frac{dy}{dx}-4y\frac{dy}{dx} &= -2xy-3\\ (x^2-4y)\frac{dy}{dx} &= -2xy-3\\ \frac{dy}{dx} &= \frac{-2xy-3}{x^2-4y}=\frac{2xy+3}{4y-x^2}.\end{aligned}$$

   Jadi diperoleh $\boxed{\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2xy+3}{4y-x^2}}$.

   (b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1,2)$ terletak pada kurva, yaitu $1^2(2)+3(1)-2(2)^2=2+3-8=-3$. Untuk mendapatkan gradien garis singgung di titik $(1,2)$, substitusi $x=1$ dan $y=2$ ke dalam turunan yang telah diperoleh:

$$m=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,2)}=\frac{2(1)(2)+3}{4(2)-1^2}=\frac{7}{7}=\boxed{1}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (1, 2)$ dan $m = 1$, diperoleh:

$$y - 2 = 1(x - 1)$$
$$y = x + 1.$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1, 2)$ adalah $\boxed{y = x + 1}$ atau $x - y + 1 = 0$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan tiga titik koordinat $A(0,1)$, $B(4,4)$ dan $C(1,6)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis lurus ℓ yang melalui titik A dan B.

   (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis ℓ.

   (c) Dapatkan jarak titik C ke garis lurus ℓ.

   Kata kunci materi: gradien garis, persamaan garis, garis tegak lurus, jarak titik ke garis.
   Penyelesaian:

   (a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dengan substitusi $A(0,1)$ dan $B(4,4)$, diperoleh

   $$m_\ell = \frac{4-1}{4-0} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

   Garis ℓ melalui titik $A(0,1)$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

   $$y - 1 = \frac{3}{4}(x - 0) \implies y = \frac{3}{4}x + 1.$$

   Jadi persamaan garis ℓ adalah $\boxed{y = \frac{3}{4}x + 1}$ atau $3x - 4y + 4 = 0$.

   (b) Dua garis saling tegak lurus jika $\boxed{m_\ell \cdot m_k = -1}$, sehingga $\frac{3}{4} \cdot m_k = -1$ dan diperoleh $\boxed{m_k = -\frac{4}{3}}$.
   Garis k melalui titik $C(1,6)$, sehingga

   $$\begin{aligned} y - 6 &= -\frac{4}{3}(x - 1) \\ y &= -\frac{4}{3}x + \frac{4}{3} + 6 \\ y &= -\frac{4}{3}x + \frac{22}{3}. \end{aligned}$$

   Jadi persamaan garis k adalah $\boxed{y = -\frac{4}{3}x + \frac{22}{3}}$ atau $4x + 3y = 22$.

   (c) Ingat kembali rumus jarak titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$, yaitu

   $$\boxed{d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}}.$$

Dengan garis $\ell : 3x - 4y + 4 = 0$ (yaitu $a = 3$, $b = -4$, $c = 4$) dan titik $C(1, 6)$, diperoleh

$$d = \frac{|3(1) - 4(6) + 4|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|3 - 24 + 4|}{\sqrt{25}} = \frac{|-17|}{5} = \frac{17}{5}.$$

Sebagai cara lain, jarak tersebut sama dengan jarak dari C ke titik potong garis k dan ℓ. Dengan menyelesaikan $3x - 4y = -4$ dan $4x + 3y = 22$, diperoleh titik potong $\left(\frac{76}{25}, \frac{82}{25}\right)$, dan jaraknya ke $C(1, 6)$ adalah $\sqrt{\left(\frac{51}{25}\right)^2 + \left(\frac{68}{25}\right)^2} = \frac{85}{25} = \frac{17}{5}$. Jadi jarak titik C ke garis ℓ adalah $\boxed{\frac{17}{5}}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ (x - 2)^2, & x \geq 1 \end{cases}$.

   (a) Dapatkan $f(1)$, $f(-3)$, dan $f(-x^2)$.

   (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.

   Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, domain dan range fungsi, sketsa grafik.
   Penyelesaian:


   (a) Karena $1 \geq 1$, digunakan rumus $(x - 2)^2$. Karena $-3 < 1$, digunakan rumus $2x + 1$. Selanjutnya, diperhatikan bahwa $-x^2 \leq 0 < 1$ untuk setiap x, sehingga digunakan rumus $2x + 1$. Diperoleh

   $$\begin{aligned} f(1) &= (1 - 2)^2 = (-1)^2 = 1 \\ f(-3) &= 2(-3) + 1 = -5 \\ f(-x^2) &= 2(-x^2) + 1 = 1 - 2x^2. \end{aligned}$$

   Jadi diperoleh $\boxed{f(1) = 1,\ f(-3) = -5,\ f(-x^2) = 1 - 2x^2}$.

   (b) Untuk $x < 1$, $f(x) = 2x + 1$ adalah fungsi linear naik dengan domain $(-\infty, 1)$ dan range $(-\infty, 3)$. Untuk $x \geq 1$, $f(x) = (x - 2)^2$ adalah fungsi kuadrat dengan nilai minimum 0 di $x = 2$, sehingga domainnya $[1, \infty)$ dan range-nya $[0, \infty)$. Dengan demikian, domain dari $f(x)$ adalah $\boxed{D(f) = (-\infty, 1) \cup [1, \infty) = \mathbb{R}}$, dan range dari $f(x)$ adalah $\boxed{R(f) = (-\infty, 3) \cup [0, \infty) = \mathbb{R}}$.

   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$ adalah sebagai berikut. Diperhatikan bahwa potongan garis berakhir di titik $(1, 3)$ yang tidak termasuk grafik (bulatan kosong), sedangkan potongan parabola dimulai dari titik $(1, 1)$ yang termasuk grafik (bulatan penuh).



3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{4x - x^2},\ 0 \le x \le 2$.

   (a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

   Kata kunci materi: melengkapkan kuadrat, setengah lingkaran, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.

   Penyelesaian:


   (a) Dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh $4x - x^2 = 4 - (x^2 - 4x + 4) = \boxed{4 - (x-2)^2}$, sehingga $f(x) = \sqrt{4 - (x-2)^2}$. Grafik f adalah bagian dari setengah lingkaran atas $(x-2)^2 + y^2 = 4$ dengan pusat $(2, 0)$ dan jari-jari 2. Pada $0 \le x \le 2$, fungsi f naik dari $f(0) = 0$ sampai $f(2) = 2$, sehingga f satu-satu dan $R(f) = [0, 2]$.
   Misalkan $y = f(x)$ dengan $0 \le x \le 2$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{4 - (x-2)^2} \\ y^2 &= 4 - (x-2)^2 \\ (x-2)^2 &= 4 - y^2 \\ x - 2 &= -\sqrt{4 - y^2} \quad \text{(karena } x \le 2, \text{ yaitu } x - 2 \le 0) \\ x &= 2 - \sqrt{4 - y^2}. \end{aligned}$$

   Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = 2 - \sqrt{4 - y^2}$. Dengan mengganti y dengan x, dan mengingat bahwa domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{4 - x^2}, \quad D(f^{-1}) = R(f) = [0, 2]}.$$

   (b) Grafik f adalah seperempat lingkaran berpusat di $(2, 0)$ dari titik $(0, 0)$ ke $(2, 2)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu seperempat lingkaran $x^2 + (y-2)^2 = 4$ yang berpusat di $(0, 2)$, juga dari titik $(0, 0)$ ke $(2, 2)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3 + 8}{x + 2}$.
   (a) Tentukan $\lim\limits_{x \to -2} f(x)$.
   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

   Kata kunci materi: limit fungsi, faktorisasi, sketsa grafik.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa jika kita substitusi $x = -2$ ke dalam $f(x)$, maka diperoleh bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$. Oleh karena itu, kita faktorkan pembilangnya dengan rumus $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$:

   $$\boxed{x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)}.$$

   Dengan demikian, fungsi dapat disederhanakan menjadi


   $$f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{x + 2} = x^2 - 2x + 4, \quad x \neq -2.$$

   Sehingga limitnya adalah

   $$\lim_{x \to -2} f(x) = \lim_{x \to -2} (x^2 - 2x + 4) = (-2)^2 - 2(-2) + 4 = 12.$$

   Jadi $\boxed{\lim\limits_{x \to -2} f(x) = 12}$.

   (b) Dari (a), grafik $y = f(x)$ sama dengan grafik parabola $y = x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3$ yang terbuka ke atas dengan titik puncak $(1, 3)$, tetapi titik $(-2, 12)$ tidak termasuk dalam grafik (berlubang) karena $f(-2)$ tidak terdefinisi. Sebagai bantuan, grafik memotong sumbu-y di titik $(0, 4)$. Sketsa grafik dari $y = f(x)$ adalah sebagai berikut:



5. Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 - xy + y^2 = 12$ di titik (a, b) sejajar dengan sumbu-x. Tentukan semua titik (a, b) dan persamaan garis singgungnya.

   Kata kunci materi: turunan implisit, garis singgung mendatar, persamaan garis singgung.
   Penyelesaian:

   Garis yang sejajar dengan sumbu-x memiliki gradien nol, sehingga di titik (a, b) haruslah $\boxed{\frac{dy}{dx} = 0}$.

   Kita turunkan kedua ruas persamaan kurva terhadap x, dengan aturan perkalian $\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}$ dan aturan rantai $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}$:

$$\begin{aligned} 2x - \left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x)\frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{y - 2x}{2y - x}}. \end{aligned}$$

   Agar $\frac{dy}{dx} = 0$ di titik (a, b), haruslah pembilangnya nol (dengan penyebut tidak nol), yaitu $b - 2a = 0$ atau $\boxed{b = 2a}$. Karena titik (a, b) terletak pada kurva, substitusi $b = 2a$ ke persamaan kurva:

$$\begin{aligned} a^2 - a(2a) + (2a)^2 &= 12 \\ a^2 - 2a^2 + 4a^2 &= 12 \\ 3a^2 &= 12 \\ a^2 = 4 \implies a &= \pm 2. \end{aligned}$$

   Untuk $a = 2$ diperoleh $b = 4$, dan untuk $a = -2$ diperoleh $b = -4$. Dicek penyebutnya, yaitu $2(4) - 2 = 6 \neq 0$ dan $2(-4) - (-2) = -6 \neq 0$. Jadi titik-titik yang dimaksud adalah $\boxed{(2, 4) \text{ dan } (-2, -4)}$.
   Garis singgung yang sejajar sumbu-x berbentuk $y = b$, sehingga persamaan garis singgungnya adalah

$$\boxed{y = 4 \text{ (di titik } (2, 4)) \quad \text{dan} \quad y = -4 \text{ (di titik } (-2, -4))}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-3x-4} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-3x-4} = \frac{(x+3)(x-2)}{(x-4)(x+1)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x+3=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x-4=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x+3)(x-2)}{(x-4)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -3$, misalkan $x = -4$:

$$\frac{(-4+3)(-4-2)}{(-4-4)(-4+1)} = \frac{(-1)(-6)}{(-8)(-3)} = \frac{6}{24} > 0$$

- Untuk $-3 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2+3)(-2-2)}{(-2-4)(-2+1)} = \frac{(1)(-4)}{(-6)(-1)} = \frac{-4}{6} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:


$$\frac{(0+3)(0-2)}{(0-4)(0+1)} = \frac{(3)(-2)}{(-4)(1)} = \frac{6}{4} > 0$$

- Untuk $2 < x < 4$, misalkan $x = 3$:

$$\frac{(3+3)(3-2)}{(3-4)(3+1)} = \frac{(6)(1)}{(-1)(4)} = \frac{-6}{4} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5+3)(5-2)}{(5-4)(5+1)} = \frac{(8)(3)}{(1)(6)} = 4 > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -3$ dan $x = 2$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -1$ dan $x = 4$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -3$ atau $-1 < x \leq 2$ atau $x > 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -3] \cup (-1, 2] \cup (4, \infty)}$.

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(3, -4)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius 5, at $(3, -4)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (0, 0)$ dan $(x_2, y_2) = (3, -4)$, diperoleh

$$m_\ell = \frac{-4 - 0}{3 - 0} = -\frac{4}{3}.$$

Jadi kemiringan garis ℓ adalah $\boxed{m_\ell = -\frac{4}{3}}$.


(b) Persamaan lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari 5 adalah $x^2 + y^2 = 25$. Diperhatikan bahwa titik $(3, -4)$ terletak pada lingkaran, karena $3^2 + (-4)^2 = 9 + 16 = 25$.
Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$.
Karena garis singgung tegak lurus dengan garis ℓ, maka gradien garis singgung m_s memenuhi

$$m_\ell \cdot m_s = -1 \implies -\frac{4}{3} \cdot m_s = -1 \implies \boxed{m_s = \frac{3}{4}}.$$

Garis singgung melalui titik $(3, -4)$ dengan gradien $\frac{3}{4}$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - (-4) &= \frac{3}{4}(x - 3) \\ y + 4 &= \frac{3}{4}x - \frac{9}{4} \\ y &= \frac{3}{4}x - \frac{25}{4}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah $\boxed{y = \frac{3}{4}x - \frac{25}{4}}$ atau $3x - 4y = 25$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Write the derivative formula of fg that is $\dfrac{d}{dx}(f(x)g(x))$
Then, find the derivative of fg, given that $f(x) = 2x^3 - x$ and $g(x) = 4 - x^2$.

Kata kunci materi: turunan, aturan perkalian.

Penyelesaian:

Ingat kembali aturan turunan untuk perkalian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(f(x)g(x)\right) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}.$$

Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{d}{dx}(2x^3 - x) = 6x^2 - 1}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{d}{dx}(4 - x^2) = -2x}$$

Dengan demikian, turunan dari fg adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(f(x)g(x)\right) &= (6x^2 - 1)(4 - x^2) + (2x^3 - x)(-2x)\\ &= (24x^2 - 6x^4 - 4 + x^2) + (-4x^4 + 2x^2)\\ &= \boxed{-10x^4 + 27x^2 - 4}.\end{aligned}$$

4. Calculate $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{4x+1} - 3}{x - 2}$.

Kata kunci materi: limit fungsi, bentuk tak tentu, perkalian sekawan.

Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa jika kita substitusi $x = 2$ secara langsung, diperoleh $\frac{\sqrt{9}-3}{0} = \frac{0}{0}$ yang merupakan bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita kalikan dengan bentuk konjugat (sekawan)

dari pembilangnya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2} &= \lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}\cdot\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{4x+1}+3}\\ &= \lim_{x\to 2}\frac{4x+1-9}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)}\\ &= \lim_{x\to 2}\frac{4(x-2)}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)}\\ &= \lim_{x\to 2}\frac{4}{\sqrt{4x+1}+3}\\ &= \frac{4}{\sqrt{9}+3}\\ &= \boxed{\frac{2}{3}}.\end{aligned}$$

5. Given a function $f(x)=\dfrac{1}{x+2}$ and $g(x)=x^2$.

   (a) Find $(f\circ g)(x)$.

   (b) Given $(p\circ g)(x)=x^2+5$, then find $p(x)$.

   Kata kunci materi: fungsi komposisi.

   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa

   $$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(x^2)=\boxed{\frac{1}{x^2+2}},$$

   dengan domain $\mathbb{R}$, karena $x^2+2\geq 2>0$ untuk setiap x.

   (b) Diperhatikan bahwa $(p\circ g)(x)=p(g(x))=p(x^2)=x^2+5$. Misalkan $\boxed{u=x^2}$, maka diperoleh

   $$p(u)=u+5.$$

   Dengan mengganti u dengan x, didapatkan $\boxed{p(x)=x+5}$.
   Sebagai pengecekan, $(p\circ g)(x)=p(x^2)=x^2+5$, sesuai dengan yang diketahui.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$1 \leq x^2 - 3 \leq 13.$$


Kata kunci materi: pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan ganda, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Dengan menambahkan 3 pada setiap ruas, pertidaksamaan ganda tersebut menjadi

$$4 \leq x^2 \leq 16,$$

yang dapat dipecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu $\boxed{x^2 \geq 4}$ dan $\boxed{x^2 \leq 16}$.

- Untuk $x^2 \geq 4$, diperoleh $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \geq 0$. Pembuat nolnya adalah $x = -2$ dan $x = 2$. Dengan uji titik (misalnya $x = -3$, $x = 0$, dan $x = 3$), diperoleh tanda $+, -, +$, sehingga penyelesaiannya adalah $x \leq -2$ atau $x \geq 2$.
- Untuk $x^2 \leq 16$, diperoleh $x^2 - 16 = (x-4)(x+4) \leq 0$. Pembuat nolnya adalah $x = -4$ dan $x = 4$. Dengan uji titik (misalnya $x = -5$, $x = 0$, dan $x = 5$), diperoleh tanda $+, -, +$, sehingga penyelesaiannya adalah $-4 \leq x \leq 4$.

Penyelesaian dari pertidaksamaan ganda adalah irisan dari kedua penyelesaian tersebut, yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Sebagai pengecekan, untuk $x = 3$ diperoleh $x^2 - 3 = 6$ dan berlaku $1 \leq 6 \leq 13$, sedangkan untuk $x = 0$ diperoleh $x^2 - 3 = -3 < 1$. Jadi penyelesaiannya adalah $-4 \leq x \leq -2$ atau $2 \leq x \leq 4$, atau dalam notasi interval $\boxed{[-4, -2] \cup [2, 4]}$.

2. Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 3x - 1$ dengan $0 \leq x < 2$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $1 \leq x < 4$.

Kata kunci materi: domain fungsi komposisi, pertidaksamaan linear.
Penyelesaian:

Dari soal diketahui bahwa $\boxed{D(g) = [0, 2)}$ dan $\boxed{D(f) = [1, 4)}$. Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, 2) : 1 \leq 3x - 1 < 4\}}.$$

Selanjutnya, diselesaikan pertidaksamaan ganda $1 \leq 3x - 1 < 4$:

$$1 \leq 3x - 1 < 4 \iff 2 \leq 3x < 5 \iff \frac{2}{3} \leq x < \frac{5}{3}.$$

Irisan dari $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right)$ dengan $D(g) = [0, 2)$ adalah $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right)$, karena $0 < \frac{2}{3}$ dan $\frac{5}{3} < 2$. Jadi

$$\boxed{D(f \circ g) = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{2}{3} \leq x < \frac{5}{3}\right\} = \left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right)}.$$

3. Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2 - 4y + 1$.

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.
Penyelesaian:
Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 - 4y + 1$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 - 4y + 1 \\ &= (y^2 - 4y + 4) - 4 + 1 \\ &= \boxed{(y - 2)^2 - 3}. \end{aligned}$$


Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y - 2$ berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke atas, dan menambahkan konstanta -3 pada x berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 2 satuan ke atas, sehingga diperoleh kurva $x = (y - 2)^2$ dengan titik puncak $(0, 2)$.

(iii) Geser kurva $x = (y-2)^2$ sejauh 3 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y-2)^2 - 3$ dengan titik puncak $\boxed{(-3, 2)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 1$, yaitu titik $(1, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y - 2)^2 = 3$, yaitu $y = 2 \pm \sqrt{3}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 - 4y + 1$ adalah

parabola $x = y^2$ yang digeser 2 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri.

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x-1), & x \leq 2 \\ k(x+1), & x > 2 \end{cases}$.
Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.

Kata kunci materi: limit sepihak, fungsi sepotong-sepotong, persamaan kuadrat.

Penyelesaian:

Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada dan bernilai sama, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$. Untuk $x \to 2^-$ (yaitu $x < 2$) digunakan rumus $k^2(x-1)$, dan untuk $x \to 2^+$ (yaitu $x > 2$) digunakan rumus $k(x+1)$. Diperoleh

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} k^2(x-1) = k^2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} k(x+1) = 3k.$$

Agar limitnya ada, haruslah

$$\begin{aligned} k^2 &= 3k \\ k^2 - 3k &= 0 \\ k(k-3) &= 0, \end{aligned}$$

sehingga $k = 0$ atau $k = 3$. Jadi semua nilai k yang memenuhi adalah $k = 0$ atau $k = 3$.
Sebagai pengecekan, untuk $k = 0$ kedua limit sepihak bernilai 0, sedangkan untuk $k = 3$ kedua limit sepihak bernilai 9.

5. Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 + xy + y^2 = 3$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $y = -x$. Tentukan semua titik (a, b) dan persamaan garis singgungnya.

Kata kunci materi: turunan implisit, garis sejajar, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

Garis $y = -x$ memiliki gradien -1. Karena garis singgung sejajar dengan garis tersebut, maka di titik (a, b) haruslah $\boxed{\frac{dy}{dx} = -1}$. Kita turunkan kedua ruas persamaan kurva terhadap x, dengan aturan perkalian $\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}$ dan aturan rantai $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}$:

$$\begin{aligned} 2x + y + x\frac{dy}{dx} + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (x + 2y)\frac{dy}{dx} &= -(2x + y) \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{-\frac{2x + y}{x + 2y}}. \end{aligned}$$

Agar $\frac{dy}{dx} = -1$ di titik (a, b), haruslah

$$-\frac{2a + b}{a + 2b} = -1 \iff 2a + b = a + 2b \iff \boxed{a = b}.$$

Karena titik (a, b) terletak pada kurva, substitusi $b = a$ ke persamaan kurva:

$$a^2 + a(a) + a^2 = 3 \iff 3a^2 = 3 \iff a^2 = 1 \iff a = \pm 1.$$

Untuk $a = 1$ diperoleh $b = 1$, dan untuk $a = -1$ diperoleh $b = -1$. Dicek penyebutnya, yaitu $1+2(1) = 3 \neq 0$ dan $-1+2(-1) = -3 \neq 0$. Jadi titik-titik yang dimaksud adalah $\boxed{(1, 1) \text{ dan } (-1, -1)}$. Selanjutnya, dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan $m = -1$, diperoleh

- di titik $(1, 1)$: $y - 1 = -(x - 1)$, yaitu $y = -x + 2$;
- di titik $(-1, -1)$: $y + 1 = -(x + 1)$, yaitu $y = -x - 2$.

Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = -x + 2 \quad \text{dan} \quad y = -x - 2}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan ganda, notasi interval.

Penyelesaian:

Agar bentuk $\frac{1}{|x-3|}$ terdefinisi, haruslah $\boxed{x \neq 3}$, sehingga $|x-3| > 0$. Karena kedua ruas bernilai positif, membalik (mengambil kebalikan) setiap ruas akan membalik arah tanda pertidaksamaan, yaitu

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2 \iff \boxed{\frac{1}{2} \leq |x-3| < 1}.$$

Ingat kembali sifat nilai mutlak, yaitu untuk $a > 0$ berlaku $|u| < a \iff -a < u < a$ dan $|u| \geq a \iff u \leq -a \ \vee \ u \geq a$. Pertidaksamaan tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian:


- Untuk $|x-3| < 1$, diperoleh

$$-1 < x - 3 < 1 \implies 2 < x < 4.$$

- Untuk $|x-3| \geq \frac{1}{2}$, diperoleh

$$x - 3 \leq -\frac{1}{2} \quad \vee \quad x - 3 \geq \frac{1}{2} \implies x \leq \frac{5}{2} \quad \vee \quad x \geq \frac{7}{2}.$$

Penyelesaiannya adalah irisan dari kedua bagian tersebut (yang otomatis memenuhi $x \neq 3$), yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Sebagai pengecekan, untuk $x = \frac{9}{4}$ diperoleh $\frac{1}{|x-3|} = \frac{4}{3}$, dan berlaku $1 < \frac{4}{3} \leq 2$. Jadi semua nilai x yang memenuhi adalah $2 < x \leq \frac{5}{2}$ atau $\frac{7}{2} \leq x < 4$, atau dalam notasi interval $\boxed{\left(2, \frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{7}{2}, 4\right)}$.

2. Diberikan $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.

(a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.

(b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $16 - x^2 \geq 0$, yaitu $(4-x)(4+x) \geq 0$ yang dipenuhi oleh $-4 \leq x \leq 4$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x \leq 4\} = [-4, 4]}.$$

Selanjutnya, $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga syaratnya adalah $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2,\ x \neq 2\} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\sqrt{16 - x^2}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{16 - x^2}\right)^2 - 4} = \frac{1}{16 - x^2 - 4} = \boxed{\frac{1}{12 - x^2}}.$$

Domain dari fungsi komposisi $g \circ f$ adalah semua nilai x pada domain f sehingga nilai dari $f(x)$ berada pada domain g, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\} = \left\{x \in [-4, 4] : \sqrt{16 - x^2} \neq \pm 2\right\}}.$$

Karena $\sqrt{16 - x^2} \geq 0$, maka $\sqrt{16 - x^2} \neq -2$ selalu berlaku. Selanjutnya, $\sqrt{16 - x^2} = 2$ jika dan hanya jika $16 - x^2 = 4$, yaitu $x^2 = 12$ atau $x = \pm 2\sqrt{3}$. Kedua nilai ini berada di $[-4, 4]$ karena $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$. Didapatkan

$$\boxed{D(g \circ f) = [-4, 4] \setminus \left\{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\right\} = \left[-4, -2\sqrt{3}\right) \cup \left(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\right) \cup \left(2\sqrt{3}, 4\right]}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \left|\dfrac{x^2 - 4}{x + 2}\right|$. Dapatkan titik x di mana fungsi $f(x)$ diskontinu.
Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

Kata kunci materi: kekontinuan, diskontinuitas yang dapat dihapus, limit, nilai mutlak, sketsa grafik.
Penyelesaian:
Fungsi f tidak terdefinisi saat penyebutnya nol, yaitu $x + 2 = 0$ atau $x = -2$. Untuk $x \neq -2$, fungsi dapat disederhanakan menjadi


$$f(x) = \left|\frac{(x-2)(x+2)}{x+2}\right| = \boxed{|x-2|}, \quad x \neq -2.$$

Fungsi $|x-2|$ kontinu di setiap bilangan real, sehingga satu-satunya titik diskontinu dari f adalah titik di mana f tidak terdefinisi, yaitu $\boxed{x = -2}$.
Selanjutnya, limit fungsi di titik tersebut adalah

$$\lim_{x \to -2} f(x) = \lim_{x \to -2} |x - 2| = |-2 - 2| = 4.$$

Karena limitnya ada, diskontinuitas di $x = -2$ dapat dihilangkan dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limitnya, yaitu $\boxed{f(-2) = 4}$. Dengan definisi ini, $f(x) = |x - 2|$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sehingga f kontinu di mana-mana.

Grafik f sama dengan grafik $y = |x - 2|$, yaitu grafik $y = |x|$ yang digeser 2 satuan ke kanan, dengan titik puncak $(2, 0)$. Pada fungsi semula, titik $(-2, 4)$ berlubang (bulatan kosong), dan lubang tersebut tertutup setelah didefinisikan $f(-2) = 4$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 16}{\sqrt{x} - 4}, & x \neq 16 \\ 7, & x = 16 \end{cases}.$$

Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 16$. Jika tidak kontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan? Jelaskan.

Kata kunci materi: kekontinuan, limit fungsi, diskontinuitas yang dapat dihapus.

Penyelesaian:

Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

(a) $f(a)$ terdefinisi

(b) $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

(c) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 16$, $\boxed{f(16) = 7 \text{ terdefinisi}}$. Selanjutnya, karena $x - 16 = (\sqrt{x})^2 - 4^2 = (\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 4)$ untuk $x \geq 0$, limitnya adalah

$$\lim_{x \to 16} f(x) = \lim_{x \to 16} \frac{x - 16}{\sqrt{x} - 4} = \lim_{x \to 16} \frac{(\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 4)}{\sqrt{x} - 4} = \lim_{x \to 16} (\sqrt{x} + 4) = 4 + 4 = \boxed{8}.$$

Syarat pertama dan kedua terpenuhi, tetapi $\lim\limits_{x \to 16} f(x) = 8 \neq 7 = f(16)$, sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi. Jadi $\boxed{f \text{ tidak kontinu di } x = 16}$.

Karena $\lim\limits_{x \to 16} f(x)$ ada (bernilai 8), maka diskontinuitas di $x = 16$ $\boxed{\text{dapat dihilangkan}}$, yaitu dengan mendefinisikan ulang nilai fungsi di titik tersebut menjadi $f(16) = 8$. Dengan definisi baru ini, $f(x) = \sqrt{x} + 4$ untuk setiap $x \geq 0$, dan f kontinu di $x = 16$.

5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = x^2 + (3 - \sqrt{x})^{-1}$.

Kata kunci materi: turunan kedua, aturan rantai, aturan perkalian.

Penyelesaian:

Fungsi f terdefinisi untuk $x \geq 0$ dan $x \neq 9$, dan turunannya ada untuk $x > 0$, $x \neq 9$. Ingat kembali aturan rantai, yaitu $\boxed{\frac{d}{dx}[h(g(x))] = h'(g(x)) \cdot g'(x)}$, serta $\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Turunan pertama dari f adalah

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x + (-1)\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \\ &= \boxed{2x + \frac{1}{2}x^{-1/2}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-2}}. \end{aligned}$$

Untuk turunan kedua, suku kedua diturunkan dengan aturan perkalian $(uv)' = u'v + uv'$, dengan $u = x^{-1/2}$ dan $v = (3 - \sqrt{x})^{-2}$, sehingga

$$\boxed{u' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}} \quad \text{dan} \quad \boxed{v' = -2\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-3} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = x^{-1/2}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-3}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2 + \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-2} + x^{-1/2} \cdot x^{-1/2}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{-3}\right] \\ &= 2 - \frac{1}{4x\sqrt{x}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{2}} + \frac{1}{2x\left(3 - \sqrt{x}\right)^{3}} \\ &= 2 + \frac{-\left(3 - \sqrt{x}\right) + 2\sqrt{x}}{4x\sqrt{x}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{3}} \\ &= \boxed{2 + \frac{3\left(\sqrt{x} - 1\right)}{4x\sqrt{x}\left(3 - \sqrt{x}\right)^{3}}}, \quad x > 0,\ x \neq 9. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{1}{x-3} \leq \frac{2}{x+1}.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{2}{x+1}$ dari kedua ruas, didapatkan

$$\frac{1}{x-3} - \frac{2}{x+1} \leq 0$$

Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{(x+1)-2(x-3)}{(x-3)(x+1)} &\leq 0 \\ \frac{x+1-2x+6}{(x-3)(x+1)} &\leq 0 \\ \frac{7-x}{(x-3)(x+1)} &\leq 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} 7-x=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=7} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (1) sebagai berikut

- Untuk $x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{7-(-2)}{(-2-3)(-2+1)} = \frac{9}{(-5)(-1)} = \frac{9}{5} > 0$$

- Untuk $-1 < x < 3$, misalkan $x = 0$:


$$\frac{7-0}{(0-3)(0+1)} = \frac{7}{-3} < 0$$

- Untuk $3 < x < 7$, misalkan $x = 4$:

$$\frac{7-4}{(4-3)(4+1)} = \frac{3}{5} > 0$$

- Untuk $x > 7$, misalkan $x = 8$:

$$\frac{7-8}{(8-3)(8+1)} = \frac{-1}{45} < 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (1) kurang dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda negatif beserta pembuat nol pembilang ($x = 7$). Pembuat nol penyebut ($x = -1$ dan $x = 3$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $-1 < x < 3$ atau $x \geq 7$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-1, 3) \cup [7, \infty)}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ dan $g(x) = \sqrt{7-x}$. Tentukan:
   (a) Domain fungsi f dan g.
   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, operasi pembagian fungsi, domain fungsi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 3 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 3\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif, yaitu $7 - x \geq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 7\} = (-\infty, 7]}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\sqrt{7-x}\right) = \boxed{\frac{1}{\sqrt{7-x} - 3}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \in (-\infty, 7] : \sqrt{7-x} \neq 3\right\}}.$$

Karena $\sqrt{7-x}=3$ jika dan hanya jika $7-x=9$, yang berarti $x=-2$, didapatkan

$$\boxed{D(f\circ g)=(-\infty,7]\setminus\{-2\}=(-\infty,-2)\cup(-2,7]}.$$

Selanjutnya, untuk pembagian fungsi diperoleh

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\frac{1}{x-3}}{\sqrt{7-x}}=\boxed{\frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x}}}.$$

Domain dari $\frac{f}{g}$ adalah irisan domain f dan g, dikurangi nilai x yang membuat $g(x)=0$, yaitu

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right)=\{x\in D(f)\cap D(g):g(x)\neq 0\}}.$$

Karena $D(f)\cap D(g)=(-\infty,3)\cup(3,7]$ dan $g(x)=\sqrt{7-x}=0$ jika dan hanya jika $x=7$, didapatkan

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right)=(-\infty,3)\cup(3,7)}.$$

3. Diketahui $f(x)=\sqrt{9-x^2}$.

   (a) Tentukan domain $f(x)$.

   (b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.

   (c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada, kemudian dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi satu-satu, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $9-x^2\geq 0$, yaitu $(3-x)(3+x)\geq 0$ yang dipenuhi oleh $-3\leq x\leq 3$. Jadi

   $$\boxed{D(f)=\{x\in\mathbb{R}:-3\leq x\leq 3\}=[-3,3]}.$$

   (b) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif), yaitu setiap nilai y hanya dicapai oleh tepat satu nilai x. Diperhatikan bahwa grafik f adalah setengah lingkaran atas $x^2+y^2=9$, dan misalnya

   $$f(-3)=\sqrt{9-9}=0=f(3)\quad\text{padahal}\quad -3\neq 3.$$

   Jadi f tidak satu-satu pada $[-3,3]$, sehingga $\boxed{f^{-1}(x)\text{ tidak ada}}$ (secara grafik, garis mendatar $y=c$ dengan $0\leq c<3$ memotong grafik di dua titik).

   (c) Agar f satu-satu, domain f dibatasi pada salah satu sisi sumbu-y, misalnya $\boxed{D(f)=[0,3]}$. Pada domain ini, f turun dari $f(0)=3$ sampai $f(3)=0$, sehingga $R(f)=[0,3]$.
   Misalkan $y=f(x)$ dengan $x\in[0,3]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y.

Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{9-x^2} \\ y^2 &= 9-x^2 \\ x^2 &= 9-y^2 \\ x &= \sqrt{9-y^2} \quad \text{(karena } x \geq 0\text{)}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt{9-y^2}$. Dengan mengganti y dengan x, dan mengingat bahwa domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{9-x^2}, \quad D(f^{-1}) = R(f) = [0,3]}.$$

Menariknya, pada domain $[0,3]$ fungsi invers ini sama dengan fungsi asalnya, karena grafik seperempat lingkaran tersebut simetris terhadap garis $y = x$.
Catatan: jika dipilih domain $[-3,0]$, maka diperoleh $f^{-1}(x) = -\sqrt{9-x^2}$ dengan domain $[0,3]$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{9-x}{3-\sqrt{x}}, & x \neq 9 \\ k, & x = 9 \end{cases}, \quad \text{dengan } x \in [0,\infty).$$

(a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 9$.

(b) Untuk nilai k tersebut, nyatakan $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit fungsi, fungsi sepotong-sepotong.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

i. $f(a)$ terdefinisi

ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$

iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 9$, $\boxed{f(9) = k \text{ terdefinisi}}$. Karena untuk $x \geq 0$ berlaku $9 - x = 3^2 - (\sqrt{x})^2 = (3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 9} f(x) = \lim_{x\to 9} \frac{9-x}{3-\sqrt{x}} = \lim_{x\to 9} \frac{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})}{3-\sqrt{x}} = \lim_{x\to 9}(3+\sqrt{x}) = 3+3 = \boxed{6}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\boxed{\lim\limits_{x\to 9} f(x) = f(9)}$, sehingga diperoleh $\boxed{k = 6}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \in [0,\infty)$ dengan $x \neq 9$ berlaku $f(x) = 3+\sqrt{x}$ (dari proses perhitungan limit di atas), dan untuk $x = 9$ nilai $3 + \sqrt{9} = 6 = k = f(9)$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan tanpa bentuk sepotong-sepotong sebagai

$$\boxed{f(x) = 3+\sqrt{x}, \quad x \in [0,\infty)}.$$

5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = 3x + (2\sqrt{x}+1)^{-1}$.

Kata kunci materi: turunan kedua, aturan rantai, aturan perkalian.

Penyelesaian:

Fungsi f terdefinisi untuk $x \geq 0$, dan turunannya ada untuk $x > 0$. Ingat kembali aturan rantai, yaitu $\frac{d}{dx}[h(g(x))] = h'(g(x)) \cdot g'(x)$, serta $\frac{d}{dx}\left(2\sqrt{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Turunan pertama dari f adalah

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 + (-1)\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= 3 - x^{-1/2}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-2}. \end{aligned}$$

Untuk turunan kedua, suku kedua diturunkan dengan aturan perkalian $(uv)' = u'v + uv'$, dengan $u = x^{-1/2}$ dan $v = \left(2\sqrt{x}+1\right)^{-2}$, sehingga

$$u' = -\frac{1}{2}x^{-3/2} \quad \text{dan} \quad v' = -2\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-3} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = -2x^{-1/2}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-3}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f''(x) &= 0 - \left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-2} - 2x^{-1/2} \cdot x^{-1/2}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{-3}\right] \\ &= \frac{1}{2x\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{2}} + \frac{2}{x\left(2\sqrt{x}+1\right)^{3}} \\ &= \frac{(2\sqrt{x}+1)+4\sqrt{x}}{2x\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{3}} \\ &= \frac{6\sqrt{x}+1}{2x\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)^{3}}, \quad x > 0. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan garis ℓ melalui titik $(3,2)$ dan (a,b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0,-1)$ dan (a,b) dengan kemiringan -1. Dapatkan nilai a dan b.

   Kata kunci materi: kemiringan garis, persamaan garis, sistem persamaan linear.
   Penyelesaian:
   Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1,y_1) dan (x_2,y_2) adalah $\boxed{m=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}}$.

   - Garis ℓ melalui $(3,2)$ dan (a,b) dengan kemiringan 2, sehingga

   $$\frac{b-2}{a-3}=2 \implies b-2=2a-6 \implies \boxed{b=2a-4}.$$

   - Garis k melalui $(0,-1)$ dan (a,b) dengan kemiringan -1, sehingga

   $$\frac{b-(-1)}{a-0}=-1 \implies b+1=-a \implies \boxed{b=-a-1}.$$

   Dengan menyamakan kedua persamaan tersebut, diperoleh

   $$2a-4=-a-1 \implies 3a=3 \implies a=1,$$

   dan $b=2(1)-4=-2$. Sebagai pengecekan, kemiringan dari $(3,2)$ ke $(1,-2)$ adalah $\frac{-2-2}{1-3}=2$, dan kemiringan dari $(0,-1)$ ke $(1,-2)$ adalah $\frac{-2+1}{1-0}=-1$. Jadi $\boxed{a=1 \text{ dan } b=-2}$, yaitu titik $(a,b)=(1,-2)$ merupakan titik potong kedua garis.

2. Gambarkan kurva dasar $y=\dfrac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y=\dfrac{1}{x+1}-2$ (Jelaskan ilustrasinya).


   Kata kunci materi: fungsi rasional, asimtot, translasi grafik.
   Penyelesaian:
   Kurva dasar $y=\frac{1}{x}$ merupakan hiperbola yang terletak di kuadran I dan III, dengan asimtot tegak $x=0$ (sumbu-y) dan asimtot datar $y=0$ (sumbu-x). Kurva ini melalui titik-titik seperti $(1,1)$, $\left(2,\frac{1}{2}\right)$, $(-1,-1)$, dan $\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$.
   Ingat kembali bahwa mengganti x dengan $x+1$ berarti menggeser grafik sejauh 1 satuan ke kiri, dan menambahkan konstanta -2 pada y berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke bawah. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

   (i) Gambar kurva dasar $y=\frac{1}{x}$ dengan asimtot $x=0$ dan $y=0$.

(ii) Geser kurva $y = \frac{1}{x}$ sejauh 1 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $y = \frac{1}{x+1}$ dengan asimtot tegak $x = -1$ dan asimtot datar $y = 0$.

(iii) Geser kurva $y = \frac{1}{x+1}$ sejauh 2 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $y = \frac{1}{x+1} - 2$ dengan asimtot tegak $\boxed{x = -1}$ dan asimtot datar $\boxed{y = -2}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $y = 1 - 2 = -1$, yaitu titik $(0, -1)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $\frac{1}{x+1} = 2$, yaitu $x = -\frac{1}{2}$. Titik $(1, 1)$ pada kurva dasar berpindah ke titik $(0, -1)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $y = \frac{1}{x+1} - 2$ adalah

$\boxed{\text{hiperbola } y = \frac{1}{x} \text{ yang digeser 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah}}$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 3$.

(a) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

(b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

(c) Sketsa grafik dari $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: fungsi invers, domain dan range, sketsa grafik fungsi invers.
Penyelesaian:

(a) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{x-1} + 3 \\ y - 3 &= \sqrt[3]{x-1} \\ (y-3)^3 &= x - 1 \\ x &= (y-3)^3 + 1. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = (y-3)^3 + 1$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh


$$\boxed{f^{-1}(x) = (x-3)^3 + 1}.$$

(b) Akar pangkat tiga terdefinisi untuk setiap bilangan real (termasuk bilangan negatif), sehingga $D(f) = \mathbb{R}$, dan nilai $\sqrt[3]{x-1}$ dapat mencapai sebarang bilangan real, sehingga $R(f) = \mathbb{R}$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu

$$\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = \mathbb{R}} \quad \text{dan} \quad \boxed{R(f^{-1}) = D(f) = \mathbb{R}}.$$

Hal ini sesuai dengan $f^{-1}(x) = (x-3)^3 + 1$ yang merupakan fungsi polinomial.

(c) Grafik f adalah grafik $y = \sqrt[3]{x}$ yang digeser 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, dengan titik belok $(1, 3)$. Grafik f^{-1} adalah grafik $y = x^3$ yang digeser 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, dengan titik belok $(3, 1)$, dan merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$. Sebagai bantuan, grafik f melalui titik $(0, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, dan $(9, 5)$, sehingga grafik f^{-1} melalui titik $(2, 0)$, $(3, 1)$, $(4, 2)$, dan $(5, 9)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+3}}{2-x}$.

Kata kunci materi: limit di tak hingga, bentuk akar, nilai mutlak.

Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, pembilang dan penyebut sama-sama menuju tak hingga, sehingga diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Untuk menyelesaikannya, keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$. Diperoleh

$$\sqrt{4x^2+3} = \sqrt{x^2\left(4 + \frac{3}{x^2}\right)} = |x|\sqrt{4 + \frac{3}{x^2}} = -x\sqrt{4 + \frac{3}{x^2}}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+3}}{2-x} &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{-x\left(1-\frac{2}{x}\right)}\\ &= \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{1-\frac{2}{x}}\\ &= \frac{\sqrt{4+0}}{1-0}\\ &= \boxed{2}.\end{aligned}$$

5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $xy^2+2y-\sqrt{x}=2$ di titik $(1,1)$.

Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1,1)$ terletak pada kurva, yaitu $1(1)^2+2(1)-\sqrt{1}=1+2-1=2$. Selanjutnya, kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan perkalian dan aturan rantai, diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dx}(xy^2)=y^2+2xy\frac{dy}{dx}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned}y^2+2xy\frac{dy}{dx}+2\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2\sqrt{x}} &= 0\\ (2xy+2)\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}}-y^2\\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}-y^2}{2xy+2}}.\end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi titik $(1,1)$ ke dalam turunan:

$$m=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)}=\frac{\frac{1}{2}-1}{2(1)(1)+2}=\frac{-\frac{1}{2}}{4}=\boxed{-\frac{1}{8}}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y-y_1=m(x-x_1)$, di mana $(x_1,y_1)=(1,1)$, diperoleh

$$\begin{aligned}y-1 &= -\frac{1}{8}(x-1)\\ y &= -\frac{1}{8}x+\frac{9}{8}.\end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1,1)$ adalah $\boxed{y=-\frac{1}{8}x+\frac{9}{8}}$ atau $x+8y=9$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x+1} < \dfrac{1}{3-x}$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{1}{3-x}$ dari kedua ruas, didapatkan

   $$\frac{2}{x+1} - \frac{1}{3-x} < 0$$

   Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{2(3-x)-(x+1)}{(x+1)(3-x)} &< 0 \\ \frac{6-2x-x-1}{(x+1)(3-x)} &< 0 \\ \frac{5-3x}{(x+1)(3-x)} &< 0 \end{aligned} \tag{2}$$

   Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

   $$5-3x=0 \quad \vee \quad x+1=0 \quad \vee \quad 3-x=0$$
   $$\boxed{x=\frac{5}{3}} \quad \vee \quad \boxed{x=-1} \quad \vee \quad \boxed{x=3}$$

   Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (2) sebagai berikut

   - Untuk $x < -1$, misalkan $x = -2$:

     $$\frac{5-3(-2)}{(-2+1)(3-(-2))} = \frac{11}{(-1)(5)} = \frac{11}{-5} < 0$$

   - Untuk $-1 < x < \frac{5}{3}$, misalkan $x = 0$:


     $$\frac{5-0}{(0+1)(3-0)} = \frac{5}{3} > 0$$

   - Untuk $\frac{5}{3} < x < 3$, misalkan $x = 2$:

     $$\frac{5-6}{(2+1)(3-2)} = \frac{-1}{3} < 0$$

- Untuk $x > 3$, misalkan $x = 4$:

$$\frac{5-12}{(4+1)(3-4)} = \frac{-7}{-5} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (2) kurang dari nol, diambil interval yang bertanda negatif tanpa pembuat nol. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\left\{x \in \mathbb{R} : x < -1 \ \vee \ \frac{5}{3} < x < 3\right\} = (-\infty, -1) \cup \left(\frac{5}{3}, 3\right)}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{16-x^2}}$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $2-x \geq 0$, yaitu $x \leq 2$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\} = (-\infty, 2]}.$$

   Selanjutnya, $g(x)$ memuat akar kuadrat di penyebut, sehingga ekspresi di dalam akar harus positif (tidak boleh nol), yaitu $16 - x^2 > 0$ atau $(4-x)(4+x) > 0$, yang dipenuhi oleh $-4 < x < 4$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : -4 < x < 4\} = (-4, 4)}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{\sqrt{16 - \left(\sqrt{2-x}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{16-(2-x)}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{14+x}}}.$$

   Domain dari fungsi komposisi $g \circ f$ adalah semua nilai x pada domain f sehingga nilai dari $f(x)$ berada pada domain g, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\} = \left\{x \leq 2 : -4 < \sqrt{2-x} < 4\right\}}.$$

   Karena $\sqrt{2-x} \geq 0 > -4$, syarat $\sqrt{2-x} > -4$ selalu berlaku. Selanjutnya, $\sqrt{2-x} < 4$ jika dan hanya jika $2 - x < 16$, yaitu $x > -14$. Dengan menggabungkan syarat $x \leq 2$, didapatkan

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} : -14 < x \leq 2\} = (-14, 2]}.$$

Catatan: meskipun bentuk akhir $\frac{1}{\sqrt{14+x}}$ terdefinisi untuk $x > 2$, nilai-nilai tersebut tidak termasuk domain karena $f(x)$ tidak terdefinisi di sana.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 - \sqrt{6x - x^2}$ dengan domain f adalah $[0, a]$.

   (a) Dapatkan nilai terbesar a sehingga $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.

   (c) Gambarkan sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

   Kata kunci materi: melengkapkan kuadrat, setengah lingkaran, fungsi satu-satu, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh $6x - x^2 = 9 - (x^2 - 6x + 9) = \boxed{9 - (x-3)^2}$, sehingga $f(x) = 1 - \sqrt{9 - (x-3)^2}$ yang terdefinisi untuk $0 \le x \le 6$. Jika $y = f(x)$, maka $1 - y = \sqrt{9 - (x-3)^2} \ge 0$ dan

   $$(1-y)^2 = 9 - (x-3)^2 \iff \boxed{(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9}, \quad y \le 1,$$

   sehingga grafik f adalah setengah lingkaran bagian bawah dengan pusat $(3, 1)$ dan jari-jari 3. Grafik ini turun pada $[0, 3]$ dan naik pada $[3, 6]$. Agar f satu-satu pada $[0, a]$, domain tidak boleh melewati titik terendah $x = 3$, sehingga haruslah $a \le 3$. Jadi nilai terbesar a adalah $\boxed{a = 3}$.

   (b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \in [0, 3]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh


   $$\begin{aligned} y &= 1 - \sqrt{9 - (x-3)^2} \\ \sqrt{9 - (x-3)^2} &= 1 - y \\ 9 - (x-3)^2 &= (1-y)^2 \\ (x-3)^2 &= 9 - (y-1)^2 \\ x - 3 &= -\sqrt{9 - (y-1)^2} \quad \text{(karena } x \le 3\text{)} \\ x &= 3 - \sqrt{9 - (y-1)^2}. \end{aligned}$$

   Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = 3 - \sqrt{9 - (y-1)^2}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

   $$\boxed{f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{9 - (x-1)^2} = 3 - \sqrt{8 + 2x - x^2}}.$$

   Pada domain $[0, 3]$, fungsi f turun dari $f(0) = 1$ sampai $f(3) = 1 - 3 = -2$, sehingga $D(f^{-1}) = R(f) = [-2, 1]$ dan $R(f^{-1}) = D(f) = [0, 3]$.

   (c) Grafik f adalah seperempat lingkaran berpusat di $(3, 1)$ dari titik $(0, 1)$ ke $(3, -2)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu seperempat lingkaran $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 9$ yang berpusat di $(1, 3)$, dari titik $(1, 0)$ ke $(-2, 3)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x \le 1 \\ 4x-2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit sepihak, turunan sepihak.

   Penyelesaian:

   Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

   (a) $f(a)$ terdefinisi

   (b) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$

   (c) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x = 1$, $\boxed{f(1) = 1^2 + 1 = 2 \text{ terdefinisi}}$. Selanjutnya, limit kiri dan limit kanannya adalah

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x^2+1) = 2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (4x-2) = 2,$$

   sehingga $\boxed{\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 2 = f(1)}$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x = 1}$.

   Selanjutnya, ingat bahwa f dapat diturunkan di $x = a$ jika limit $f'(a) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Untuk turunan kiri ($h < 0$, sehingga $1 + h < 1$), diperoleh

$$f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{(1+h)^2 + 1 - 2}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0^-} (2+h) = \boxed{2}.$$

   Untuk turunan kanan ($h > 0$, sehingga $1 + h > 1$), diperoleh

$$f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{4(1+h) - 2 - 2}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{4h}{h} = \boxed{4}.$$

   Karena $f'_-(1) = 2 \neq 4 = f'_+(1)$, maka $f'(1)$ tidak ada. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di } x = 1}.$$

   Secara grafik, di titik $(1, 2)$ grafik f membentuk "sudut" (tidak mulus).

5. Diketahui kurva $xy^2 + y^3 = 2x + 8$.

(a) Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$.

(b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva tersebut di titik $(0, 2)$.

Kata kunci materi: turunan implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

(a) Kita turunkan kedua ruas persamaan $xy^2 + y^3 = 2x + 8$ terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x (yaitu $y = y(x)$). Dengan aturan perkalian, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(xy^2) = y^2 + 2xy\dfrac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(y^3) = 3y^2\dfrac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} y^2 + 2xy\frac{dy}{dx} + 3y^2\frac{dy}{dx} &= 2 \\ (2xy + 3y^2)\frac{dy}{dx} &= 2 - y^2 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2 - y^2}{2xy + 3y^2}. \end{aligned}$$

Jadi diperoleh $\boxed{\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2 - y^2}{2xy + 3y^2}}$.

(b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(0, 2)$ terletak pada kurva, yaitu $0(2)^2 + 2^3 = 8 = 2(0) + 8$. Untuk mendapatkan gradien garis singgung di titik $(0, 2)$, substitusi $x = 0$ dan $y = 2$ ke dalam turunan yang telah diperoleh:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,2)} = \frac{2 - 2^2}{2(0)(2) + 3(2)^2} = \frac{-2}{12} = \boxed{-\frac{1}{6}}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (0, 2)$ dan $m = -\frac{1}{6}$, diperoleh:

$$\begin{aligned} y - 2 &= -\frac{1}{6}(x - 0) \\ y &= -\frac{1}{6}x + 2. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(0, 2)$ adalah $\boxed{y = -\dfrac{1}{6}x + 2}$ atau $x + 6y = 12$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2-5x+4}{x^2-x-6} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2-5x+4}{x^2-x-6} = \frac{(x-1)(x-4)}{(x-3)(x+2)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x-1=0 & \vee & x-4=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x+2=0 \\ \boxed{x=1} & \vee & \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=-2} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-1)(x-4)}{(x-3)(x+2)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -2$, misalkan $x = -3$:

$$\frac{(-3-1)(-3-4)}{(-3-3)(-3+2)} = \frac{(-4)(-7)}{(-6)(-1)} = \frac{28}{6} > 0$$

- Untuk $-2 < x < 1$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{(0-1)(0-4)}{(0-3)(0+2)} = \frac{(-1)(-4)}{(-3)(2)} = \frac{4}{-6} < 0$$

- Untuk $1 < x < 3$, misalkan $x = 2$:


$$\frac{(2-1)(2-4)}{(2-3)(2+2)} = \frac{(1)(-2)}{(-1)(4)} = \frac{2}{4} > 0$$

- Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

$$\frac{(3.5-1)(3.5-4)}{(3.5-3)(3.5+2)} = \frac{(2.5)(-0.5)}{(0.5)(5.5)} = \frac{-1.25}{2.75} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-1)(5-4)}{(5-3)(5+2)} = \frac{(4)(1)}{(2)(7)} = \frac{4}{14} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = 1$ dan $x = 4$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -2$ dan $x = 3$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x < -2$ atau $1 \leq x < 3$ atau $x \geq 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -2) \cup [1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(1, 3)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius $\sqrt{10}$, at $(1, 3)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (0, 0)$ dan $(x_2, y_2) = (1, 3)$, diperoleh

$$m_\ell = \frac{3-0}{1-0} = 3.$$

Jadi kemiringan garis ℓ adalah $\boxed{m_\ell = 3}$.


(b) Persamaan lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{10}$ adalah $x^2 + y^2 = 10$. Perhatikan bahwa titik $(1, 3)$ terletak pada lingkaran, karena $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$.
Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$.
Karena garis singgung tegak lurus dengan garis ℓ, maka gradien garis singgung m_s memenuhi

$$m_\ell \cdot m_s = -1 \implies 3 \cdot m_s = -1 \implies \boxed{m_s = -\frac{1}{3}}.$$

Garis singgung melalui titik $(1, 3)$ dengan gradien $-\frac{1}{3}$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - 3 &= -\frac{1}{3}(x-1) \\ y &= -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3} + 3 \\ y &= -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}}$ atau $x + 3y = 10$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Given $f(x) = x^3 - 1$.

   (a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

   Kata kunci materi: fungsi invers, domain dan range, sketsa grafik fungsi invers.
   Penyelesaian:


   (a) Fungsi $f(x) = x^3 - 1$ selalu naik, sehingga satu-satu dan mempunyai invers. Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

   $$\begin{aligned} y &= x^3 - 1 \\ x^3 &= y + 1 \\ x &= \sqrt[3]{y+1}. \end{aligned}$$

   Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y+1}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$.
   Karena f adalah fungsi polinomial berderajat tiga, maka $D(f) = \mathbb{R}$ dan $R(f) = \mathbb{R}$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = \mathbb{R}}$ (sesuai dengan akar pangkat tiga yang terdefinisi untuk setiap bilangan real). Jadi

   $$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}, \quad D(f^{-1}) = \mathbb{R}}.$$

   (b) Grafik f adalah grafik $y = x^3$ yang digeser 1 satuan ke bawah, dengan titik belok $(0, -1)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, dengan titik belok $(-1, 0)$. Sebagai bantuan, grafik f melalui titik $(-1, -2)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, dan $(2, 7)$, sehingga grafik f^{-1} melalui titik $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, dan $(7, 2)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. Calculate $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{3x^2+1}}{x-2}$.

   Kata kunci materi: limit di tak hingga, bentuk akar, nilai mutlak.

   Penyelesaian:

   Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{-\infty}$. Untuk menyelesaikannya, keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$. Diperoleh

   $$\sqrt{3x^2+1} = \sqrt{x^2\left(3+\frac{1}{x^2}\right)} = |x|\sqrt{3+\frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{3+\frac{1}{x^2}}.$$

   Dengan demikian,

   $$\begin{aligned}
   \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{3x^2+1}}{x-2} &= \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{3+\frac{1}{x^2}}}{x\left(1-\frac{2}{x}\right)} \\
   &= \lim_{x\to-\infty} \frac{-\sqrt{3+\frac{1}{x^2}}}{1-\frac{2}{x}} \\
   &= \frac{-\sqrt{3+0}}{1-0} \\
   &= \boxed{-\sqrt{3}}.
   \end{aligned}$$

   Hasil negatif ini masuk akal, karena untuk x negatif yang sangat besar, pembilangnya positif sedangkan penyebutnya negatif.

5. Find the equation of the tangent line to the curve $x^2y^2 + 2xy = 8y$ at the point $(2, 1)$.

   Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.

   Penyelesaian:

   Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(2, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $2^2(1)^2 + 2(2)(1) = 4 + 4 = 8 = 8(1)$. Selanjutnya, kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x.

Dengan aturan perkalian dan aturan rantai, diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dx}(x^2y^2) = 2xy^2 + 2x^2y\frac{dy}{dx}} \quad \text{dan} \quad \boxed{\frac{d}{dx}(2xy) = 2y + 2x\frac{dy}{dx}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} 2xy^2 + 2x^2y\frac{dy}{dx} + 2y + 2x\frac{dy}{dx} &= 8\frac{dy}{dx} \\ (2x^2y + 2x - 8)\frac{dy}{dx} &= -2xy^2 - 2y \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{xy^2 + y}{4 - x^2y - x}}. \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi titik $(2, 1)$ ke dalam turunan:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,1)} = \frac{2(1)^2 + 1}{4 - 2^2(1) - 2} = \frac{3}{-2} = \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (2, 1)$, diperoleh

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{3}{2}(x - 2) \\ y &= -\frac{3}{2}x + 3 + 1 \\ y &= -\frac{3}{2}x + 4. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(2, 1)$ adalah $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + 4}$ atau $3x + 2y = 8$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Kelompok	:	M2-14
Kelas	:	1-7
Departemen	:	Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, Studi Pembangunan, Bdigt, Skom
Jadwal kuliah	:	Jum'at, 07.00-09.30
Sesi	:	11
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x-2} \geq \dfrac{1}{x+1}$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{1}{x+1}$ dari kedua ruas, didapatkan

   $$\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+1} \geq 0$$

   Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{2(x+1)-(x-2)}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \\ \frac{2x+2-x+2}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \\ \frac{x+4}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \end{aligned} \tag{3}$$

   Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

   $$\begin{array}{ccccccc} x+4=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-4} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

   Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (3) sebagai berikut

   - Untuk $x < -4$, misalkan $x = -5$:

     $$\frac{-5+4}{(-5-2)(-5+1)} = \frac{-1}{(-7)(-4)} = \frac{-1}{28} < 0$$

   - Untuk $-4 < x < -1$, misalkan $x = -2$:


     $$\frac{-2+4}{(-2-2)(-2+1)} = \frac{2}{(-4)(-1)} = \frac{2}{4} > 0$$

   - Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

     $$\frac{0+4}{(0-2)(0+1)} = \frac{4}{-2} < 0$$

- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 3$:

$$\frac{3+4}{(3-2)(3+1)} = \frac{7}{4} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (3) lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = -4$). Pembuat nol penyebut ($x = -1$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x < -1 \ \vee \ x > 2\} = [-4, -1) \cup (2, \infty)}.$$

2. Diketahui garis l_1 melalui titik $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis l_2 yang melalui titik $(2, 1)$ dan tegak lurus dengan garis l_1.

   (b) Tentukan titik potong garis l_1 dan l_2.

   Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, persamaan garis, titik potong garis.
   Penyelesaian:

   (a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dengan substitusi $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$, diperoleh

$$m_1 = \frac{4-2}{3-(-1)} = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

   Dua garis saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$, sehingga $\frac{1}{2} \cdot m_2 = -1$ dan diperoleh $m_2 = -2$. Garis l_2 melalui titik $(2, 1)$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - 1 &= -2(x-2) \\ y &= -2x + 5. \end{aligned}$$

   Jadi persamaan garis l_2 adalah $\boxed{y = -2x + 5}$ atau $2x + y = 5$.

   (b) Terlebih dahulu ditentukan persamaan garis l_1, yaitu garis dengan gradien $\frac{1}{2}$ yang melalui titik $(-1, 2)$:

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x+1) \implies \boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}}.$$

   Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} &= -2x + 5 \\ x + 5 &= -4x + 10 \\ 5x &= 5 \implies x = 1. \end{aligned}$$

Substitusi $x = 1$ ke persamaan l_2, diperoleh $y = -2(1) + 5 = 3$ (dapat dicek pula $\frac{1}{2}(1) + \frac{5}{2} = 3$). Jadi titik potong garis l_1 dan l_2 adalah $\boxed{(1, 3)}$.

3. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 6 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned}$$

(a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.

(b) Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.

Kata kunci materi: sistem persamaan linear, matriks, eliminasi Gauss-Jordan.
Penyelesaian:

(a) Koefisien dari variabel x, y, z pada setiap persamaan disusun menjadi matriks A, variabelnya menjadi vektor $\mathbf{x}$, dan ruas kanan menjadi vektor b. Diperoleh

$$\boxed{\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}}_{b}}.$$

(b) Dibentuk matriks lengkap (*augmented matrix*) $[A \,|\, b]$, kemudian dilakukan operasi baris elementer (OBE) sampai terbentuk matriks eselon baris tereduksi.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 8 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3-3R_2]{R_1-2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{4}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2+R_3]{R_1-R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Matriks terakhir sudah berbentuk eselon baris tereduksi dan setiap kolom variabel memiliki pivot, sehingga SPL memiliki solusi tunggal, yaitu $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 2}$, dan $\boxed{z = 2}$.
Sebagai pengecekan, $1 + 2(2) - 2 = 3$, $2(1) - 2 + 3(2) = 6$, dan $-1 + 2 + 2(2) = 5$, sesuai dengan SPL. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah $\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 2)}$.

4. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

(a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

(b) Sketsa grafik $f(x)$ beserta titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu koordinat.

Kata kunci materi: fungsi kuadrat, melengkapkan kuadrat, domain dan range, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Karena f adalah fungsi polinomial (fungsi kuadrat), maka f terdefinisi untuk setiap bilangan real,

sehingga $\boxed{D(f) = \mathbb{R}}$. Selanjutnya, dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

$$f(x) = x^2 - 4x - 5 = (x^2 - 4x + 4) - 4 - 5 = \boxed{(x-2)^2 - 9}.$$


Karena $(x-2)^2 \geq 0$ untuk setiap x, maka $f(x) \geq -9$, dengan nilai minimum -9 dicapai saat $x = 2$. Grafiknya terbuka ke atas sehingga nilainya membesar tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq -9\} = [-9, \infty)}.$$

(b) Dari (a), titik puncak parabola adalah $\boxed{(2, -9)}$, dan karena koefisien x^2 positif, parabola terbuka ke atas.

- Titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$): $x^2 - 4x - 5 = (x-5)(x+1) = 0$, sehingga $x = 5$ atau $x = -1$, yaitu titik $\boxed{(-1, 0)}$ dan $\boxed{(5, 0)}$.
- Titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$): $f(0) = -5$, yaitu titik $\boxed{(0, -5)}$.

Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$3P = -Q_d + 150$$
$$2P = Q_s + 25$$

dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).

(a) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.

(b) Misalkan pemerintah memberikan pajak sebesar 5 untuk masing-masing barang. Tentukan persamaan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, titik equilibrium yang baru, dan pembagian pembayaran pajaknya.

(c) Gambarkan/sket kurva permintaan dan penawaran (sebelum dan sesudah pajak) beserta titik keseimbangannya.

Kata kunci materi: fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak per unit.
Penyelesaian:
Dari sistem persamaan yang diberikan, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Q_d = 150 - 3P} \quad \text{dan} \quad \boxed{Q_s = 2P - 25}.$$

(a) Titik keseimbangan (*equilibrium*) terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu $\boxed{Q_d = Q_s}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 150 - 3P &= 2P - 25 \\ 175 &= 5P \\ P &= 35. \end{aligned}$$

Substitusi $P = 35$ ke fungsi permintaan, diperoleh $Q = 150 - 3(35) = 150 - 105 = 45$ (dapat dicek pula $Q_s = 2(35) - 25 = 45$). Jadi titik keseimbangannya adalah $\boxed{E(Q, P) = (45, 35)}$, yaitu harga keseimbangan 35 dengan jumlah barang 45 unit.

(b) Pajak per unit $t = 5$ dibebankan kepada produsen, sehingga untuk menawarkan jumlah barang yang sama, produsen menaikkan harga sebesar 5. Dari fungsi penawaran semula $P = \frac{Q+25}{2}$, fungsi penawaran setelah pajak adalah

$$P = \frac{Q + 25}{2} + 5 \iff 2P = Q + 35 \iff \boxed{Q'_s = 2P - 35}.$$

Titik keseimbangan baru diperoleh dari $Q_d = Q'_s$, yaitu

$$\begin{aligned} 150 - 3P &= 2P - 35 \\ 185 &= 5P \\ P &= 37, \end{aligned}$$

dan $Q = 150 - 3(37) = 150 - 111 = 39$. Jadi titik keseimbangan setelah pajak adalah

$$\boxed{E'(Q, P) = (39, 37)}.$$

Selanjutnya, pembagian pembayaran pajak per unit adalah sebagai berikut.

- Pajak yang ditanggung konsumen per unit adalah kenaikan harga yang dibayar konsumen, yaitu $37 - 35 = 2$.
- Pajak yang ditanggung produsen per unit adalah sisanya, yaitu $5 - 2 = 3$.

Dengan jumlah barang setelah pajak sebanyak 39 unit, total pajak yang diterima pemerintah adalah $5 \times 39 = 195$, dengan pembagian


$$\boxed{\text{konsumen: } 2 \times 39 = 78, \quad \text{produsen: } 3 \times 39 = 117}.$$

(c) Dalam ekonomi, sumbu mendatar menyatakan jumlah barang Q dan sumbu tegak menyatakan harga P. Sebagai bantuan menggambar:

- Kurva permintaan $P = \frac{150-Q}{3}$ melalui titik $(0, 50)$ dan $(150, 0)$, dan turun dari kiri ke kanan.

- Kurva penawaran sebelum pajak $P = \frac{Q+25}{2}$ melalui titik $(0; 12{,}5)$ dan $(45, 35)$, dan naik dari kiri ke kanan.
- Kurva penawaran setelah pajak $P = \frac{Q+35}{2}$ melalui titik $(0; 17{,}5)$ dan $(39, 37)$, yaitu kurva penawaran semula yang bergeser 5 satuan ke atas.

Sketsa kurva permintaan, penawaran, dan titik keseimbangannya adalah sebagai berikut



SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Group	:	M2-iup
Class	:	8, 9
Department	:	Information Systems, Business Management
Lecture schedule	:	Friday, 07.00-09.30
Session	:	11
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of $\dfrac{3}{x+2} \leq \dfrac{1}{x-2}$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{1}{x-2}$ dari kedua ruas, didapatkan

   $$\frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-2} \leq 0$$

   Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{3(x-2)-(x+2)}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \\ \frac{3x-6-x-2}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \\ \frac{2(x-4)}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \end{aligned} \tag{4}$$

   Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

   $$\begin{array}{ccccccc} x-4=0 & \vee & x+2=0 & \vee & x-2=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-2} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

   Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (4) sebagai berikut

   - Untuk $x < -2$, misalkan $x = -3$:

     $$\frac{2(-3-4)}{(-3+2)(-3-2)} = \frac{-14}{(-1)(-5)} = \frac{-14}{5} < 0$$

   - Untuk $-2 < x < 2$, misalkan $x = 0$:


     $$\frac{2(0-4)}{(0+2)(0-2)} = \frac{-8}{-4} > 0$$

   - Untuk $2 < x < 4$, misalkan $x = 3$:

     $$\frac{2(3-4)}{(3+2)(3-2)} = \frac{-2}{5} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{2(5-4)}{(5+2)(5-2)} = \frac{2}{21} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (4) kurang dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda negatif beserta pembuat nol pembilang ($x = 4$). Pembuat nol penyebut ($x = -2$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\{x \in \mathbb{R} : x < -2 \ \vee \ 2 < x \leq 4\} = (-\infty, -2) \cup (2, 4]}.$$

2. (a) Determine the value of k such that the line $\ell_1 : kx + 2y = 7$ is perpendicular to the line $\ell_2 : 4x - 6y = 1$.

   (b) Using the value of k in (a), find the equation of the line passing through $(1, 2)$ that is parallel to ℓ_1.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, garis sejajar, persamaan garis.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali bahwa garis $ax + by = c$ dapat ditulis menjadi $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, sehingga gradiennya adalah $m = -\frac{a}{b}$. Diperoleh

$$\ell_1 : kx + 2y = 7 \implies y = -\frac{k}{2}x + \frac{7}{2} \implies \boxed{m_1 = -\frac{k}{2}},$$
$$\ell_2 : 4x - 6y = 1 \implies y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} \implies \boxed{m_2 = \frac{2}{3}}.$$

Dua garis saling tegak lurus jika $m_1 \cdot m_2 = -1$, sehingga

$$-\frac{k}{2} \cdot \frac{2}{3} = -1 \implies -\frac{k}{3} = -1 \implies k = \boxed{3}.$$

(b) Untuk $k = 3$, garis ℓ_1 adalah $3x + 2y = 7$ dengan gradien $m_1 = -\frac{3}{2}$. Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama, sehingga garis yang dicari memiliki gradien $-\frac{3}{2}$ dan melalui titik $(1, 2)$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$$
$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} + 2$$
$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}.$$

Jadi persamaan garisnya adalah $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}}$ atau $3x + 2y = 7$.

Catatan: garis yang diperoleh ternyata sama dengan ℓ_1 itu sendiri, karena titik $(1, 2)$ terletak pada

ℓ_1, yaitu $3(1) + 2(2) = 7$. Satu-satunya garis yang sejajar ℓ_1 dan melalui titik pada ℓ_1 adalah ℓ_1 sendiri (garis yang berimpit).

3. Given the system of linear equations

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 3 \\ x - y + 2z &= 1 \\ 3x + 2y + z &= 8 \end{aligned}$$

   (a) Write the system in the matrix equation form $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Using Gauss-Jordan elimination, find the solution (if any) of the system.

Kata kunci materi: sistem persamaan linear, matriks, eliminasi Gauss-Jordan.
Penyelesaian:

(a) Koefisien dari variabel x, y, z pada setiap persamaan disusun menjadi matriks A, variabelnya menjadi vektor $\mathbf{x}$, dan ruas kanan menjadi vektor b. Diperoleh

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}}_{b}.$$

(b) Dibentuk matriks lengkap (*augmented matrix*) $[A \,|\, b]$, kemudian dilakukan operasi baris elementer (OBE) sampai terbentuk matriks eselon baris tereduksi. Agar pivot pertama bernilai 1, baris pertama dan kedua ditukar terlebih dahulu.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 - 3R_1]{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & 5 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{\frac{1}{5} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 - 3R_2]{R_1 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{2} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 + R_3]{R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Matriks terakhir sudah berbentuk eselon baris tereduksi dan setiap kolom variabel memiliki pivot, sehingga SPL memiliki solusi tunggal, yaitu $x = 1$, $y = 2$, dan $z = 1$.
Sebagai pengecekan, $2(1) + 2 - 1 = 3$, $1 - 2 + 2(1) = 1$, dan $3(1) + 2(2) + 1 = 8$, sesuai dengan SPL. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah $(x, y, z) = (1, 2, 1)$.

4. Given the function $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

   (a) Find the domain and range of $f(x)$.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ including its vertex and its intersection points with the coordinate axes.

Kata kunci materi: fungsi kuadrat, melengkapkan kuadrat, domain dan range, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Karena f adalah fungsi polinomial (fungsi kuadrat), maka f terdefinisi untuk setiap bilangan real, sehingga $\boxed{D(f) = \mathbb{R}}$. Selanjutnya, dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

$$f(x) = -x^2 + 4x + 5 = -(x^2 - 4x + 4) + 4 + 5 = \boxed{-(x-2)^2 + 9}.$$


Karena $-(x-2)^2 \leq 0$ untuk setiap x, maka $f(x) \leq 9$, dengan nilai maksimum 9 dicapai saat $x = 2$. Grafiknya terbuka ke bawah sehingga nilainya mengecil tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \leq 9\} = (-\infty, 9]}.$$

(b) Dari (a), titik puncak parabola adalah $\boxed{(2,9)}$, dan karena koefisien x^2 negatif, parabola terbuka ke bawah.

- Titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$): $-x^2 + 4x + 5 = -(x-5)(x+1) = 0$, sehingga $x = 5$ atau $x = -1$, yaitu titik $\boxed{(-1,0)}$ dan $\boxed{(5,0)}$.
- Titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$): $f(0) = 5$, yaitu titik $\boxed{(0,5)}$.

Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



5. Given the demand and supply functions

$$4P = -Q_d + 140$$
$$3P = Q_s + 14$$

where P, Q_d, Q_s are the price, the quantity demanded, and the quantity supplied, respectively.

(a) Find the equilibrium price and quantity.

(b) Suppose the government imposes a tax of 7 per unit. Find the supply function after tax, the new equilibrium point, and how the tax burden is shared between consumers and producers.

(c) Sketch the demand and supply curves (before and after tax) and the equilibrium points.

Kata kunci materi: fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak per unit.
Penyelesaian:
Dari sistem persamaan yang diberikan, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Q_d = 140 - 4P} \quad \text{dan} \quad \boxed{Q_s = 3P - 14}.$$

(a) Titik keseimbangan (*equilibrium*) terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu $\boxed{Q_d = Q_s}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 140 - 4P &= 3P - 14 \\ 154 &= 7P \\ P &= 22. \end{aligned}$$

Substitusi $P = 22$ ke fungsi permintaan, diperoleh $Q = 140 - 4(22) = 140 - 88 = 52$ (dapat dicek pula $Q_s = 3(22) - 14 = 52$). Jadi titik keseimbangannya adalah $\boxed{E(Q, P) = (52, 22)}$, yaitu harga keseimbangan 22 dengan jumlah barang 52 unit.

(b) Pajak per unit $t = 7$ dibebankan kepada produsen, sehingga untuk menawarkan jumlah barang yang sama, produsen menaikkan harga sebesar 7. Dari fungsi penawaran semula $P = \frac{Q+14}{3}$, fungsi penawaran setelah pajak adalah

$$P = \frac{Q + 14}{3} + 7 \iff 3P = Q + 35 \iff \boxed{Q'_s = 3P - 35}.$$

Titik keseimbangan baru diperoleh dari $Q_d = Q'_s$, yaitu

$$\begin{aligned} 140 - 4P &= 3P - 35 \\ 175 &= 7P \\ P &= 25, \end{aligned}$$

dan $Q = 140 - 4(25) = 140 - 100 = 40$. Jadi titik keseimbangan setelah pajak adalah

$$\boxed{E'(Q, P) = (40, 25)}.$$

Selanjutnya, pembagian pembayaran pajak per unit adalah sebagai berikut.

- Pajak yang ditanggung konsumen per unit adalah kenaikan harga yang dibayar konsumen, yaitu $25 - 22 = 3$.
- Pajak yang ditanggung produsen per unit adalah sisanya, yaitu $7 - 3 = 4$.

Dengan jumlah barang setelah pajak sebanyak 40 unit, total pajak yang diterima pemerintah adalah $7 \times 40 = 280$, dengan pembagian

$$\boxed{\text{konsumen: } 3 \times 40 = 120, \quad \text{produsen: } 4 \times 40 = 160}.$$

(c) Dalam ekonomi, sumbu mendatar menyatakan jumlah barang Q dan sumbu tegak menyatakan harga P. Sebagai bantuan menggambar:

- Kurva permintaan $P = \frac{140-Q}{4}$ melalui titik $(0, 35)$ dan $(140, 0)$, dan turun dari kiri ke kanan.

- Kurva penawaran sebelum pajak $P = \frac{Q+14}{3}$ melalui titik $\left(0, \frac{14}{3}\right)$ dan $(52, 22)$, dan naik dari kiri ke kanan.
- Kurva penawaran setelah pajak $P = \frac{Q+35}{3}$ melalui titik $\left(0, \frac{35}{3}\right)$ dan $(40, 25)$, yaitu kurva penawaran semula yang bergeser 7 satuan ke atas.

Sketsa kurva permintaan, penawaran, dan titik keseimbangannya adalah sebagai berikut

