#### Stroop现象

#### 调查问题

- 1. 我们的自变量是什么?因变量是什么?
- 2a. 此任务的适当假设集是什么?
- 2b. 你想执行什么类型的统计测试?
- 3. 报告关于此数据集的一些描述性统计。包含至少一个均值测量和至少一个可变性测量
- 4. 提供显示样本数据分布的一个或两个可视化。用一两句话说明你从图中观察到的结果
  - 一致条件的直方图

不一致条件的百方图

- 5. 你的置信水平和关键统计值是多少? 你是否成功拒绝零假设? 对试验任务得出一个结论。结果是否与你的期望一致?
- 6. 你觉得导致所观察到的效应的原因是什么? 你是否能想到会取得类似效应的替代或类似任务?

## Stroop现象

描述见附件

#### 调查问题

#### 1.我们的自变量是什么?因变量是什么?

- 自变量: 一致和不一致的两种测试条件。
- 因变量:参与者完成实验的时长。

#### 2a. 此任务的适当假设集是什么?

• 使用t检验,具体采用相依样本测试,即用相同的受试者测试2种条件,排除个体差异. uOld表示一致实验的耗时平均值,uNew表示不一致实验的耗时平均值。

H0: uOld = uNew 完成两次实验的时长相同

H1: uOld != uNew 完成两次实验的时长不同. (双尾)

### 2b. 你想执行什么类型的统计测试?

- 采用t检验, 因为不知道总体的平均值和方差等信息, 只能用样本来估算。
- 使用相依样本(同一组人进行2种实验),因为两次测试不会对测试者产生副作用,即不会相互影响。
- 采用双尾, 无方向假设, 因为时间可能变成抑或变短。

# 3. 报告关于此数据集的一些描述性统计。包含至少一个均值测量和至少一个可变性测量

中心测量:均值


• 可变性测量: 方差, 加上了贝塞尔修正

均值		方差	
	14.05		12.67
	22.02		23.01


# 4. 提供显示样本数据分布的一个或两个可视化。用一两句话说明你从图中观察到 的结果

根据直方图看出来不一致条件下耗时更久。

#### 一致条件的直方图



#### 不一致条件的直方图



- 5. 你的置信水平和关键统计值是多少? 你是否成功拒绝零假设? 对试验任务得出一个结论。结果是否与你的期望一致?
  - 置信水平95%,  $\alpha$ =0.05 双尾

• 关键统计值如下, 变量1表示一致条件, 变量2表示不一致条件

t-检验: 成对双样本均值分析				
	变量 1	变量 2		
平均	14.051125	22.0159167		
方差	12.6690291	23.011757		
观测值	24	24		
泊松相关系	0.35181953			
假设平均差	0			
df	23			
t Stat	-8.0207069			
t 双尾临界	2.06865761			

- 拒绝零假设, 因为tStat=-8.02 < tCritical=-2.09
- 结论: 对于Stroop现象,不一致的条件下明显比一致条件下耗时更久。

# 6. 你觉得导致所观察到的效应的原因是什么?你是否能想到会取得类似效应的替 代或类似任务?

原因: 人脑有第一信号系统和第二信号系统之分,前者是通过本能完成,即不用(或极少占用)大脑参与,因此反应更快。后者需要大脑思考,更加耗时。