

# Analisi 3

Appunti di Analisi 3 del corso di Giovanni Alberti e Maria Stella Gelli

Arianna Carelli e Antonio De Lucreziis

I Semestre 2021/2021

# Indice

<b>1</b>	<b>Teoria della misura</b>	<b>2</b>
1.1	Misure astratte . . . . .	2
1.2	Esempi di misure . . . . .	3
1.3	Funzioni misurabili . . . . .	3
1.3.1	Funzioni semplici . . . . .	4
1.4	Integrale . . . . .	4
1.5	Teoremi di convergenza . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Spazi <math>L^p</math> e convoluzione</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Spazi di Hilbert</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Serie di Fourier</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Applicazioni della serie di Fourier</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Trasformata di Fourier</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Funzioni armoniche</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Integrazione di superfici</b>	<b>14</b>
8.1	Indice Analitico . . . . .	15

# Capitolo 1

## Teoria della misura

### 1.1 Misure astratte

**Definizione.** Uno spazio misurabile è una terna  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  tale che

- $X$  è un insieme qualunque.
- $\mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $X$ , ovvero una famiglia di sottoinsiemi di  $X$  che rispetta le seguenti proprietà:
  - $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ .
  - $\mathcal{A}$  è chiusa per complementare, unione e intersezione numerabile.
- $\mu$  è una misura su  $X$ , ossia una funzione  $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$   $\sigma$ -addittiva, cioè tale che data una famiglia numerabile  $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$  disgiunta e posto  $E := \bigcup E_n$ , allora

$$\mu(E) = \sum_n \mu(E_n).$$

**Notazione.** Data una crescente di insiemi  $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset \dots$  con  $\bigcup E_n = E$ , scriviamo  $E_n \uparrow E$ .

**Proprietà.**

- $\mu(\emptyset) = 0$
- *Monotonia:* Dati  $E, E' \in \mathcal{A}$  e  $E \subset E'$ , allora  $\mu(E) \leq \mu(E')$ .
- Data una successione crescente di insiemi  $E_n \uparrow E$ , allora  $\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \sup_n \mu(E_n)$ .
- Se  $E_n \uparrow E$  e  $\mu(E_{\bar{n}}) < +\infty$  per qualche  $\bar{n}$ , allora  $\mu(E) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(E_n) = \inf_n \mu(E_n)$ .
- *Subadditività:* Se  $\bigcup E_n \supset E$ , allora  $\mu(E) \leq \sum_n \mu(E_n)$ .

**Osservazione.** Dato  $X' \in \mathcal{A}$  si possono restringere  $\mathcal{A}$  e  $\mu$  a  $X'$  nel modo ovvio.

**Definizioni.**

- $\mu$  si dice **completa** se  $F \subset E, E \in \mathcal{A}$  e  $\mu(E) = 0$ , allora  $F \in \mathcal{A}$  (e di conseguenza  $\mu(F) = 0$ ).
- $\mu$  si dice **finita** se  $\mu(X) < +\infty$ .
- $\mu$  si dice  **$\sigma$ -finita** se esiste una successione  $\{E_n\}$  con  $E_n \subset E_{n+1}$  tale che  $\bigcup E_n = X$  con  $\mu(E_n) < +\infty$  per ogni  $n$ .

**Notazione.** Sia  $P(x)$  un predicato che dipende da  $x \in X$  allora si dice che  $P(x)$  **vale  $\mu$ -quasi ogni**  $x \in X$  se l'insieme  $\{x \mid P(x) \text{ è falso}\}$  è (contenuto in) un insieme di misura  $\mu$  nulla.

D'ora in poi consideriamo solo misure complete.

## 1.2 Esempi di misure

- **Misura che conta i punti.**

$$X \text{ insieme} \quad \mathcal{A} := \mathcal{P}(X) \quad \mu(E) := \#E \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

- **Delta di Dirac in  $x_0$ .**

$$X \text{ insieme, } x_0 \in X \text{ fissato} \quad \mathcal{A} := \mathcal{P}(X) \quad \mu(E) := \delta_{x_0}(E) = \mathbb{1}_E(x_0)$$

- **Misura di Lebesgue.**

$$X = \mathbb{R}^n \quad \mathcal{M}^n \text{ } \sigma\text{-algebra dei misurabili secondo Lebesgue} \quad \mathcal{L}^n \text{ misura di Lebesgue}$$

Dato  $R$  parallelepipedo in  $\mathbb{R}^n$ , cioè  $R = \prod_{k=1}^n I_k$  con  $I_k$  intervalli in  $\mathbb{R}$ . Si pone

$$\text{vol}_n(R) := \prod_{k=1}^n \text{lung}(I_k)$$

per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$  (assumendo  $\text{lung}([a, b]) = b - a$ ). Infine poniamo

$$\mathcal{L}^n(E) := \inf \left\{ \sum_i \text{vol}_n(R_i) \mid \{R_i\} \text{ tale che } E \subset \bigcup_i R_i \right\}.$$

**Osservazioni.**

- $\mathcal{L}^n(R) = \text{vol}_n(R)$ .
- $\mathcal{L}^n$  è così definita se  $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  ma non è  $\sigma$ -addittiva.
- $\mathcal{L}^n$  è  $\sigma$ -addittiva su  $\mathcal{M}^n$  (è per questo che bisogna introdurre  $\mathcal{M}^n$ ).

Il terzo punto giustifica l'introduzione dei **misurabili secondo Lebesgue**. Dunque definiamo  $\mathcal{M}^n$ , dato  $E \subset \mathbb{R}^n$  si dice che  $E$  è misurabile (secondo Lebesgue) se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A \text{ aperto e } C \text{ chiuso con } C \subset E \subset A \text{ tali che } \mathcal{L}^n(A \setminus C) \leq \varepsilon$$

**Osservazioni.**

- Per ogni  $E$  misurabile vale

$$\mathcal{L}^n(E) = \inf \{ \mathcal{L}^n(A) : A \text{ aperto, } A \supset E \} = \sup \{ \mathcal{L}^n(K) : K \text{ compatto, } K \subset E \}.$$

- Notiamo che se  $F \subset E$  con  $E \subset \mathcal{M}^n$  e  $\mathcal{L}^n(E) = 0$ , allora  $F \in \mathcal{M}^n$ . Ovvero la misura di Lebesgue è completa!

**Notazione.**  $|E| := \mathcal{L}^n(E)$

## 1.3 Funzioni misurabili

**Definizione.** Dato  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  (o al posto di  $\mathbb{R}$  in  $Y$  spazio topologico), diciamo che  $f$  è **misurabile** (più precisamente  $\mathcal{A}$ -misurabile), se

$$\forall A \text{ aperto } f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$$

## Osservazioni.

- Dato  $E \subset X$ , vale  $E \in \mathcal{A}$  se e solo se  $\mathbb{1}_E$  è misurabile.
- La classe delle funzioni misurabili è chiusa rispetto a molte operazioni
  - *somma, prodotto* (se hanno senso nello spazio immagine della funzione).
  - *Composizione con funzione continua*: Se  $f: X \rightarrow Y$  continua e  $g: Y \rightarrow Y'$  continua, allora  $g \circ f$  è misurabile.
  - *Convergenza puntuale*: data una successione di  $f_n$  misurabili e  $f_n \rightarrow f$  puntualmente, allora  $f$  è misurabile.
  - $\liminf$  e  $\limsup$  (almeno nel caso  $Y = \mathbb{R}$ ).

### 1.3.1 Funzioni semplici

**Definizione.** Definiamo la classe delle **funzione semplici** come

$$\mathcal{S} := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid f = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{E_i} \text{ con } E_i \text{ misurabili e } \{\alpha_i\} \text{ finito} \right\}$$

**Osservazione.** La rappresentazione di una funzione semplice come combinazione lineare di indicatori di insiemi *non è unica*, però se necessario possiamo prendere gli  $E_i$  disgiunti.

## 1.4 Integrale

**Definizione.** Diamo la definizione di  $\int_X f \, d\mu$  per passi

- i) Se  $f \in \mathcal{S}$  e  $f \geq 0$  cioè  $f = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{E_i}$  con  $\alpha_i \geq 0$  allora poniamo

$$\int_X f \, d\mu := \sum_i \alpha_i \mu(E_i),$$

convenendo che  $0 \cdot +\infty = 0$  in quanto la misura di un insieme non è necessariamente finita.

- ii) Se  $f: X \rightarrow [0, +\infty]$  misurabile si pone

$$\int_X f \, d\mu := \sup_{\substack{g \in \mathcal{S} \\ 0 \leq g \leq f}} \int_X g \, d\mu.$$

- iii)  $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  misurabile si dice **integrabile** se

$$\int_X f^+ \, d\mu < +\infty \quad \text{oppure} \quad \int_X f^- \, d\mu < +\infty.$$

e per tali  $f$  si pone

$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

- iv)  $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **sommabile** (o di **classe**  $\mathcal{L}^1$ ) se  $\int_X |f| \, d\mu < +\infty$ .

In tal caso, se  $\int_X f_i^\pm \, d\mu < +\infty$  per ogni  $f_i$  componente di  $f$ , allora  $\int_X f \, d\mu$  esiste ed è finito.

Per tali  $f$  si pone

$$\int_X f \, d\mu := \left( \int_X f_1 \, d\mu, \dots, \int_X f_n \, d\mu \right).$$

*Notazione.* Scriveremo spesso  $\int_E f(x) \, dx$  invece di  $\int_E f \, d\mathcal{L}^n$ .

**Osservazione 1.** Si hanno le seguenti.

- L'integrale è lineare (sulle funzioni sommabili).
- Le definizioni in i) E ii) Danno lo stesso risultato per  $f$  semplice  $\geq 0$ .
- La definizione in ii) Ha senso per ogni  $f: X \rightarrow [0, +\infty]$  anche non misurabile. Ma in generale vale solo che

$$\int_X f_1 + f_2 \, d\mu \geq \int_X f_1 \, d\mu + \int_X f_2 \, d\mu.$$

- Dato  $E \in \mathcal{A}$ ,  $f$  misurabile su  $E$ , notiamo che vale l'uguaglianza

$$\int_E f \, d\mu := \int_X f \cdot \mathbb{1}_E \, d\mu.$$

- Si può definire  $\int_X f \, d\mu$  anche per  $f: X \rightarrow Y$  con  $Y$  spazio vettoriale normato finito dimensionale e  $f$  sommabile. (è necessario avere uno spazio vettoriale, perchè mi serve la linearità e la moltiplicazione per scalare).
- Se  $f_1 = f_2$   $\mu$ -q.o. allora  $\int_X f_1 \, d\mu = \int_X f_2 \, d\mu$ .
- Si definisce  $\int_X f \, d\mu$  anche se  $f$  è misurabile e definita su  $X \setminus N$  con  $\mu(N) = 0$ .
- se  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è integrabile secondo Riemann allora è misurabile secondo Lebesgue e le due nozioni di integrale coincidono. *Nota.* Lo stesso vale per integrali impropri di funzioni positive. Ma nel caso più generale non vale: se  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  è data da  $f(x) := \frac{\sin x}{x}$ , allora l'integrale di  $f$  definito su  $(0, +\infty)$  esiste come integrale improprio ma non secondo Lebesgue ( $\int_0^{+\infty} f^+ \, dx = \int_0^{+\infty} f^- \, dx = +\infty$ ).
- $\int_X f \, d\delta_{x_0} = f(x_0)$ .
- se  $X = \mathbb{N}$  e  $\mu$  è la misura che conta i punti l'integrale è

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

per le  $f$  positive o tali che  $\sum f^+(n) < +\infty$  oppure  $\sum f^-(n) < -\infty$ .

*Nota.*  $\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$  esiste come serie ma non come integrale. Da questo si osserva che serie e integrale non coincidono.

- Dato  $X$  qualunque,  $\mu$  misura che conta i punti e  $f: X \rightarrow [0, +\infty]$  posso definire la somma di tutti i valori di  $f$

$$\sum_{x \in X} f(x) := \int_X f \, d\mu.$$

## 1.5 Teoremi di convergenza

Prendo  $X, \mathcal{A}, \mu$  come al solito.

**Teorema 1.1** (Convergenza Monotona (Beppo Levi)). Date  $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$  misurabili, tali che  $f_n \uparrow f$  ovunque in  $X$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu,$$

dove

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu = \sup_n \int_X f_n \, d\mu.$$

**Teorema 1.2** (Lemma di Fatou). Date  $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$  misurabili, allora

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f \, d\mu \geq \int_X \left( \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n \right) \, d\mu.$$

**Teorema 1.3.** Date  $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$  (o anche  $\mathbb{R}^n$ ) tali che

*convergenza puntuale.*  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  per ogni  $x \in X$ .

*dominazione.* Esiste  $g: X \rightarrow [0, +\infty]$  sommabile tale che  $|f_n(x)| \leq g(x)$  per ogni  $x \in X$  e per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

*Nota.* la seconda proprietà è essenziale; sostituirla con  $\int_X |f_n| \, d\mu \leq C < +\infty$  non basta!

*Altro esempio di misura.* Data  $\rho: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty]$  misurabile, la misura con densità  $\rho$  è data da

$$\mu(E) = \int_E \rho \, dx \quad \text{per ogni } E \text{ misurabile.}$$

**Osservazione 2.** Si hanno le seguenti.

- $\mathbb{R}^n$  e  $\mathcal{L}^n$  possono essere sostituiti da  $X$  e  $\tilde{\mu}$ .
- il fatto che  $\mu$  è una misura segue da Beppo Levi, in particolare serve per mostrare la subaddittività.

**Teorema 1.4** (Cambio di variabile). Siano  $\Omega, \Omega'$  aperti di  $\mathbb{R}^n$ ,  $\phi: \Omega \rightarrow \Omega'$  un diffeomorfismo di classe  $C^1$  e  $f: \Omega' \rightarrow [0, +\infty]$  misurabile. Allora

$$\int_{\Omega'} f(x') \, dx' = \int_{\Omega} f(\phi(x)) |\det(\nabla \phi(x))| \, dx.$$

La stessa formula vale per  $f$  a valori in  $\overline{\mathbb{R}}$  integrabile e per  $f$  a valori in  $\mathbb{R}^n$  sommabile.

**Osservazione 3.** Si hanno le seguenti.

- Se  $n = 1$ ,  $|\det(\nabla \phi(x))| = |\phi'(x)|$  e non  $\phi'(x)$  come nella formula vista ad analisi 1 (l'informazione del segno viene data dall'inversione degli estremi).
- Indebolire le ipotesi su  $\phi$  è delicato. Basta  $\phi$  di classe  $C^1$  e  $\# \phi^{-1}(x') = 1$  per quasi ogni  $x' \in \Omega'$  (supponendo  $\phi$  iniettiva la proprietà precedente segue immediatamente). Se  $\phi$  non è "quasi" iniettiva bisogna correggere la formula per tenere conto della molteplicità.

Di seguito riportiamo il teorema di Fubini-Tonelli per la misura di Lebesgue.

**Teorema 1.5** (Fubini-Tonelli). Sia  $\mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}^{n_2} \simeq \mathbb{R}^n$  con  $n = n_1 + n_2$ ,  $E := E_1 \times E_2$  dove  $E_1, E_2$  sono misurabili e  $f$  è una funzione misurabile definita su  $E$ . Se  $f$  ha valori in  $[0, +\infty]$  allora

$$\int_X f \, d\mu = \int_{E_2} \left( \int_{E_1} f(x_1, x_2) \, dx_1 \right) \, dx_2 = \int_{E_1} \left( \int_{E_2} f(x_1, x_2) \, dx_2 \right) \, dx_1.$$

Vale lo stesso per  $f$  a valori in  $\mathbb{R}$  o in  $\mathbb{R}^n$  sommabile.

**Osservazione 4.** Si hanno le seguenti.

- Se  $X_1, X_2$  sono spazi con misure  $\mu_1, \mu_2$  (con opportune ipotesi) vale:

$$\int_{E_2} \left( \int_{E_1} f(x_1, x_2) \, d\mu_1(x_1) \right) d\mu_2(x_2) = \int_{E_1} \left( \int_{E_2} f(x_1, x_2) \, d\mu_2(x_2) \right) d\mu_1(x_1).$$

se  $f \geq 0$  oppure  $\int_{X_1} \left( \int_{X_2} |f| \, d\mu_2(x_2) \right) d\mu_1(x_1) < +\infty$ .

- Se  $X_1 \subset \mathbb{R}$  (oppure  $X_1 \subset \mathbb{R}^n$ ),  $\mu_1 = \mathcal{L}^n$  e  $X_2 = \mathbb{N}$ ,  $\mu_2$  è la misura che conta i punti, allora la formula sopra diventa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \int_{X_1} f_n(x) \, dx \right) = \int_{X_1} \left( \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) dx.$$

Se  $f_i \geq 0$  oppure  $\sum_i \left( \int_{X_1} |f_i(x)| \, dx \right) < +\infty$ .

- se  $X_1 = X_2 = \mathbb{N}$  e  $\mu_1 = \mu_2$  è la misura che conta i punti la formula sopra diventa

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left( \sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j} \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \left( \sum_{j=0}^{\infty} a_{i,j} \right)$$

se  $a_{i,j} \geq 0$  oppure  $\sum_i \sum_j |a_{i,j}| < +\infty$ .



## Capitolo 2

### Spazi $L^p$ e convoluzione

## Capitolo 3

### Spazi di Hilbert

# Capitolo 4

## Serie di Fourier

## Capitolo 5

### Applicazioni della serie di Fourier

# Capitolo 6

## Trasformata di Fourier

# Capitolo 7

## Funzioni armoniche

## Capitolo 8

### Integrazione di superfici

# 8.1    Indice Analitico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

⚡	Assurdo	⚡	Assurdo
⚡	Assurdo	⚡	Assurdo
⚡	Assurdo	⚡	Assurdo
⚡	Assurdo	⚡	Assurdo