

ТЕМА ЗАНЯТИЯ


Непрерывные и нормальные распределения

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W05**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$ равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$


Общая площадь под $f(x)$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.


ФОРМУЛА 2

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$P(X \leq x) = P(Z \leq (x - \mu) / \sigma)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$


Общая площадь под $f(x)$
равна 1

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения


Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1




ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1

