Poulets locaux et pintades : produire plus

Volaille locale et pintades
Abri, alimentation complémentaire, soins des pintadeaux, couvaison et vaccins Newcastle.

Conduite en semi-liberté

- Abri fermé la nuit : sec, aéré, sol surélevé ou litière sèche, protégé des serpents, chiens et rapaces.
- Perchoirs (20 cm par oiseau) et nids garnis de paille propre.
- Complément le soir : céréales (maïs, mil, sorgho), son, tourteau, termites ; eau propre à volonté.
- Amélioration : un coq de race améliorée pour 8 à 10 poules ; réformer les sujets malades ou peu productifs.

Pintadeaux

Âge	Température	Conseil
Semaine 1	≈ 35 °C	Chaleur continue, pas d'humidité
Semaine 2	≈ 32 °C	Aliment riche en protéines
Semaines 3 à 4	29 à 26 °C	Sortir seulement par temps sec
Après 4 semaines	Température ambiante	Abri la nuit

Couvaison

- Une poule couve 10 à 12 œufs ; éclosion après 21 jours (pintade : 26 à 28 jours).
- Œufs propres, de moins de 7 jours, conservés au frais.
- Nid au calme, à l'abri des poux (cendre ou produit antiparasitaire sous la paille).
- Les œufs de pintade peuvent aussi être couvés par une poule ou une couveuse.

Santé

- Newcastle : vaccin tous les 3 mois pour tous les oiseaux, pintades comprises.
- Variole et autres vaccins selon le vétérinaire.
- Déparasitage interne et externe régulier.
- Isoler les oiseaux malades et appeler le vétérinaire en cas de mortalité anormale.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.