Pondeuses : la croissance et la préparation à la ponte

Pondeuses · Semaines 5 à 17
De 5 à 17 semaines : aliment, poids, lumière, déparasitage et installation des pondoirs.

Alimentation

- Semaines 5 à 10 : aliment croissance poulette.
- Semaines 10 à 16 : aliment croissance ou développement, moins concentré.
- Semaines 16 à 17 : aliment pré-ponte (un peu plus de calcium), puis aliment ponte dès 2 à 5 % de ponte.
- Ne pas donner d'aliment ponte trop tôt : l'excès de calcium abîme les reins.
- Eau propre à volonté ; compter environ 2 fois plus d'eau que d'aliment, plus par forte chaleur.

Poids repères (ISA Brown, valeurs indicatives)

Âge	Poids moyen
6 semaines	≈ 0,45 kg
8 semaines	≈ 0,68 kg
10 semaines	≈ 0,90 kg
12 semaines	≈ 1,08 kg
15 semaines	≈ 1,30 kg
17 semaines	≈ 1,45 kg

Lumière

- Garder une durée de lumière constante (ou légèrement décroissante) jusqu'à 16 à 18 semaines.
- Ne jamais augmenter la durée de lumière pendant la croissance.
- Stimulation : augmenter ensuite de 30 minutes à 1 heure par semaine jusqu'à 16 heures de lumière par jour.

Santé et préparation

- Déparasiter vers 8 à 10 semaines et avant l'entrée en ponte.
- Faire les vaccins de rappel prévus, en particulier avant la ponte.
- Installer les pondoirs vers 16 semaines (1 nid pour 4 à 5 poules), dans un endroit calme et sombre.
- Peser chaque semaine 10 % du lot : au moins 80 % des poulettes à ± 10 % du poids moyen.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.