Élevage de porcs : les bases

Porcs

Bâtiment, alimentation, mise bas, soins des porcelets, sevrage et protection contre la peste porcine africaine.

Repères

Repère	Valeur indicative
Gestation	114 jours
Porcelets nés par portée	8 à 12
Sevrage	5 à 8 semaines
Aliment truie gestante	2 à 2,5 kg par jour
Aliment truie allaitante	4 à 6 kg par jour
Aliment porc à l'engrais	2 à 3 kg par jour
Eau	10 à 20 litres par jour selon le poids

Mise bas et porcelets

- Nettoyer et désinfecter la loge une semaine avant ; laver la truie.
- Coin chauffé (lampe) vers 30 °C pour les porcelets, à l'abri de l'écrasement.
- Colostrum dans les 6 premières heures ; couper et désinfecter le cordon.
- Injection de fer vers le 3e jour ; castration par une personne formée.
- Aliment porcelet dès 10 jours ; sevrage vers 5 à 8 semaines.

Peste porcine africaine : prévenir

- Il n'existe ni vaccin ni traitement : la prévention est la seule protection.
- Ne jamais donner de restes de cuisine ou d'eaux grasses non cuits.
- Porcherie fermée, pas de visiteurs, bottes et habits réservés à la porcherie.
- Nouveaux porcs : 3 semaines à l'écart avant de les mélanger.
- Mortalité soudaine, fièvre, taches rouges sur la peau : isoler et appeler immédiatement le vétérinaire et les services vétérinaires.

Santé courante

- Déparasiter tous les 3 à 4 mois et avant la mise à la reproduction.
- Lutter contre la gale et les poux.
- Noter les saillies, les mises bas et les soins dans l'application.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.