Poulets de chair : réussir une bande en 6 semaines

Poulets de chair · Semaines 0 à 8
Température, aliments démarrage, croissance et finition, densité, poids de vente et vaccins.

Repères (souches Cobb 500, Ross : valeurs indicatives)

Âge	Température	Poids moyen
Jour 7	32 à 33 °C	≈ 0,18 kg
Jour 14	29 à 30 °C	≈ 0,45 kg
Jour 21	26 à 27 °C	≈ 0,90 kg
Jour 28	23 à 25 °C	≈ 1,45 kg
Jour 35	20 à 24 °C	≈ 2,00 kg
Jour 42	20 à 24 °C	≈ 2,60 kg

Alimentation

- Démarrage (jours 0 à 10), croissance (jours 11 à 24), finition (jour 25 à la vente).
- Changer d'aliment progressivement sur 2 à 3 jours.
- Indice de consommation visé : 1,6 à 1,8 kg d'aliment par kg de poids vif.
- Eau propre à volonté : environ 1,8 fois la quantité d'aliment, plus par forte chaleur.

Bâtiment et santé

- Densité : environ 10 poulets par m² en fin de bande (ne pas dépasser 30 kg de poulet par m²).
- Litière sèche ; retirer les plaques humides autour des abreuvoirs.
- Vaccins usuels : Newcastle vers les jours 7 et 21, Gumboro vers les jours 10 à 14 (selon le vétérinaire).
- Respecter les délais d'attente des médicaments avant la vente ; retirer l'aliment 6 à 8 heures avant l'abattage.
- Après la bande : tout sortir, nettoyer, désinfecter, vide sanitaire d'au moins 14 jours.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.