Pondeuses : réussir la ponte

Pondeuses · Semaines 18 à 90
Aliment ponte, eau, 16 heures de lumière, collecte des œufs et réaction aux chutes de ponte.

Repères de production (valeurs indicatives)

Repère	Valeur
Début de ponte	18 à 20 semaines
Pic de ponte	90 à 95 % vers 25 à 30 semaines
Aliment	110 à 120 g par poule et par jour
Eau	environ 250 ml par poule et par jour (plus par forte chaleur)
Lumière	16 heures par jour, stable

Conduite au quotidien

- Distribuer l'aliment ponte en 2 repas ; le soir, un peu plus (la coquille se forme la nuit).
- Coquilles ou calcaire en grains en complément si les coquilles sont fragiles.
- Ramasser les œufs 2 à 3 fois par jour ; les conserver au frais, pointe en bas.
- Garder la litière sèche et les pondoirs propres pour des œufs propres.
- Noter chaque jour la ponte, les morts et l'aliment dans l'application.

Forte chaleur

- Ouvrir et ombrager le bâtiment, arroser la toiture si possible.
- Eau fraîche en grande quantité ; distribuer l'aliment aux heures fraîches.
- Vitamine C et électrolytes dans l'eau pendant les pics de chaleur.

Chute de ponte : que vérifier ?

- Manque d'eau (abreuvoir vide, tuyau bouché) ou changement d'aliment.
- Chaleur excessive, lumière diminuée ou coupée, stress (bruit, prédateurs).
- Signes de maladie : diarrhée, toux, œufs déformés, poules abattues : appeler le vétérinaire.
- Âge du lot : après 70 à 80 semaines, comparer la rentabilité pour décider de la réforme.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.