Vacciner ses volailles correctement

Pondeuses, Volaille locale et pintades · Semaines 0 à 90
Exemple de programme de vaccination des pondeuses et les règles pour qu'un vaccin protège vraiment.

Exemple de programme (pondeuses, à adapter avec le vétérinaire)

Âge	Maladie	Méthode
Jour 1	Marek	Injection au couvoir
Jours 1 à 7	Newcastle + bronchite infectieuse	Eau de boisson ou goutte dans l'œil
Jours 10 à 14	Gumboro	Eau de boisson
Jour 21	Newcastle (rappel)	Eau de boisson
Jours 24 à 28	Gumboro (rappel)	Eau de boisson
Semaine 6	Variole aviaire	Piqûre dans l'aile (transfixion)
Semaine 8	Newcastle + bronchite (rappel)	Eau de boisson
Semaines 16 à 18	Newcastle + bronchite + syndrome chute de ponte	Injection (vaccin inactivé)
Pendant la ponte	Newcastle (rappel)	Tous les 2 à 3 mois

Conserver et préparer

- Conserver entre 2 et 8 °C ; ne jamais congeler ; transporter en glacière, à l'abri du soleil.
- Utiliser une eau sans chlore (eau de puits propre ou eau du robinet reposée 24 heures).
- Ajouter 2 g de lait écrémé en poudre par litre d'eau, 15 minutes avant le vaccin.
- Assoiffer les oiseaux 1 à 2 heures (moins par forte chaleur) ; quantité d'eau prévue pour être bue en moins de 2 heures.
- Ne pas mettre d'antiseptique, de chlore ou de médicament dans l'eau le jour du vaccin.

Après le vaccin

- Noter dans l'application : date, vaccin, produit, numéro de lot du flacon.
- Brûler ou enterrer les flacons vides.
- Surveiller le lot les jours suivants ; signaler toute réaction anormale au vétérinaire.
- Avec la version Pro : faire valider les vaccins par votre vétérinaire (carnet sanitaire validé).

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.