Coccidiose des volailles : reconnaître et prévenir

Pondeuses, Poulets de chair, Volaille locale et pintades · Semaines 2 à 12
Comprendre la coccidiose, repérer les premiers signes, réagir vite et la prévenir avec une litière sèche.

Comprendre la coccidiose

- Maladie de l'intestin due à un parasite microscopique, présent dans les fientes.
- Le parasite se multiplie dans la litière humide et chaude ; les oiseaux l'avalent en picorant.
- Âge le plus à risque : 3 à 6 semaines, mais toute volaille au sol peut être touchée.
- Facteurs favorisants : pluie, fuites d'abreuvoirs, bâtiment trop chargé, mauvaise aération.

Signes à surveiller

Ce que l'on voit	Ce que cela peut indiquer
Fientes avec du sang	Coccidiose probable : appeler le vétérinaire
Diarrhée, fientes mousseuses	Atteinte de l'intestin
Plumes ébouriffées, ailes tombantes	Oiseau malade, à isoler et observer
Baisse d'appétit et d'eau bue	Début de maladie dans la bande
Retard de croissance, lot hétérogène	Forme discrète de la maladie
Hausse des morts	Urgence : vétérinaire le jour même

Que faire en cas de maladie

- Appeler le vétérinaire le jour même ; lui montrer des fientes ou des oiseaux morts.
- Traiter toute la bande selon sa prescription (souvent dans l'eau) : respecter dose et durée.
- Retirer la litière mouillée, la remplacer par une litière sèche ; réparer les fuites.
- Noter le traitement et le délai d'attente dans l'application ; ne pas vendre œufs ou viande pendant ce délai.

Prévention au quotidien

- Litière sèche et épaisse ; retourner ou changer les plaques humides chaque jour.
- Abreuvoirs réglés à bonne hauteur, sans fuite ; bâtiment bien aéré.
- Densité raisonnable ; aliment de qualité et eau propre.
- Nettoyage, désinfection et vide sanitaire entre deux bandes.
- Programme de prévention à définir avec le vétérinaire.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.