Moutons et chèvres : santé et alimentation

Moutons et chèvres, Chèvres laitières
Vaccin PPR, pasteurellose, déparasitage, alimentation, reproduction et embouche pour la Tabaski.

Calendrier sanitaire (à adapter avec le vétérinaire)

Période	Soin
Une fois (rappel selon le vaccin)	Vaccin PPR (peste des petits ruminants)
Chaque année, avant les pluies	Vaccin pasteurellose
Début de saison des pluies	Déparasitage interne + traitement contre les tiques
Fin de saison des pluies	Déparasitage interne
Entrée en embouche	Déparasitage + vaccins à jour

Alimentation

- Pâturage et fourrage à volonté ; stocker foin, fanes d'arachide et de niébé pour la saison sèche.
- Complément en saison sèche et pour l'embouche : son, tourteau de coton, graines de coton, maïs.
- Pierre à lécher (minéraux et sel) en permanence ; eau propre chaque jour.
- Embouche : fourrage à volonté + 300 à 500 g de concentré par jour, augmenté progressivement.

Reproduction

- Gestation : environ 150 jours (5 mois).
- Mise au mâle vers 8 à 12 mois, selon le poids ; 1 mâle pour 25 à 30 femelles.
- Séparer les femelles proches de la mise bas ; vérifier que le petit tète dans les premières heures.
- Noter les naissances, les ventes et les soins dans l'application.

Signes d'alerte

- Fièvre, écoulements du nez et des yeux, diarrhée, plaies dans la bouche : suspicion de PPR, appeler le vétérinaire.
- Muqueuses pâles (intérieur de la paupière) : parasites, déparasiter.
- Toux et respiration difficile : pasteurellose possible.

La vidéo de cette formation est dans l'application B2A Smart Farming, onglet Formation de vos lots. Notez vos soins, vaccins et mesures dans l'application ; en cas de doute, appelez votre vétérinaire.