

# Datenstrukturen und Algorithmen: Hausübung 1

Felix Schrader, Jens Duffert, Eduard Sauter

October 16, 2015

## Aufgabe 1.2

- a) Das folgende Programm berechnet die Quadratwurzel einer positiven Zahl  $x$  nach dem Divide-and-Conquer Paradigma.

```
1 function SqrtBisect(x, eps){
2     return SqrtBisectRecurse(x, 0, x + 1, eps * eps);
3 }
4
5 function SqrtBisectRecurse(x, a, b, eps){
6     guess = (b+a)/2;
7     square = guess*guess;
8     if (abs(x - square) < eps)
9         return guess;
10    else if (square < x)
11        return SqrtBisectRecurse(x, guess, b, eps);
12    else
13        return SqrtBisectRecurse(x, a, guess, eps);
14 }
```

Um die Korrektheit zu zeigen, wird vorausgesetzt ,dass

$$a < b \iff a^2 < b^2 \quad \forall a, b \geq 0 \quad (1)$$

gilt.

SqrtBisect sucht  $\sqrt{x}$  im Intervall  $[0, x + 1]$ . Die Quadratwurzel muss in diesem Bereich liegen, da  $a * a > a \quad \forall a \geq 1$  und  $a * a \leq 1 \quad \forall 0 \leq a \leq 1$ . Zu Beginn eines Funktionsaufrufes sei also sichergestellt, dass  $\sqrt{x} \in [a, b]$ . Aufgrund der oberen Gleichung und Zeilen 10-13 bleibt dies gewährleistet. Die Abbruchbedingung muss somit erreicht werden, da das Suchintervall nach jedem Schritt halbiert wird. An dieser Stelle ist

$$|x - \text{guess}^2| < \epsilon^2 \quad (2)$$

Es bleibt noch zu zeigen, dass daraus folgt  $|\sqrt{x} - \text{guess}| < \epsilon$ .

Dies folgt direkt aus

$$|x - a|^2 \leq |x^2 - a^2|$$

*Beweis*

(a) Fall ( $x \geq a$ )

$$|x - a|^2 = x^2 + a^2 - 2ax \leq x^2 + a^2 - 2a^2 = x^2 - a^2 = |x^2 - a^2|$$

(b) Fall ( $x < a$ )

$$|x - a|^2 = x^2 + a^2 - 2ax \leq x^2 + a^2 - 2x^2 = a^2 - x^2 = |x^2 - a^2|$$

Damit ist  $|\text{SqrtBisect}(x) - \sqrt{x}| < \varepsilon$ .

- b) Im schlimmsten Fall erreicht  $b - a$  den Wert von  $\varepsilon^2$ . Dies geschieht, falls gleich zu begin  $a = \sqrt{x} = 0$ . Da nach jedem Schritt  $b - a \rightarrow (b - a)/2$  ist nach dem  $n$ -ten Schritt für den Startwert von  $b - a = x + 1$  der Wert  $\frac{x+1}{2^n}$ . Man erhält als Lösung:

$$\frac{x+1}{2^n} = \varepsilon \implies n = \lg \frac{x+1}{\varepsilon}$$