

# 2-as lab. darbas

## 9-as variantas

AŽUOLAS MAJAUSKAS

December 22, 2025

**Problema 1.** Ar duotieji trys vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi?

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -3-i \\ -5-i \\ -4-2i \\ 2-3i \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3-3i \\ -5-5i \\ 3-4i \\ 4+i \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -3-3i \\ -3+4i \\ -4-5i \\ 3+3i \end{pmatrix}.$$

*Sprendimas.* Vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_k$  yra tiesiškai priklausomi jei egzistuoja realūs (šiuo atveju kompleksiniai) skaičiai  $c_1, c_2, \dots, c_k$ , kurie nėra visi nuliai, tokie kad:

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_k \vec{v}_k = \vec{0}$$

Taigi, turime lygčių sistemą:

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3 = \vec{0} \iff \begin{cases} (-3-i)c_1 + (3-3i)c_2 + (-3-3i)c_3 = 0, \\ (-5-i)c_1 + (-5-5i)c_2 + (-3+4i)c_3 = 0, \\ (-4-2i)c_1 + (3-4i)c_2 + (-4-5i)c_3 = 0, \\ (2-3i)c_1 + (4+i)c_2 + (3+3i)c_3 = 0. \end{cases}$$

Lygčių sistemą paverčiam į Gauso eliminacijos matricą:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} -3-i & 3-3i & -3-3i & 0 \\ -5-i & -5-5i & -3+4i & 0 \\ -4-2i & 3-4i & -4-5i & 0 \\ 2-3i & 4+i & 3+3i & 0 \end{array} \right]$$

Pirmiausia panaikiname  $c_1$  koeficientus 2-oje, 3-ioje ir 4-oje eilutėse, iš  $i$ -tosios  $i \in \{2, 3, 4\}$  eilutės atėmę 1-ą eilutę padaugintą iš  $m_i$ , kur:

$$m_2 = \frac{-5-i}{-3-i} = \frac{8-i}{5}, \quad m_3 = \frac{-4-2i}{-3-i} = \frac{7+i}{5}, \quad m_4 = \frac{2-3i}{-3-i} = \frac{-3+11i}{10}.$$

Gauname:

$$\sim \left[ \begin{array}{ccc|c} -3-i & 3-3i & -3-3i & 0 \\ 0 & -\frac{46}{5} + \frac{2}{5}i & \frac{12}{5} + \frac{41}{5}i & 0 \\ 0 & -\frac{9}{5} - \frac{2}{5}i & -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i & 0 \\ 0 & \frac{8}{5} - \frac{16}{5}i & -\frac{6}{5} + \frac{27}{5}i & 0 \end{array} \right].$$

Toliau taip pat panaikiname  $c_2$  koeficientus 3-ioje ir 4-oje eilutėse:

$$n_3 = \frac{-\frac{9}{5} - \frac{2}{5}i}{-\frac{46}{5} + \frac{2}{5}i} = \frac{41 + 11i}{212}, \quad n_4 = \frac{\frac{8}{5} - \frac{16}{5}i}{-\frac{46}{5} + \frac{2}{5}i} = \frac{-10 + 18i}{53}.$$

Gaunam:

$$\sim \left[ \begin{array}{ccc|c} -3-i & 3-3i & -3-3i & 0 \\ 0 & -\frac{46}{5} + \frac{2}{5}i & \frac{12}{5} + \frac{41}{5}i & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{93}{212} - \frac{405}{212}i & 0 \\ 0 & 0 & \frac{108}{53} + \frac{325}{53}i & 0 \end{array} \right].$$

Matosi, kad vienintelis sistemos sprendinys yra  $(c_1, c_2, c_3) = (0, 0, 0)$ , todėl vektoriai  $v_1, v_2, v_3$  yra tiesiškai nepriklausomi.  $\square$

**Problema 2.** Raskite  $B^2 + 3A^\dagger C^{-2} + (A^{-1})^\dagger$ , jeigu:

$$A = \begin{pmatrix} 4+i & 3-6i \\ 4+i & -9+6i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2+i & -6-4i \\ -4-2i & 3+i \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1+4i & -1-6i \\ -8+4i & 5-4i \end{pmatrix}.$$

*Sprendimas.* 1) **Apskaičiuojame  $B^2$ .**

$$B^2 = BB, \text{ todėl:}$$

$$(B^2)_{11} = (-2+i)^2 + (-6-4i)(-4-2i) = (3-4i) + (16+28i) = 19+24i,$$

$$(B^2)_{12} = (-2+i)(-6-4i) + (-6-4i)(3+i) = (16+2i) + (-14-18i) = 2-16i,$$

$$(B^2)_{21} = (-4-2i)(-2+i) + (3+i)(-4-2i) = (10+0i) + (-10i) = -10i,$$

$$(B^2)_{22} = (-4-2i)(-6-4i) + (3+i)^2 = (16+28i) + (8+6i) = 24+34i.$$

Taigi

$$B^2 = \begin{pmatrix} 19+24i & 2-16i \\ -10i & 24+34i \end{pmatrix}.$$

2) **Apskaičiuojame  $A^\dagger$ .**

Transponuojam matricą ir pakeičiam visus elementus jungtiniais:

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 4-i & 4-i \\ 3+6i & -9-6i \end{pmatrix}.$$

3) **Apskaičiuojame  $C^{-1}$  ir  $C^{-2}$ .**

Tikrinam ar atvirkštinė gali egzistuoti:

$$\det(C) = (-1+4i)(5-4i) - (-1-6i)(-8+4i) = (11+24i) - (32+44i) = -21-20i \neq 0.$$

Panaudosim formulę  $2 \times 2$  matricos atvirkštinei rasti:

$$C^{-1} = \frac{1}{\det(C)} \begin{pmatrix} 5-4i & 1+6i \\ 8-4i & -1+4i \end{pmatrix}.$$

”Racionalizuojam” trupmenos apačią:

$$\frac{1}{-21 - 20i} = \frac{-21 + 20i}{(-21)^2 + 20^2} = \frac{-21 + 20i}{841}.$$

Todėl atvirkštinė yra:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-25 + 184i}{841} & \frac{-141 - 106i}{841} \\ \frac{-88 + 244i}{841} & \frac{-59 - 104i}{841} \end{pmatrix}.$$

Jau labai nusibodo skaičiuot ranka, panaudojau (<https://matrix.reshish.com/matrix-multiplication/>).

$$C^{-2} = (C^{-1})^2 = \begin{pmatrix} \frac{5041 - 34276i}{707281} & \frac{20324 - 2376i}{707281} \\ \frac{-12128 - 27536i}{707281} & \frac{30937 - 12804i}{707281} \end{pmatrix},$$

#### 4) Apskaičiuojame $(A^{-1})^\dagger$ .

$$\det(A) = (4 + i)(-9 + 6i) - (3 - 6i)(4 + i) = (-42 + 15i) - (18 - 21i) = -60 + 36i \neq 0.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} -9 + 6i & -(3 - 6i) \\ -(4 + i) & 4 + i \end{pmatrix} = \frac{1}{-60 + 36i} \begin{pmatrix} -9 + 6i & -3 + 6i \\ -4 - i & 4 + i \end{pmatrix}.$$

Kadangi

$$\frac{1}{-60 + 36i} = \frac{-60 - 36i}{60^2 + 36^2} = \frac{-5 - 3i}{408},$$

gaunam:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{21 - i}{136} & \frac{11 - 7i}{136} \\ \frac{1 + i}{24} & -\frac{1 + i}{24} \end{pmatrix}.$$

Tada

$$(A^{-1})^\dagger = \begin{pmatrix} \frac{21 + i}{136} & \frac{1 - i}{24} \\ \frac{11 + 7i}{136} & -\frac{1 - i}{24} \end{pmatrix}.$$

#### 5) Apskaičiuojame $3A^\dagger C^{-2}$ .

Vėl naudojam (<https://matrix.reshish.com/matrix-multiplication/>).

$$3A^\dagger C^{-2} = \begin{pmatrix} \frac{-270480 - 720483i}{707281} & \frac{569592 - 335943i}{707281} \\ \frac{494145 + 744030i}{707281} & \frac{-840087 + 133290i}{707281} \end{pmatrix}.$$

#### 6) Sudedam viską į vieną.

Nežinau ar čia teisingai, bet atrodo labai keistai :D

$$B^2 + 3A^\dagger C^{-2} + (A^{-1})^\dagger = \begin{pmatrix} \frac{1805681725+2211286777i}{96190216} & \frac{48326977-280365817i}{16974744} \\ \frac{74983811-855763113i}{96190216} & \frac{386524487+581047537i}{16974744} \end{pmatrix}.$$

□