

[Solusi] Geometry Everyday Project

AZZAM LABIB HAKIM |INSTAGRAM: @HAXUV_WORLD |THREADS: @AZZAM_29_12

August 21, 2025

Daftar Isi

1	Solusi	3
1.1	Korea MO 2022, Problem 1	3
1.2	Japan MO 2022, Problem 3	4
1.3	IMO 2014, Problem 4	6
1.4	USA January TST for IMO 2016, Problem 3	7
1.5	Singapore MO Open 2022	9
1.6	Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1	10
1.7	USAMO 2015, Problem 2	12
1.8	All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3	14
1.9	All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2	16
1.10	CGMO 2022, Problem 3	17
1.11	IMSO 2021	19
1.12	Philippine MO 2022, Problem 6	20
1.13	Finnish National High School Competition 2019, Problem 3	21
1.14	Finnish National High School Competition 2001, Problem 1	22
1.15	Iberoamerican 2022, Problem 5	23
1.16	Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono	24
1.17	USAJMO 2023, Problem 2	25
1.18	Korea 2023, Problem 1	27
1.19	IMO 2023, Problem 2	28
1.20	Japan 2023, Problem 2	31
1.21	Random Problem 2	32

1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16	33
1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat	34
1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17	35
1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta	37
1.26 IMO 2024, Problem 4	39
1.27 Random Problem 3	43
1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai	44
1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama	46
1.30 Random Problem 4	47
1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024	50
1.32 Japan MO 2025, Problem 2	51
1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5	52
1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1	53
1.35 JBMO 2018, Problem 4	54
1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1	56

§1 Solusi

§1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Solal. Let ABC be an acute triangle with circumcenter O , and let D , E , and F be the feet of altitudes from A , B , and C to sides BC , CA , and AB , respectively. Denote by P the intersection of the tangents to the circumcircle of ABC at B and C . The line through P perpendicular to EF meets AD at Q , and let R be the foot of the perpendicular from A to EF . Prove that DR and OQ are parallel.

Solusi. (Sunday, 9 October 2022) . Misalkan M adalah titik tengah BC . Misalkan pula H adalah titik tinggi $\triangle ABC$.

Lemma 1.1

$\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan O, R, A segaris

Proof. Karena $\angle AER = \angle AEF = \angle CEF = \angle CBF = \angle DBA$ dan $\angle ARE = \angle BDA = 90^\circ$, maka $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ sehingga $\angle RAE = \angle BAD$. Namun, karena *well-known* bahwa $\angle CAO = 90^\circ - \angle B = \angle DAB$, maka kita punya $\angle RAE = \angle OAC$ yang menyebabkan O, R, A segaris $\square$

Lemma 1.2


$OAQP$ jajargenjang

Proof. Jelas bahwa O, M, P segaris dan $OP \perp BC$. Tetapi, karena $AQ \perp BC$ juga, maka $OP \parallel AQ$. Lalu, karena O, R, A segaris, maka $OA \perp FE$. Namun, karena $QP \perp FE$ juga, maka $OA \parallel QP$. Dari sini didapatkan bahwa $OAQP$ jajargenjang. $\square$

Dikarenakan $OAQP$ jajargenjang, maka $OP = OB$. Lalu, $OB = OA$ yang merupakan jari-jari lingkaran luar (ABC). Selanjutnya, karena $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan karena jelas bahwa $\triangle OBM \sim \triangle OPB$, maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos \angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena $\angle RAD = \angle OAQ$ juga, maka ditemukan bahwa $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$. Ini berarti $\angle RDA = \angle OQA \implies DR \parallel OQ$. Terbukti.




□

§1.2 Japan MO 2022, Problem 3

Sol. In an isosceles triangle ABC , $AB = AC$. Take a point O inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle ω with center O and passing through C . Suppose $\omega \cap BC = \{C, D\}$, $\omega \cap AC = \{C, E\}$. Denote the circumcircle of $\triangle AEO$ as Γ . And suppose $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$. Prove that the circumcenter of $\triangle BDF$ is on Γ .

Solusi. (Monday, 10 October 2022) . Misalkan K adalah perpotongan kedua antara ED dengan Γ . Akan dibuktikan bahwa K adalah pusat dari lingkaran luar segitiga BDF .

Thanks EulersTurban for the asymptote picture :)



Perhatikan bahwa $OF = OD = OE = OC$ yang merupakan jari-jari lingkaran ω . Karena A, E, O, F di lingkaran Γ dan $OE = OC$ maka $\angle ACO = \angle OEC = \angle OEA = \angle OFA$. Lalu, karena $OC = OF$ maka $\angle OCF = \angle CFO$. Hal ini menyebabkan $\angle ACF = \angle ACO + \angle OCF = \angle OFA + \angle CFO = \angle CFA$ sehingga didapat $AC = AF$ atau lebih jauh $AB = AC = AF$. Fakta ini juga otomatis menyebabkan $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \angle OAC = \angle FAO$.

Sekarang, perhatikan karena O pusat ω , maka $\angle DOF = 2\angle DEF$. Karena E, A, F, K berada di satu lingkaran Γ , maka $\angle DEF = \angle KEF = \angle KAF = \angle KOF$. Ini berarti $\angle DOF = 2\angle KOF \implies \angle DOK = \angle KOF$. Namun, kita tahu bahwa $DO = OF$, maka didapatkan bahwa $KO \perp DF$ sehingga didapatkan $DOFK$ adalah belah ketupat dengan $DK = DF$ dan $\angle FKO = \angle OKD$.


Karena $AC = AB = AF$, maka A adalah pusat lingkaran luar segitiga BFC , sehingga kita punya $\angle BAC = 2\angle BFC$ dan $\angle BAF = 2\angle BCF$. Tapi karena D, E, F, C berada di lingkaran ω , maka $\angle BCF = \angle DCF = \angle DEF = \angle KOF$. Dari sini karena K, A, E, F berada di lingkaran Γ juga, akan didapat $\angle BAF = 2\angle KOF = 2\angle KAF$ yang menyebabkan $\angle BAK = \angle KAF$. Namun, karena $AB = AF$, maka $BAFK$ adalah belah ketupat dengan $BK = KF$. Dari sini kita mendapat $BK = KF = KD$, yang berarti K haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga BDF . Terbukti.

□

§1.3 IMO 2014, Problem 4

Soal. Let P and Q be on segment BC of an acute triangle ABC such that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Let M and N be the points on AP and AQ , respectively, such that P is the midpoint of AM and Q is the midpoint of AN . Prove that the intersection of BM and CN is on the circumference of triangle ABC .

Solusi. (Tuesday, 11 October 2022) . Misalkan T adalah perpotongan BM dengan lingkaran luar (ABC) .



Karena $\angle BAP = \angle ACQ$ dan $\angle QAC = \angle PBA$ maka $\triangle AQC \sim \triangle BPA$. Dari sini didapat $\angle APQ = \angle PQA$ yang mengakibatkan $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$. Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya $\angle MTC = \angle BTC = \angle BAC = \angle BCA + \angle ABC = \angle PAB + \angle ABC = \angle APB = \angle MPC$ sehingga didapat M, T, P, C konsiklis. Oleh karena itu, kita punya $\angle BMP = \angle TMP = \angle TCP = \angle TCB$. Namun, karena $\angle TBC = \angle MBP$, maka didapat $\triangle TBC \sim \triangle PBM$ sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan T' adalah perpotongan CN dengan lingkaran luar (ABC) , akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa $C \neq T \neq B$ dan $C \neq T' \neq B$. Berarti haruslah $T = T'$. Ini menandakan T adalah perpotongan antara CN dan BM yang terletak di lingkaran (ABC') . Terbukti.

□


§1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Soal. Let ABC be an acute scalene triangle and let P be a point in its interior. Let A_1, B_1, C_1 be projections of P onto triangle sides BC, CA, AB , respectively. Find the locus of points P such that AA_1, BB_1, CC_1 are concurrent and $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$.

Solusi. (Thursday, 13 October 2022). Klaim bahwa $P \in \{I, O, H\}$ dimana I, O, H berturut-turut adalah titik bagi $\triangle ABC$, titik pusat (ABC) , dan titik tinggi $\triangle ABC$. Mudah dibuktikan bahwa $P \in \{I, O, H\}$ memenuhi. Jika $P = I$ maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ$. Jika $P = O$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) + (90^\circ - \angle B) = 90^\circ$ serta A_1, B_1, C_1 masing-masing merupakan titik tengah BC, CA, AB . Jika $P = H$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle B) + (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) = 90^\circ$ serta A, P, A_1 segaris, B, P, B_1 segaris, dan C, P, C_1 segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa $P \notin \{O, H\}$. Akan dibuktikan bahwa haruslah $P = I$. Dari asumsi, jelas bahwa P tidak berada di AA_1, BB_1, CC_1 serta A_1 bukan merupakan titik tengah BC sehingga menurut Ceva, B_1C_1 tidak sejajar dengan BC .

Thanks TheUltimate123 for the asymptote and slice of hint from your solution!



Misalkan $T = B_1C_1 \cap BC$, $R = CP \cap B_1C_1$, $Q = BP \cap B_1C_1$, dan $H = BR \cap CQ$.

Lemma 1.3

$$(B, C; T, A_1) = -1$$

Bukti. Perhatikan dengan Ceva pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada $\triangle ABC$ dan transversal B_1C_1 kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau $(B, C; T, A_1) = -1$. Terbukti. □

dari lemma tersebut, jika dimisalkan $A'_1 = HP \cap BC$, karena HA'_1, CR, BQ konkuren di P , maka $BCQR$ adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya $(B, C; T, A'_1) = -1$. Namun, karena $(B, C; T, A_1) = -1$, maka $A_1 = A'_1$. Ini berarti H, P, A_1 segaris.

Lemma 1.4

$BRQC$ siklis.

Solusi. Pertama perhatikan, karena $PA_1 \perp BC$, $PB_1 \perp AC$, $PC_1 \perp AB$ maka jelas bahwa AB_1PC_1 , PC_1BA_1 dan A_1CB_1P siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \angle QBC &= \angle PBC = 90^\circ - \angle PAB - \angle PCA \\ &= 90^\circ - \angle PAC_1 - \angle PCB_1 \\ &= 90^\circ + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle PB_1C + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle QRC. \end{aligned}$$

Terbukti $BRQC$ siklis. □

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa $BCQR$ adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika M pusat lingkaran $(BCQR)$, maka M merupakan titik tinggi dari $\triangle TPH$.

Tetapi, karena H, P, A_1 segaris dan $PA_1 \perp BC$, maka $HP \perp TB$ sehingga TB merupakan garis tinggi $\triangle THB$ yang memaksa M harus berada di BC . Ini berarti BC adalah diameter ($BCQR$) dengan M titik tengah BC sehingga $\angle BRC = \angle BQC = 90^\circ$. Hal ini mengakibatkan P adalah titik tinggi $\triangle HBC$.

Di lain sisi, karena $\angle BC_1P = \angle BRP = \angle BA_1P = 90^\circ$ maka B, C_1, R, P, A_1 konsiklis sehingga akan didapat

$$\angle PBA = \angle PBC_1 = \angle PRC_1 = \angle CRQ = \angle CBQ = \angle CBP.$$

Dengan cara serupa akan didapat $\angle ACP = \angle PCB$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa P adalah titik bagi $\triangle ABC$ atau $P = I$. Terbukti.

□


§1.5 Singapore MO Open 2022

Solal. For $\triangle ABC$ and its circumcircle ω , draw the tangents at B, C to ω meeting at D . Let the line AD meet the circle with center D and radius DB at E inside $\triangle ABC$. Let F be the point on the extension of EB and G be the point on the segment EC such that $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$. Prove that the tangent at A to the circumcircle of $\triangle AFG$ is parallel to BC .

Solusi. (Sunday, 16 October 2022) Misalkan $M = CE \cap AF$ dan $N = BE \cap AG$.

Perhatikan bahwa $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$. Sehingga didapat $\angle BEC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ + \frac{1}{2}(2\angle DBC) = 90^\circ + \angle DBC = 90^\circ + \angle BAC$ yang menyebabkan $\angle GNF = 180^\circ - \angle GEN - \angle AGE = \angle BEC - \angle BAC = 90^\circ$. Dengan cara serupa didapat $\angle GMF = 90^\circ$. Oleh karena itu, G, N, M, F konsiklis.

Selanjutnya, karena $\angle EMA = 90^\circ$ maka $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$. Padahal, karena D pusat lingkaran (BEC) maka $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$. Ini berarti $\angle MNB = \angle NBC$. Didapatkan bahwa $MN \parallel BC$. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung (AFG) di A sejajar dengan MN .



Sekarang, jika dimisalkan l adalah garis singgung lingkaran (AGF) di A . Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta M, N, G, F konsiklis, $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$ yang menunjukkan $l \parallel MN$. Terbukti.


□

§1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

Soal. Incircle of the triangle $\triangle ABC$ is tangent to sides BC, AC, AB at points D, E, F respectively. Let I be the incentre of triangle and K be the intersection point of AI, BC . Circumcircle w of the triangle $\triangle IDK$ intersects IB and IC at points P and Q . Prove that lines EF, PQ and the tangent to w from D are concurrent.

Solusi. (Thursday, 20 October 2022) WLOG $AB < AC$. Misalkan T adalah perpotongan kedua dari lingkaran (FPD) dan (EQD) . Karena BP dan CQ masing-masing adalah garis bagi sudut B dan C , maka $FP = PD$ dan $EQ = QD$. Lalu, karena $\angle FPD = \angle FTD = \angle ETD = \angle EQD$ maka $\triangle EQD$ dan $\triangle FPD$ sebangun. Lebih jauh, D adalah pusat dari spiral similarity yang membawa $\triangle EQD$ ke $\triangle FPD$ sehingga dari well-known property, T adalah perpotongan dari EF dan QP . Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa TD adalah garis singgung lingkaran w di D .


Bukti. Perhatikan bahwa karena $\angle IKB = 180^\circ - \angle BAK - \angle KBA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B$ maka didapat $\angle PIK = 180^\circ - \angle KBI - \angle IKB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle B - (180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B) = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$. Padahal, karena $\angle KDI = 90^\circ$ didapat IK adalah diameter ω sehingga $\angle KPI = 90^\circ$ yang menyebabkan $\angle IQP = \angle IKP = 90^\circ - \angle PIK = \frac{1}{2}\angle C = \angle ICB$ yang mengakibatkan $PQ \parallel BC$. Terbukti. $\square$



Di lain sisi, karena $FP = PD$ dan $FB = BD$ maka BP melewati titik pusat lingkaran (FPD). Lalu, karena IK diameter ω , maka $PK \perp BP$. Padahal kita juga punya $FD \perp BP$. Ini berarti $PK \parallel FD$ dan secara khusus PK menyinggung lingkaran (FPD) di P . Oleh karena itu, kita punya $\angle PKD = \angle FDB$.


Dari fakta-fakta tersebut, akan didapatkan $\angle PQD = \angle PKD = \angle FDB = \angle PDT$, yang membuktikan bahwa TD menyinggung ω di D , seperti yang ingin dibuktikan.

Solusi 1. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan L pada ST dan Y pada AT sehingga $AL \perp ST$ dan $SY \perp AT$. Sadari bahwa X, Y, M, L konsiklis dan membentuk nine point circle dari $\triangle AST$ sebut sebagai lingkaran Γ_1 . Lalu, karena $SY \perp AT$ dan $TX \perp AS$ maka X, Y, T, S konsiklis, misalkan membentuk lingkaran Γ_2 . Terakhir, misalkan H adalah titik tinggi $\triangle AST$.


$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

12

Solusi 2. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan C adalah titik tengah AS . Karena X kaki tinggi dari T ke AS , M titik tengah ST dan C adalah titik tengah AS , maka (XCM) adalah nine point circle dari $\triangle AST$ dengan N adalah pusat lingkarannya dan G adalah titik berat $\triangle AST$.



Perhatikan kuasa titik A terhadap lingkaran (XCM). Karena AO adalah jari-jari (AST), maka panjang jari-jari (XCM) adalah $\frac{1}{2}AO$ sehingga didapat

$$\begin{aligned}\text{Pow}_{(XCM)}(A) &= NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2 \\ &\implies NA^2 = \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2\end{aligned}$$

Karena AP dan AO tidak bergantung pada X , maka AN juga tak bergantung pada X . Oleh karena itu dapat dimisalkan sebuah lingkaran ω_1 berpusat di A dan berjari-jari AN .

Jelas bahwa N, G, O segaris dan berada pada Euler line dengan $OG : GN = 2 : 1$. Misalkan K sebagai titik tengah AO dan J pada segmen AO sehingga $AJ = \frac{1}{3}AO$.

Maka didapat $OG : GN = OJ : JA$ sehingga $\triangle ONA \sim \triangle OGJ$. Berarti terdapat homothety berpusat di O dengan skala $\frac{2}{3}$ yang mengirim $A \rightarrow J$, $N \rightarrow G$, dan $\omega_1 \rightarrow \omega_2$ dimana ω_2 adalah

lingkaran berpusat di J dan berjari-jari JG . Karena AN tidak bergantung pada X dan $JG = \frac{2}{3}AN$, maka KM juga tidak bergantung pada X .

Selanjutnya, karena $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$ maka $\triangle AJG \sim \triangle AKM$. Berarti terdapat homothety berpusat di A dengan skala $\frac{3}{2}$ yang mengirim $J \rightarrow K$, $G \rightarrow M$, dan $\omega_2 \rightarrow \omega_3$ dimana ω_3 adalah lingkaran berpusat di K dan berjari-jari KM . Tetapi, karena JG tidak bergantung pada X dan $KM = \frac{3}{2}JG$, maka KM juga tidak bergantung pada X . Oleh karena itu M terletak di lingkaran ω_3 yang tidak bergantung dengan X . Terbukti. $\square$

§1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3

Soal. An acute-angled triangle ABC is fixed on a plane with largest side BC . Let PQ be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point P lies on the smaller arc AB , and the point Q is on the smaller arc AC . Points X, Y, Z are feet of perpendiculars dropped from point P to the line AB , from point Q to the line AC and from point A to line PQ . Prove that the center of the circumscribed circle of triangle XYZ lies on a fixed circle.

Terjemahan: Diberikan sebuah segitiga lancip ABC yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah BC . Misalkan PQ adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga ABC , dengan titik P berada di busur AB yang lebih kecil dan titik Q berada di busur AC yang lebih kecil. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah kaki tinggi titik P ke garis AB , titik Q ke garis AC , dan titik A ke garis PQ . Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga XYZ berada pada sebuah lingkaran tetap.

Solusi. (Thursday, 27 October 2022) Misalkan l_1 dan l_2 berturut-turut adalah garis sumbu XZ dan ZY . Misalkan $l_1 \cap AB = M$, $l_1 \cap XZ = K$, $l_2 \cap ZY = L$ dan $l_2 \cap AC = N$. Terakhir definisikan O_1, O_P, O_Q berturut-turut sebagai pusat lingkaran (XYZ) , (PXA) , (QYA) . Jelas O_1 merupakan perpotongan l_1 dan l_2 , l_1 melewati O_P dan l_2 melewati O_Q .

$$\angle O_Q N A = \angle L N Y = 90^\circ - \angle N Y L = 90^\circ - \angle A Y Z = 90^\circ - \angle A Q Z = 90^\circ - \angle A Q P = \angle Q P A = \angle Q C A$$

yang menyebabkan $O_Q N \parallel QC$. Dengan cara yang sama diperoleh juga $O_P M \parallel PB$. Karena O_Q dan O_P masing-masing merupakan titik tengah AQ dan AP , maka M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC . Hal ini menyebabkan l_1 dan l_2 berturut-turut pasti melewati titik tengah AB dan AC untuk seluruh kemungkinan letak P, Q . Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar $\angle MO_1 N$ yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati M, N, O_1 tetap.

Perhatikan karena $\angle ZXO_1 = \angle ZLO_1 = 90^\circ$ maka $XZLO_1$ siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
 \angle MO_1N &= \angle KO_1L \\
 &= \angle KZL \\
 &= \angle XZA + \angle AZY \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZXA) + (\angle ZAY + \angle AYZ) \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZAY) + (\angle ZXA + \angle AYZ) \\
 &= \angle BAC + (\angle ZPA + \angle AQZ) \\
 &= \angle BAC + 90^\circ
 \end{aligned}$$


Karena $\angle BAC$ tetap, maka $\angle MO_1N$ tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

§1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

Soal. Given triangle ABC with incenter I and A -excenter J . Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I . Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I . Let O_bO_c and IJ intersect at point K . Find the ratio IK/KJ .

Solusi. (Friday, 28 October 2022) Misalkan M_b , M_c , dan M berturut-turut adalah titik tengah IB , IC , dan IJ . Dari lemma terkenal, M adalah titik pusat lingkaran $(BICJ)$ dan M berada di lingkaran (ABC) . Oleh karena itu, M_bM dan M_cM adalah garis sumbu lingkaran (BIC) . Di lain sisi, kita juga punya O_bM_b dan O_cM_c berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran ω_b dan ω_c . Hal ini menyebabkan M, O_b, M_b segaris dan M, O_c, M_c segaris. Namun, sadari bahwa $MO_b \perp BI$ dan $O_cI \perp BI$ (karena I merupakan titik singgung ω_c) yang menyebabkan $MO_b \parallel O_cI$. Dengan cara serupa $MO_c \parallel O_bI$ juga. Oleh karena itu kita peroleh MO_bIO_c adalah sebuah jajar genjang sehingga K merupakan titik tengah dari IM atau $IK = \frac{1}{2}IM = \frac{1}{4}IJ$. Ini berakibat $\frac{IK}{KJ} = \frac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\frac{1}{3}}$.



□

§1.10 CGMO 2022, Problem 3

Soal. In triangle ABC , $AB > AC$, I is the incenter, AM is the midline. The line crosses I and is perpendicular to BC intersect AM at point L , and the symmetry of I with respect to point A is J . Prove that: $\angle ABJ = \angle LBI$.


Solusi. (Sunday, 30 October 2022) Misalkan N adalah proyeksi I pada garis AC , I_A adalah titik pusat A -excircle $\triangle ABC$, K adalah proyeksi I_A pada BC , dan T adalah titik pada garis II_A sedemikian sehingga $TM \perp BC$.

Perhatikan karena $\angle NIA = \angle CIA - \angle CIN = (90^\circ + \frac{\angle B}{2}) - 90^\circ = \frac{\angle B}{2} = \angle IBA$ dan $\angle NAI = \angle IAB$ maka didapat $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$.

Selanjutnya, observasi bahwa

$$\angle NIB = 360^\circ - \angle BIC - \angle CIN = 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{\angle A}{2}\right) - 90^\circ = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle IAB = \angle JAB.$$

Karena $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ maka $\frac{NI}{AJ} = \frac{NI}{IA} = \frac{IB}{AB}$. Hal ini menyebabkan $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ yang secara langsung menunjukkan bahwa $\angle JBA = \angle NBI$. Oleh karena itu, untuk membuktikan



Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya $CK = DB$ dan $KM = MD$. Hal ini menyebabkan $II_A = 2IT$. Lalu, karena $MT, LI \perp BC$ maka $MT \parallel LI$ sehingga $\frac{IT}{IA} = \frac{ML}{AL}$. Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$
$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$
$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$


sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$


Namun, kita mengetahui bahwa $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180^\circ$. Hal ini memaksa $\angle ABN = \angle ABL$ dan $\angle NBC = \angle LBC$ atau setara dengan titik-titik N, L, B segaris, seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

§1.11 IMSO 2021

Soal. In the diagram below, $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 135^\circ$ and $\angle BCD = 105^\circ$. What is the measure, in degrees, of $\angle ADC$?



Solusi. Definisikan titik E di dalam segiempat $ABCD$ sedemikian sehingga $AEBC$ membentuk jajargenjang.




Perhatikan bahwa $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180^\circ - \angle CBA) = 105^\circ - (180^\circ - 135^\circ) = 60^\circ$. Lalu, perhatikan bahwa $EC = AB = DC$. Ini berarti $\triangle EDC$ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, $\angle DEA = 360^\circ - \angle AEC - \angle CED = 360^\circ - \angle CBA - \angle DCE = 360^\circ - 135^\circ - 60^\circ = 165^\circ$. Tetapi kita tahu bahwa $AE = BC = CD = DE$, maka $\angle ADE = \frac{1}{2}(180^\circ - 165^\circ) = \frac{15^\circ}{2}$. Oleh karena itu didapat $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15^\circ}{2} + 60^\circ = \frac{135^\circ}{2}$. $\square$

§1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

Soal. In $\triangle ABC$, let D be the point on side BC such that $AB + BD = DC + CA$. The line AD intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ again at point $X \neq A$. Prove that one of the common tangents of the circumcircles of $\triangle BD X$ and $\triangle CD X$ is parallel to BC .

Solusi. Misalkan I adalah titik bagi $\triangle ABC$ dengan N adalah titik singgung lingkaran dalam $\triangle ABC$ dengan BC . Definisikan $E \neq X$ dan $F \neq X$ berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam $\angle DXB$ dengan lingkaran (DXB) dan perpotongan garis bagi dalam $\angle CXD$ dengan lingkaran (DXC) . Misalkan pula E_1 dan F_1 berturut-turut sebagai proyeksi E dan F ke BC .



Jika s adalah setengah keliling $\triangle ABC$, maka $AC + CD = AB + BD = s$ sehingga $CD = s - AC = BN$ atau dengan kata lain, D adalah titik singgung A -excircle dengan BC dengan $BD = NC$ dan $BN = CD$. Lalu, perhatikan karena XE garis bagi $\angle DXB$ sehingga $ED = EB$ yang secara langsung menyebabkan $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$. Dengan cara serupa didapat $DF_1 = \frac{1}{2}CD$. Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan $ED \parallel IC$. Karena $IN \perp BC$ dan $EE_1 \perp BC$ maka $IN \parallel EE_1$. Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$. Dengan cara serupa akan didapat juga

$\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$. Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau $EE_1 = FF_1$. Karena $EE_1 \parallel IN \parallel FF_1$ dan $EE_1 = FF_1$, maka EE_1F_1F adalah sebuah persegi panjang dengan $EF \parallel E_1F_1$.


Sekarang akan dibuktikan bahwa E_1F_1 memang adalah garis singgung lingkaran (BXD) dan (CXD) . Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem, $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$ mengimplikasikan EF menyinggung (BXD) di E . Dengan cara serupa EF menyinggung (CXD) di F . Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan (BXD) dan (CXD) sejajar dengan EF .

□

§1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Soal. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose side AB is at the same time the diameter of the circle. The lines AC and BD intersect at point E and the extensions of lines AD and BC intersect at point F . Segment EF intersects the circle at G and the extension of segment EF intersects AB at H . Show that if G is the midpoint of FH , then E is the midpoint of GH .

Solusi. Misalkan I adalah perpotongan kedua antara garis CG dan lingkaran $(ABCD)$.



Perhatikan karena $\angle ECB = \angle EHB$ maka $ECBH$ siklis. Sekarang, jika G titik tengah FH kita dapat memisalkan $FG = GH = HI = x$ (karena AB diameter maka $GH = HI$). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran $(ABCD)$ dan $(ECBH)$ akan didapat

$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$


yang menyebabkan $FE = \frac{3}{2}x$ atau $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$ yang menunjukkan bahwa E titik tengah GH .

□

§1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

Soal. In the right triangle ABC , CF is the altitude based on the hypotenuse AB . The circle centered at B and passing through F and the circle with centre A and the same radius intersect at a point of CB . Determine the ratio $FB : BC$.

Solusi. Misalkan D adalah perpotongan dua lingkaran tersebut yang terletak di BC . Misalkan pula $\angle CBA = \alpha$ dan $BD = BF = DA = x$. Karena $BD = DA$ kita punya $\angle DAB = \alpha$ dan $\angle CDA = 2\alpha$. Ini berarti $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$. Lalu, karena $CF \perp AB$ maka $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$ dan $\angle FCA = \alpha$. Oleh karena itu, $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$.



Di lain sisi, karena $BD = DA$, kita juga punya $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$. Berarti

$$AB = BF + FA$$

$$2x \cos \alpha = x + x \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) = 1$$

$$2 \cos^3 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Sekarang, perhatikan bahwa $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$. Berarti $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$ sehingga kita punya


$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

§1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ . Let P and Q be points in the half plane defined by BC containing A , such that BP and CQ are tangents to Γ and $PB = BC = CQ$. Let K and L be points on the external bisector of the angle $\angle CAB$, such that $BK = BA, CL = CA$. Let M be the intersection point of the lines PK and QL . Prove that $MK = ML$.

Solusi. (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus $AB = AC$, karena kesimetrian, jelas bahwa $MK = ML$. Oleh karena itu, WLOG $AB < AC$.



Misalkan $T \neq A$ adalah perpotongan garis bagi luar $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Lalu, misalkan $N \neq A$ adalah perpotongan garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Dari sifat garis bagi dalam dan luar, $\angle TAN = 90^\circ$ yang menunjukkan juga bahwa TN diameter Γ . Selain itu, T adalah titik tengah dari busur BC sehingga $TB = TC$.

Lemma 1.6

$TQCB$ dan $TPBC$ adalah layang-layang yang kongruen

Bukti. Karena QC menyinggung Γ di C , maka $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$. Di lain sisi, karena $BC = CQ$ dan $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$, maka $TC \perp QB$ sehingga $TQCB$ adalah layang-layang dengan $TB = TQ$. Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa $TPBC$ adalah layang-layang juga.

Selanjutnya, karena TN adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar segmen BC dan $TN \perp BC$, serta $BP = CQ$, maka dari kesimetrian kita punya $TQ = TP$ dan $TC = TB$. Hal ini menyebabkan $TQCB \cong TPBC$. □

Lemma 1.7

$LQTC$ dan $PKTB$ adalah segiempat siklis.

Bukti. Perhatikan bahwa $\angle TLC = \angle CAT$ karena $LC = AC$. Dari sini, karena $TQCB \cong TPBC$ adalah layang-layang dan $TABC$ siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa $LQTC$ siklis. Dengan cara serupa didapat $PKTB$ siklis. $\square$

Karena layang-layang $TQCB$ dan $TPBC$ kongruen, maka $\angle TCQ = \angle PBT$. Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

yang membuktikan bahwa $ML = MK$. $\square$

§1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono


Soal. Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik P adalah perpotongan garis BC dengan garis yang melalui A dan tegak lurus AC . Titik Q pada segmen CD . Garis PQ memotong garis AD di R . Garis BR memotong garis AQ di X . Buktikan bahwa jika titik Q bergerak sepanjang segmen CD , maka besar $\angle BXC$ konstan.

(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

Solusi. (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa $ABCXD$ siklis.

Misalkan X' adalah perpotongan BR dengan lingkaran $(ABCD)$. Misalkan pula Q' perpotongan AX' dengan CD .

Misalkan S adalah proyeksi A ke PQ . Karena $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$ maka $ASQD$ siklis.



Berarti dengan *power of a point*

$$RX' \cdot RB = RD \cdot DA = RQ \cdot QS.$$

yang menunjukkan bahwa $X'BSQ$ siklis. Berarti $\angle QX'B = \angle PSB$.

Sadari bahwa karena $\angle ABP = \angle PAC$ dan $\angle BCA = \angle PCA$ maka $\triangle BAP \sim \triangle BCA$ yang langsung mengakibatkan $\angle PAB = \angle ACB$. Sekarang karena $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$ maka $ASBP$ siklis, sehingga didapat


$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat $\angle QX'B = \angle Q'X'B$ yang menunjukkan $Q = Q'$ yang mengakibatkan $X = X'$. Soal terbukti. $\square$

§1.17 USAJMO 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC , let M be the midpoint of $\overline{BC}$. Let P be the foot of the perpendicular from C to AM . Suppose that the circumcircle of triangle ABP intersects line BC at two distinct points B and Q . Let N be the midpoint of $\overline{AQ}$. Prove that $NB = NC$.

Solusi 1. (Friday, 21 July 2023) Misalkan D adalah proyeksi A ke BC . Berarti kita punya $\angle CPA = \angle CDA = 90^\circ$ yang langsung mengakibatkan $CPDA$ siklis.




Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran $(ABPQ)$ dan $(CPDA)$ didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena $BM = CM$ maka didapatkan $MQ = MD$. Hal ini mengimplikasikan $QM : MD = QN : NA$ sehingga $\triangle MQN \sim \triangle DQA$ yang berakibat $\angle QMN = \angle QDA = 90^\circ$. Tentu saja karena M titik tengah BC dan $MN \perp BC$, maka $BN = CN$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Solusi 2. (Friday, 21 July 2023) Misalkan A' adalah titik hasil pencerminan A terhadap M .



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$


yang menunjukkan bahwa Q, C, A', P konsiklis. Oleh karena itu $\angle CQA' = \angle CPA' = 90^\circ$ atau $QA' \perp BC$.

Di lain sisi, karena $AN = NQ$ dan $AM = MA'$, maka $NM \parallel QA'$ yang mengakibatkan $NM \perp BC$. Karena $M = BC$, maka $BN = NC$. Terbukti. $\square$

§1.18 Korea 2023, Problem 1

Soal. In a triangle ABC ($\overline{AB} < \overline{AC}$), points $D(\neq A, B)$ and $E(\neq A, C)$ lies on side AB and AC respectively. Point P satisfies $\overline{PB} = \overline{PD}$, $\overline{PC} = \overline{PE}$. $X(\neq A, C)$ is on the arc AC of the circumcircle of triangle ABC not including B . Let $Y(\neq A)$ be the intersection of circumcircle of triangle ADE and line XA . Prove that $\overline{PX} = \overline{PY}$.

Solusi. (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis DE memotong garis BC di F . Perhatikan bahwa $BCED$ merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran (ADE) , (BDF) , (CEF) , dan (ABC) bertemu di satu titik, misalkan di titik G .



Perhatikan bahwa $\angle BGD = \angle BFD = \angle CFE = \angle CGE$ dan $\angle DBG = \angle ABG = \angle ACG = \angle ECG$ yang menyebabkan $\triangle GDB \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika dimisalkan M dan N berturut-turut adalah titik-titik tengah dari BD dan CE , maka $\triangle GDM \sim \triangle GEN$. Dari sini didapat $\angle GMA = \angle GMD = \angle GNE = \angle GNA$ yang mengimplikasikan G, M, N, A siklis.


Di lain sisi, kita punya $\angle YXG = \angle AXG = \angle ACG = \angle ECG$ dan $\angle GYX = \angle GYA = \angle GEA = \angle GEC$ yang mengimplikasikan $\triangle GYX \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika K adalah titik tengah YX , maka $\triangle GYK \sim \triangle GEN$ yang menyebabkan $\angle GKA = \angle GKY = \angle GNE = \angle GNA$ yang dengan kata lain mengakibatkan G, A, K, N konsiklis.

Terakhir, karena $DP = PB$ dan M titik tengah BD , maka $PM \perp AM$. Dengan cara serupa didapat pula $PN \perp AN$. Dari sini mudah disimpulkan bahwa $AMPN$ siklis dengan AP sebagai diameternya. Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta A, K, N, P, M, G konsiklis dengan AP sebagai diameter. Hal ini langsung membuat $PK \perp YX$. Karena K adalah titik tengah YX maka dapat disimpulkan bahwa $PY = PX$. Terbukti. $\square$

§1.19 IMO 2023, Problem 2

Solal. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC . Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A . The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L . Denote the circumcircle of triangle BDL by ω . Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Solusi 1. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω . Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF . Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .

**Lemma 1.8**

$EI \parallel BC$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\angle IEL = \angle IEB = \angle IPB = \angle DPB = \angle DLB = \angle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. $\square$

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\angle EBC = \angle BLD = \angle BPD = \angle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. $\square$

Karena $AE \perp BC$ maka $\angle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω . Jelas dari fakta tersebut bahwa $\angle APH = \angle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P .

Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A . Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma 1.9

$$AQ = QH$$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X . Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF . Karena $EX \parallel MS$ maka $\frac{IX}{IS} = \frac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\frac{AQ}{QH} = \frac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. $\square$

Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP . Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\angle YAF = \angle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

$$(A, H, Q, P_\infty) \stackrel{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

$\square$

Sadari bahwa $PQHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P , maka $\angle DPQ = \angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q . Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Thursday, 21 August 2025) Misalkan F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Terakhir, Definisikan H sebagai perpotongan kedua dari lingkaran (PQB) dengan AF . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .

P, D, H segaris.

$$\begin{aligned}\angle BPH &= \angle BQH \\ &= \angle BQF \\ &= \angle QBF + \angle BFQ \\ &= \angle SBF + \angle BFA \\ &= \angle SCF + \angle BCA \\ &= \angle SCA + \angle BCF \\ &= \angle EAF + \angle BAF \\ &= \angle EAF + \angle FAC \\ &= \angle EAC \\ &= \angle EBC \\ &= \angle BLD \\ \angle BPH &= \angle BPD.\end{aligned}$$
☐

Lemma 1.11

AH diameter lingkaran (APH) .

Bukti. Dari $PQHB$ siklis, kita punya

$$\angle AHP = \angle QHP = \angle QBP = \angle SBP = \angle SFP.$$

Lalu, kita juga punya

$$\angle PAH = \angle PAF = \angle PSF.$$

Padahal, karena SF diameter Ω maka $\angle SFP + \angle PSF = 90^\circ \implies \angle AHP + \angle PAH = 90^\circ$ yang mengakibatkan AH diameter lingkaran APH . Terbukti. $\square$

Selanjutnya dari Lemma 1.9 didapat bahwa Q pusat lingkaran (APH) . Oleh karena itu, $\angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* terbukti bahwa QP menyinggung ω di Q . $\square$


§1.20 Japan 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC , let D, E, F be the midpoints of BC, CA, AB respectively. Let X, Y be the feet of altitude from D to AB, AC respectively. The line through F parallel to XY meets line DY at P . Prove that $AD \perp EP$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena $\angle AYD = \angle AXD = 90^\circ$ maka $AYDX$ siklis. Lalu, karena $PF \parallel YX$ juga kita akan punya

$$\angle FPD = \angle XYD = \angle XAD = \angle FAD$$

yang menunjukkan bahwa $APDF$ siklis.



Sekarang karena $CE : EA = CD : DB$ maka $DE \parallel AB$ sehingga $\angle DEY = \angle BFD$. Oleh karena itu didapat


$$\angle APD = \angle AFD = \angle BFD = \angle DEY = 90^\circ - \angle PDE$$

yang mengakibatkan $DE \perp AP$. Karena kita juga tahu bahwa $AY \perp DP$ maka E adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari $\triangle ADP$ sehingga didapat $AD \perp EP$. Terbukti. $\square$

§1.21 Random Problem 2

Soal. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut $\angle ABC = 60^\circ$ dan $\angle BCA = 100^\circ$. Pada sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E sehingga $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$. Tentukan besar sudut $\angle BED$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Diketahui $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$. Oleh karena itu jelas bahwa $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$ dan $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$. Selain itu $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$ sehingga $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$ yang menyebabkan $DA = AC$ dan $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$.



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku $\frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$. Selain itu, karena $\angle DBC = \angle CBA$ dan $\angle BAC = \angle BCD$ maka $\triangle BDC \sim \triangle BCA$ sehingga $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{CD}{CA}$.

Lemma 1.12

BE garis bagi $\angle CBA$

Proof. Alternatif 1.

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada $\triangle CDA$ dan $\triangle BDC$ kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

Alternatif 2.

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa BE adalah garis bagi $\angle CBA$. □

Dari sini, $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$ sehingga $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$. □

§1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = AC$. Lingkaran dalam $\triangle ABC$ menyinggung sisi AB dan BC berturut-turut di P dan Q . Garis CP memotong lingkaran dalam $\triangle ABC$ di titik P dan R . Jika $PQ = 4$ dan $PR = 5$, panjang QR adalah ...

- a. $\frac{1}{2}\sqrt{14}$ b. 2 c. $\frac{3}{5}\sqrt{14}$ d. $\frac{4}{5}\sqrt{14}$ e. 3

Solusi. (Saturday, 11 November 2023) Misalkan S pada garis CP sehingga $BS \parallel PQ$. Perhatikan bahwa $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$. Misalkan panjang $CR = x$ maka $\frac{PS}{CP} = \frac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$.

Selanjutnya, $\frac{SB}{PQ} = \frac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$.


Kita punya $\angle RSB = \angle RPQ$. Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran (RPQ) dan garis singgung AP ditemukan $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$. Oleh karena itu didapat $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$. Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \implies \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \implies x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti $CR = \frac{7}{5}$ dan $CP = \frac{32}{5}$.

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \Rightarrow CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \Rightarrow CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \implies RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$
☐

Solusi 1. (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik E berada di dalam $\triangle BDC$ sedemikian sehingga $\triangle ABD \cong \triangle CBE$.



34

Sekarang misalkan $\angle DBE = 2x$ maka karena $AB = BC$ didapat $\angle DAC = \angle ECA = 50^\circ - x$. Lalu, karena $BD = BE$ maka $\angle BDE = \angle BED = 90^\circ - x$. Selanjutnya, $\angle EDC = 360^\circ - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20^\circ$. Oleh karena $ADEC$ siklis dan sama kaki, maka $\angle DEA = \angle EDC = x - 20^\circ$.

Dari fakta tersebut didapat $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70^\circ = \frac{1}{2}\angle BDA$. Namun, karena $DB = DA$ maka didapat D adalah pusat lingkaran (ABE) sehingga $EB = BD = DE$ yang menyebabkan $\triangle BDE$ sama sisi sehingga $2x = \angle DBE = 60^\circ \implies x = 30^\circ$.

Oleh karena itu karena $DECA$ siklis didapat $\angle ACD = \angle AED = x - 20^\circ = 10^\circ$. $\square$

Solusi 2. (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa $\angle BDC = 360^\circ - \angle BDA - \angle ADC = 70^\circ$.

Misalkan $\angle BCD = x$. Dengan dalil sinus pada $\triangle BDC$ dan $\triangle ADB$ akan didapat


$$\frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2 \cos 20^\circ = \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x} = \frac{\cos 20^\circ}{\sin x}$$

yang setara dengan


$$\begin{aligned} \sin x = \frac{1}{2} &\implies \angle DCB = x = 30^\circ \implies \angle DBC = 180^\circ - \angle BDC - \angle DCB = 80^\circ \\ &\implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100^\circ \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = 40^\circ \\ &\implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10^\circ. \end{aligned}$$



$\square$


§1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Soal. Diberikan segitiga lancip ABC . Garis $\ell_1, \ell_2 \perp AB$ berturut-turut pada A dan B . Misalkan M titik tengah AB . Garis melalui M tegak lurus AC dan BC memotong ℓ_1 dan ℓ_2 berturut-turut pada E dan F . Misalkan D titik potong dari EF dan MC . Jika $EF = \frac{64}{3}$, $FM = 16$, dan $BD = 12$. Luas segitiga AMF dapat dinyatakan dalam $a\sqrt{b}$ dimana a dan b bilangan asli dan b tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari $a + b$ adalah ...


$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$
$$\angle GED = \angle GEF = \angle GHF = \angle GHM = \angle GCM = \angle GCD$$
$$\angle MED = \angle MAD \text{ dan } \angle MAD = \angle DFB = \angle DMB$$
$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \Rightarrow AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} = \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \Rightarrow AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$
$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$
$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

§1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta

Soal. Pada segitiga ABC , titik D adalah kaki garis tinggi dari C . Titik E dan F pada AC dan BC , berturut-turut $AE = AD$ dan $BF = BD$. Titik S adalah refleksi C pada titik pusat lingkaran luar $\triangle ABC$. Buktikan bahwa $SE = SF$.



Solusi 1. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa CS adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$ sehingga $\angle CAS = \angle SBC = 90^\circ$. Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga EAS , SBF , CAS , CSB akan didapat

$$\begin{aligned}
 CS^2 &= CS^2 \\
 AC^2 + AS^2 &= BC^2 + BS^2 \\
 AC^2 - CD^2 + AS^2 &= BC^2 - CD^2 + BS^2 \\
 AD^2 + AS^2 &= BD^2 + BS^2 \\
 AE^2 + AS^2 &= BF^2 + BS^2 \\
 SE^2 &= SF^2 \\
 SE &= SF.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 2. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos \angle ECS = \cos \angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada $\triangle FCS$ serta teorema Pythagoras di $\triangle CDB$ didapat

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot CS \cos \angle SCF$$

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot BC$$

$$SF^2 = (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BF^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BD^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = -CD^2 + CS^2$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada $\triangle ECS$, serta teorema Pythagoras di $\triangle ADC$ didapat

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot CS \cos \angle ECS$$

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot AC$$

$$SE^2 = (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AE^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AD^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = -CD^2 + CS^2$$

$$SE^2 = SF^2$$

$$SE = SF.$$

Terbukti. □

Solusi 3. (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Lalu, didapat $\angle BSC = \angle BAC = A$ dan $\angle CSA = \angle CBA = B$ sehingga

$$SB = \frac{BC}{\tan \angle BSC} = \frac{BC}{\tan A}$$

$$SA = \frac{AC}{\tan \angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}$$

Selanjutnya, observasi $\triangle BDC$ dan $\triangle ADC$ akan didapat

$$BF = BD = BC \cos B$$

$$AE = AD = AC \cos A$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$SF^2 = SB^2 + BF^2 = \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B$$

$$SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada $\triangle ABC$ kita punya

$$1 = 1$$

$$\frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} = \frac{1 - \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} = \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B = \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A$$

$$1 = \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A}$$

$$\left(\frac{\sin A}{\sin B} \right)^2 = \frac{\sin^2 A \left(\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B \right)}{\sin^2 B \left(\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \right)}$$

$$\left(\frac{BC}{AC} \right)^2 = \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A}$$

$$BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) = AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)$$

$$\frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} = \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B}$$

$$\frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

$$SF^2 = SE^2$$


$$SF = SE.$$

Terbukti. □

§1.26 IMO 2024, Problem 4

Soal. Let ABC be a triangle with $AB < AC < BC$. Let the incenter and incircle of triangle ABC be I and ω , respectively. Let X be the point on line BC different from C such that the line through X parallel to AC is tangent to ω . Similarly, let Y be the point on line BC different from B such that the line through Y parallel to AB is tangent to ω . Let AI intersect the circumcircle of triangle ABC at $P \neq A$. Let K and L be the midpoints of AC and AB , respectively. Prove that $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

(Proposed by Dominik Burek, Poland)



Remark. Jadi hal pertama dalam langkahku untuk nemu solusi adalah "iseng-iseng" nyambung garis singgung yang lewat X dan Y . Kenapa? Karena kayaknya bakal dapet hal bagus kalo itu "disambung". Ternyata bener, kalo gambarnya bagus, bisa dapet $AEDF$ belah ketupat. Ingat, hal bagus ini juga bukan tanpa alasan: $AEDF$ menyinggung lingkaran dalam, yang berarti banyak ruas-ruas garis yang panjangnya sama. Berarti bisa dong cari sebuah kesimetrian.

Proof. Perhatikan karena $AF \parallel DE$ dan $AE \parallel DF$, maka $AEDF$ adalah jajargenjang. Namun, perhatikan karena keempat sisi $AEDF$ menyinggung ω dengan r adalah jari-jarinya, maka

terbukti bahwa $AEDF$ belah ketupat.

Remark. Nah, sekarang adalah salah satu bagian paling krusial. Kelihatannya agak jelek ya ngebandingin $\angle KIL$ dan $\angle YPX$ langsung. Jujur aja pas awal baca soal dan lihat gambar, aku agak bingung ini "jauh amat" dua sudut yang mau dibuktiin. Eh yaudah, kepikiranlah buat "mendekatkan" dua sudut tersebut. Oke, berarti jangan-jangan ada dua segitiga sebangun hasil "pergeseran" homothety? Yes, bener ternyata ada kalau jeli melihat gambar. Nah sekarang gimana cara buktiinnya? Ingat bahwa kita udah buktiin $AEDF$ belah ketupat, yang berarti banyak kesimetrian! Titik tengah, garis yang sama panjang, wah dapet nih!

Sekarang karena fakta bahwa $AEDF$ belah ketupat dengan keempat sisinya menyinggung ω , jelas I adalah titik tengah diagonal AD dari $AEDF$. Sadari juga bahwa K dan L masing-masing adalah titik tengah dari AB dan AC .

Oleh karena itu, terdapat sebuah homothety/dilatasi dengan pusat A dan skala 2 yang memetakan $\triangle LKI$ ke $\triangle CBI$ (dengan kata lain, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). Dari sini $\angle LIK = \angle CDB$.

Remark. Oke, sekarang sentuhan terakhir. Kita udah mendekatkan $\angle KIL$ dengan $\angle YPX$ menjadi $\angle CDB$. Nah berarti tinggal cari nih gimana cara hubungin dua sudut, $\angle CDB$ dan $\angle YPX$. Nah, karena kayaknya ini "kelihatannya" bisa di *angle chasing* yaudah gaskan. Eh ternyata beneran dong bisa di *angle chasing*. Malahan nemu segiempat yang siklis disitu.

Sekarang observasi bahwa

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$

yang menunjukkan segiempat $BXDP$ siklis. Dengan cara serupa didapat juga bahwa segiempat $CYDP$ siklis. Karena fakta-fakta tersebut bisa didapatkan bahwa

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$

atau $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ yang membuktikan bahwa $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$.

□

English Solution. (Friday, 19 July 2024)

Remark. So the first thing in my approach to finding the solution was to "mess around" by connecting the tangent lines passing through X and Y . Why? Because it seemed like we'd get something good if we "connected" them. Turns out, I was right - if you draw it well, you can see that $AEDF$ is a rhombus. Remember, this good thing didn't come out of nowhere: $AEDF$ is tangent to the incircle, which means many line segments have the same length. So we should be able to find some symmetry here.

Proof. Notice that since $AF \parallel DE$ and $AE \parallel DF$, $AEDF$ is a parallelogram. However, note that because all four sides of $AEDF$ are tangent to ω with r as its radius, we have

proving that $AEDF$ is a rhombus.

42

"bring them closer"? Okay, so maybe there are two similar triangles resulting from a homothety "shift"? Yes, turns out there are if you look at the figure carefully. Now, how do we prove it? Remember that we've already proved $AEDF$ is a rhombus, which means there's a lot of symmetry! Midpoints, lines of equal length - we're onto something here!

Now because $AEDF$ is a rhombus with all four sides tangent to ω , clearly I is the midpoint of diagonal AD of $AEDF$. Also notice that K and L are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, there's a homothety/dilation with center A and scale 2 that maps $\triangle LKI$ to $\triangle CBI$ (in other words, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). From this, we get $\angle LIK = \angle CDB$.

Remark. Okay, now for the final touch. We've already brought $\angle KIL$ closer to $\angle YPX$ by relating it to $\angle CDB$. So now we just need to find a way to connect these two angles, $\angle CDB$ and $\angle YPX$. Well, since it "looks like" we might be able to do some angle chasing here, let's give it a shot. And you know, it actually works out! We even find a cyclic quadrilateral in there.

Now observe that

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$


which shows that quadrilateral $BXDP$ is cyclic. Similarly, we can show that quadrilateral $CYDP$ is cyclic. Because of these facts, we can conclude that

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$


or $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ which proves that $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$. $\square$

§1.27 Random Problem 3

Soal. In the diagram below, AD is perpendicular to AC and $\angle BAD = \angle DAE = 15^\circ$. If $AB + AE = BC$, find $\angle ABC$ in degrees.



Solusi. (Senin, 21 Oktober 2024)



Perpanjang BA hingga titik F sehingga $AE = AF$. Dari sini didapat $BC = AB + AE = AB + AF = BF$. Selanjutnya kita punya

$$\angle FAC = 180^\circ - \angle BAD + \angle DAC = 75^\circ = \angle DAC - \angle DAE = \angle EAC.$$

Ini berakibat $FAEC$ layang-layang. Sehingga

$$\angle BCF = \angle BFC = \angle AEC = \angle BAE + \angle ABC = 30^\circ + \angle ABC$$

maka

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle BFC - \angle BCF$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 2\angle BFC$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 60^\circ - 2\angle ABC$$

$$3\angle ABC = 120^\circ$$

$$\angle ABC = 40^\circ$$

□


§1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

Soal. Diberikan persegi $ABCD$ dan titik E pada ruas CD . Misalkan F adalah titik pada ruas AE sehingga BF tegak lurus AE . Dengan cara serupa, misalkan G adalah titik pada ruas EB sehingga AG tegak lurus EB . Misalkan garis DF dan CG berpotongan di H . Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

Proposed by: Raymond Christopher Tanto

Solusi. (Minggu, 26 Januari 2025)



Notasikan $\angle$ sebagai directed angle. Misalkan O adalah pusat persegi $ABCD$. Jelas bahwa $DB \perp AC$. Lalu misalkan T sebagai perpotongan BF dan AG Kita punya beberapa lemma berikut

Lemma 1.13

A, B, G, O, F konsiklis.

Proof. $\angle AFB = \angle AOB = \angle AGB = 90^\circ$ yang membuktikan A, B, G, O, F konsiklis. $\square$

Lemma 1.14

D, F, O, E konsiklis dan E, O, G, C konsiklis.

Proof. Dengan bantuan Lemma 1.13 dan fakta bahwa $AB \parallel CD$ didapat

$$\angle DOF = \angle BOF = \angle BAF = \angle DEF$$

yang membuktikan D, F, O, E konsiklis. Analog cara tersebut, E, O, G, C juga konsiklis. $\square$

Lemma 1.15

A, G, E, D konsiklis dan F, B, E, C konsiklis.

Proof. $\angle ADE = 90^\circ = \angle AGE$ yang membuktikan A, G, E, D konsiklis. $\angle BFE = 90^\circ = \angle BCE$ yang membuktikan F, B, E, C konsiklis. $\square$

Lemma 1.16

F, O, G, H konsiklis.

Proof. Dari Lemma 1.13 dan Teorema Miquel pada $\triangle DHC$, didapatkan bahwa O adalah Miquel point dari $\triangle DHC$ yang berakibat F, O, G, H konsiklis. $\square$

Dari Lemma 1.13 dan Lemma 1.16, didapat F, A, H, B, G, O konsiklis.


Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya

$$\begin{aligned}
 \angle DFC + \angle DGC &= (\angle DFE + \angle EFC) + (\angle DGE + \angle EGC) \\
 &= (\angle HFA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BGH) \\
 &= (\angle HBA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BAH) \\
 &= (\angle HBA + \angle BAH) + (\angle EBC + \angle DAE) \\
 &= 90^\circ + \angle BAE \\
 &= 90^\circ + (180^\circ - \angle FTG) \\
 &= 90^\circ + (180^\circ - \angle BTA) \\
 &= 90^\circ + (\angle ABF + \angle GAB) \\
 &= 90^\circ + (\angle AHF + \angle GHB) \\
 \angle DFC + \angle DGC &= 90^\circ + (\angle AHD + \angle BHC)
 \end{aligned}$$

 $\square$ **§1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama**

Soal. Pada segitiga ABC , titik P dan Q berada pada sisi BC sehingga panjang BP sama dengan CQ . $\angle BAP = \angle CAQ$ dan $\angle APB$ lancip. Apakah segitiga ABC sama kaki? Tulis alasan Anda.

Solusi. (Jumat, 14 Maret 2025) Ya, segitiga ABC sama kaki.



Translasi titik A ke A' sehingga $A'AEB$ menjadi jajar genjang. Dari sini didapat $AB = AE$, $BD = EC$, dan $A'D = AC$ yang menunjukkan bahwa $\triangle A'BD \cong \triangle AEC$. Karena $\angle BAD = \angle EAC = \angle BA'D$ maka $A'AEB$ merupakan segiempat siklis. Oleh karena itu, karena kita juga punya $A'A \parallel BD$ maka


$$\angle ABC = \angle ABD = \angle AA'D = \angle A'DB = \angle ACE = \angle ACB$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa $AB = AC$, terbukti. $\square$

§1.30 Random Problem 4

Soal. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran luar ω dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar BC , yang memotong sisi AB dan AC secara berurutan di titik X dan Y . Misalkan M adalah titik tengah dari busur BC pada lingkaran ω yang tidak memuat titik A . Garis MX dan MY memotong lingkaran ω kembali di titik S dan T secara berurutan. Misalkan ST dan XY berpotongan di titik P . Tunjukkan bahwa garis AP menyinggung lingkaran ω .

Solusi. (Senin, 7 April 2025)



Perhatikan bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ABC$ sehingga $\angle AYX = \angle ACB$. Lalu karena M titik tengah busur BC , maka $BM = MC$ dan $\angle BCM = \angle MBC$.

Lemma 1.17

$STYX$ merupakan segiempat siklis.

Bukti 1. Misalkan D adalah perpotongan XM dan BC .

$$\begin{aligned}
 \angle STY &= \angle STM \\
 &= \angle STB + \angle BTM \\
 &= \angle SMB + \angle BCM \\
 &= \angle XMB + \angle MBC \\
 &= \angle MDB \\
 &= \angle XDB \\
 &= \angle XBC + \angle MXB \\
 &= \angle AXY + \angle SXA \\
 &= \angle SXY.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 2. Kita punya $\angle XSB = \angle MSB = \angle MCB = \angle CBM$. Dari sini diperoleh

$$\begin{aligned}
 \angle SXY &= \angle SXA + \angle AXY \\
 &= \angle MXB + \angle ABC \\
 &= \angle SXB + \angle ABC \\
 &= \angle SBX + \angle XSB + \angle ABC \\
 &= \angle SBX + \angle CBM + \angle ABC \\
 &= \angle SBM \\
 &= \angle STM \\
 &= \angle STY.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 3. Akan dibuktikan bahwa $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Perhatikan dari P.O.P bahwa

$$\begin{aligned}
 AY \cdot YC &= MY \cdot YT \\
 AX \cdot XB &= MX \cdot XS.
 \end{aligned}$$

Berarti karena $AY = YC$ dan $AX = XB$, maka

$$\begin{aligned}
 MY \cdot MT &= MY(MY + YT) = MY^2 + MY \cdot YT = MY^2 + AY^2 \\
 MX \cdot MS &= MX(MX + XS) = MX^2 + MX \cdot XS = MX^2 + AX^2.
 \end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle AMB$ dan $\triangle AMC$, dan $\cos B = \cos(180 - C) = -\cos C$, kita peroleh

$$AM^2 = MC^2 + AC^2 - 2MC \cdot AC \cdot \cos C$$

$$AM^2 = MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot BA \cdot \cos B = MC^2 + AB^2 + 2MC \cdot BA \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$AC^2 - AB^2 = 2MC(AC + AB) \cos C$$

$$AC - AB = 2MC \cos C.$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle BXM$ dan $\triangle CYM$, kita peroleh

$$MY^2 = AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C$$

$$MX^2 = AX^2 + MB^2 - 2MB \cdot AX \cdot \cos B = AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$MY \cdot MT - MX \cdot MS$$

$$= (MY^2 + AY^2) - (MX^2 + AX^2)$$

$$= (MY^2 - MX^2) + (AY^2 - AX^2)$$

$$= (AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C) - (AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C) + (AY^2 - AX^2)$$

$$= 2(AY^2 - AX^2) - 2MC \cdot (AX + AY) \cdot \cos C$$

$$= \frac{1}{2}((2AY)^2 - (2AX)^2) + \frac{1}{2} \cdot 2MC \cos C \cdot 2(AX + AY)$$

$$= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC - AB)(AB + AC)$$

$$= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2)$$

$$= 0.$$


yang menyebabkan $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Terbukti. $\square$

Sekarang perhatikan bahwa *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan ω adalah ST . Lalu *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan (AXY) adalah XY . Terakhir, *radical axis* dari ω dan (AXY) adalah garis singgung yang melewati A (yang menyinggung dua lingkaran tersebut dari *alternate segment theorem*). Oleh karena itu, ST , XY , dan garis singgung yang melewati A berpotongan di satu titik *radical center*, yaitu P . Terbukti. $\square$

§1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024

Soal. The incircle of scalene triangle $\triangle ABC$ is tangent to $\overline{BC}$, $\overline{AC}$, and $\overline{AB}$ at points D , E , and F , respectively. The line EF intersects line BC at P and line AD at Q . The circumcircle of $\triangle AEF$ intersects line AP again at point $R \neq A$. If I is the incenter of $\triangle ABC$, prove that I, Q, R are collinear.

Solusi 1. (Jumat, 11 Juli 2025) Misalkan I adalah titik pusat lingkaran dalam $\triangle ABC$. Lalu, misalkan H adalah perpotongan AI dengan FE dan G adalah titik di AD sehingga $IG \perp AD$.



Perhatikan bahwa $\angle AFI = \angle AEI = 90^\circ$ sehingga A, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya. Selanjutnya, karena $\angle DGI = 90^\circ$ maka D, G, I konsiklis dengan DI sebagai diameternya. Di lain sisi, karena $\angle IGA = 90^\circ = \angle IFA$, maka A, I, F, G konsiklis. Lebih jauh, garis IG merupakan *radical axis* dari lingkaran $(AFGI)$ dan (EGI) .

Selanjutnya, karena $DI \perp BC$ maka (D, G, I) menyinggung BC di D . Namun, karena (DEF) juga menyinggung BC di D maka BC merupakan *radical axis* dari (DEF) dan (DGI) .

Di lain pihak, kita juga punya EF merupakan *radical axis* dari (AEF) dan (DEF) .

Perhatikan bahwa ketiga *radical axis* EF, BC, IG konkuren di suatu *radical point*. Dari definisi di soal, karena P adalah perpotongan EF dan BC , maka didapat P merupakan *radical center* dari $(AEF), (DEF), (DGI)$.

Misalkan Γ adalah lingkaran yang melalui A dan menyinggung BC di D . Dari *power of a point*, kita punya

$$PR \cdot PA = PF \cdot PE = PG \cdot PI = PD^2,$$

sehingga didapat R berada di Γ .

Sekarang, jelas bahwa $EF \perp AI$ sehingga $\angle QHI = 90^\circ = \angle QGI$ yang menunjukkan Q, H, I, G

konsiklis. Oleh karena itu, dari *power of a point* kita punya

$$PR \cdot PA = PG \cdot PI = PQ \cdot PH,$$

sehingga didapat A, R, Q, H konsiklis dengan $\angle QRA = \angle QHA = 90^\circ$. Padahal kita juga tahu bahwa A, R, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya yang langsung menyebabkan $\angle IRA = 90^\circ$. Dari sini didapat I, Q, R segaris. Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Jumat, 11 Juli 2025) Kita akan memakai konfigurasi gambar dari solusi 1. Observasi inversi terhadap lingkaran (DEF) . Karena $\triangle IFH \sim \triangle IAF$ maka $IH \cdot IA = IF^2$ dengan IF adalah jari-jari lingkaran (DEF) , maka EF dipetakan ke (AEF) . Lalu, $\triangle IGD \sim \triangle IDP$ sehingga $IG \cdot IP = ID^2$ dengan ID adalah jari-jari lingkaran (DEF) , maka G dipetakan ke P .


Perhatikan bahwa AD adalah *polar* dari *pole* P karena $IG \perp AD$. Misalkan Q dipetakan ke R' yang berada di (AEF) . Ingat bahwa AI adalah diameter (AEF) maka $IR' \perp AR'$. Lalu, AR' adalah *polar* dari *pole* Q . Namun, perlu diingat bahwa karena Q berada di *polar* dari P , maka dari *La Hire's theorem* didapat P berada di *polar* dari Q . Dari sini didapat P berada di AR' .

Dikarenakan R dan R' berada di (AEF) serta A, R, R', P segaris, maka didapat $R = R'$. Terbukti bahwa $I, Q, R' = R$ segaris. $\square$

§1.32 Japan MO 2025, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute triangle and let O be its circumcenter. Let O_1 and O_2 be the circumcenters of triangles ABO and ACO , respectively. The circumcircle of triangle AO_1O_2 intersects the side BC (excluding its endpoints) at two distinct points P and Q , such that the four points B, P, Q, C are collinear in this order. Let O_3 be the circumcenter of triangle OPQ . Prove that the three points A, O, O_3 are collinear.

Solusi. (Minggu, 20 Juli 2025)



Misalkan P' dan Q' berturut-turut adalah perpotongan O_2O dengan BC dan O_1O dengan BC . Klaim bahwa $P = P'$ dan $Q = Q'$.

Dari hubungan sudut keliling dan sudut pusat di lingkaran luar $\triangle ABC$, kita punya $\angle P'OA = \angle O_2OA = \angle CBA = \angle P'BA$ yang mengakibatkan $BP'OA$ siklis. Hal ini menyebabkan $\angle AP'O_2 = \angle AP'O = \angle ABO = \angle OAB$. Dari definisi O , O_1 dan O_2 , didapat $O_1O_2 \perp AO$ dan $OO_1 \perp AB$ serta kita juga punya $O_1A = O_1O$ dan $O_A = O_2O$ yang berarti AO_1OO_2 layang-layang. Ini berarti, $\angle OAB = \angle O_2O_1O = \angle AO_1O_2$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa $\angle AP'O_2 = \angle AO_1O_2$ yang menunjukkan A, O_1, O_2, P' konsiklis. Dengan cara serupa didapatkan A, O_1, O_2, Q' konsiklis. Berarti dapat disimpulkan bahwa A, O_1, O_2, P', Q' , sehingga dari definisi P, Q didapat bahwa $P' = P$ dan $Q' = Q$. Ini berarti O_1, O, Q segaris dan O_2, O, P segaris atau dengan kata lain O adalah perpotongan PO_2 dan PO_1 .

Dari klaim tersebut

$$\angle OPO_1 = \angle O_2PO_1 = \angle O_2AO_1 = \angle O_1OO_2 = \angle O_1OP \implies O_1O = O_1P$$

Sekarang, dari definisi O_3 , perhatikan bahwa $O_3P = O_3Q$ sehingga dari sini didapat OO_1PO_3 adalah layang-layang.

Selanjutnya dengan hubungan sudut pusat dan keliling dari lingkaran luar $\triangle OPQ$, kita punya

$$\angle QO_3P = 2\angle QOP = 2\angle O_1OP = \angle O_1OP + \angle OPO_1 = \angle OO_1P = \angle QO_1P$$

yang menunjukkan bahwa O_3 berada di lingkaran yang sama dengan A, O_1, O_2, P', Q' .

Sekarang, karena $O_3OO_1O_2$ layang-layang maka $O_1O_3 \perp PO$. Di lain sisi karena AO_1OO_2 layang-layang maka $O_2O_1 \perp AO$. Dari fakta-fakta tersebut didapat


$$\angle POO_3 = \angle O_3PO = \angle O_3PO_2 = \angle O_3O_1O_2 = \angle POA$$

yang langsung mengakibatkan O_3, O, A segaris. □

§1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5

Soal. Diberikan segitiga ABC , dengan $AC > BC$, dan lingkaran luarnya yang berpusat di O . Misalkan M adalah titik pada lingkaran luar segitiga ABC sehingga CM adalah garis bagi $\angle ACB$. Misalkan Γ adalah lingkaran berdiameter CM . Garis bagi $\angle BOC$ dan garis bagi $\angle AOC$ memotong Γ berturut-turut di P dan Q . Jika K adalah titik tengah CM , buktikan bahwa P, Q, O, K terletak pada satu lingkaran.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan D dan E berturut-turut adalah perpotongan OP dengan BC dan OQ dengan AC . Dari sini didapat D dan E berturut-turut adalah titik tengah AB dan AC .



Dikarenakan K, D, E berturut-turut adalah titik tengah busur AM, BC, CA dari lingkaran luar $\triangle ABC$, maka $\angle OKC = \angle ODC = \angle OEC = 90^\circ$. Fakta tersebut langsung mengakibatkan C, E, O, K, D konsiklis. Oleh karena itu, didapat $\angle KDE = \angle KCE = \angle DCK = \angle DEK$ yang berarti $DK = KE$. Dengan menggabungkan fakta $DK = KE$, $PK = QK$ (karena merupakan jari-jari Γ), fakta $\angle KDO = \angle KEO \implies \angle KDP = \angle KEQ$ (karena $KDEO$ siklis) maka $\triangle PDK \sim \triangle QEK$ (ini merupakan kasus khusus kesebangunan segitiga SSA (*SideSideAngle*)). Fakta tersebut menyebabkan $\angle KPO = \angle KPD = \angle KQE = \angle KQO$ yang menunjukkan bahwa K, P, Q, O konsiklis. Terbukti. $\square$


§1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1

Soal. Let ABC be a triangle. Let L be the line through B perpendicular to AB . The perpendicular from A to BC meets L at the point D . The perpendicular bisector of BC meets L at the point P . Let E be the foot of the perpendicular from D to AC .

Prove that triangle BPE is isosceles.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan garis sumbu BC memotong BC dan BE berturut-turut di M dan N . Lalu misalkan pula T sebagai perpotongan AD dengan BC . Dari definisi garis sumbu mudah dilihat bahwa $BN = NC$, $BP = PC$, $\angle NPB = \angle CPN$, $\angle BCP = \angle PBC$. Perhatikan bahwa $\angle ABD = \angle AED = 90^\circ$ yang menyebabkan $ABDE$ siklis. Lalu, kita juga punya $AD \perp BC$ dan $NP \perp BC$ sehingga $AD \parallel NP$. Oleh karena itu,


$$\angle CEN = \angle AEB = \angle ADB = \angle NPB = \angle CPN$$


$$\begin{aligned}\angle PEC &= \angle PNC \\ &= \angle BNP \\ &= 90^\circ - \angle CBN \\ &= \angle DBA - \angle CBN \\ &= \angle EBA + \angle PBC \\ &= \angle ECB + \angle BCP \\ \angle PED &= \angle ECP.\end{aligned}$$

Berarti diperoleh $EP = PC$. Namun, karena $BP = PC$ maka $EP = BP$. Terbukti bahwa $\triangle BEP$ sama kaki. □

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dimana A', B', C' berturut-turut adalah pencerminan A, B, C terhadap BC, CA, AB . Perpotongan lingkaran luar $\triangle ABB'$ dan $\triangle ACC'$ adalah A_1 . Definisikan B_1 dan C_1 secara serupa. Buktikan bahwa AA_1, BB_1 , dan CC_1 konkuren (bertemu di satu titik).

Solusi. (Wednesday, 6 August 2025)



Misalkan AC berpotongan dengan lingkaran (ABB') untuk kedua kalinya di A_B dan misalkan AB berpotongan dengan lingkaran (ACC') untuk kedua kalinya di A_C . Perhatikan karena B' adalah hasil pencerminan B terhadap AA_B , maka AA_B adalah diameter lingkaran (ABA_BB') sehingga $BA_B \perp AB$. Dengan cara yang serupa dapat diperoleh bahwa juga bahwa AA_C adalah diameter lingkaran (ACA_CA') sehingga $CA_C \perp AC$.

Dari fakta-fakta tersebut, didapat $\angle A_B A_1 A = \angle A A_1 A_C = 90^\circ$, maka A_B, A_1, A_C segaris dan juga didapat bahwa AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_B A_C$.


Sekarang, misalkan H_A adalah perpotongan antara CA_C dan BA_B , maka $\angle ACH_A = \angle H_A B A = 90^\circ$ yang mengakibatkan H_A adalah titik tinggi $\triangle AA_C A_B$ sekaligus AH_A menjadi diameter lingkaran luar $\triangle ABC$. Karena AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_B A_C$, maka H_A berada di garis AA_1 .

Definisikan H_B dan H_C secara serupa dengan definisi H_A , maka didapat pula bahwa H_B dan H_C berturut-turut berada di garis BB_1 dan CC_1 . Oleh karena itu, AH_A , BH_B , dan CH_C adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$, maka didapat AH_A , BH_B , dan CH_C berpotongan di satu titik yaitu pusat lingkaran. Karena A_1, B_1, C_1 berturut-turut ada di garis AH_A , BH_B , CH_C maka hal ini berakibat AA_1 , BB_1 , dan CC_1 berpotongan di satu titik. $\square$

§1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1

Soal. In the triangle ABC , $\angle B > 90^\circ$, the incircle touches the sides BC and CA at D and E , respectively. The lines ED and AB intersect at P . The incircle of the triangle AEP touches the sides PE and AP at D_1 and E_1 , respectively. The lines E_1D_1 and AE intersect at P_1 . Suppose P, C, E, B are concyclic. Prove that BE is parallel to PP_1 .

Solusi. (Wednesday, 15 August 2025)



Dari properti garis singgung lingkaran, jelas bahwa $CD = CE$, dan $PE_1 = PD_1$ sehingga $\angle CDE = \angle DEC$ dan $\angle PE_1D_1 = \angle E_1D_1P$. Oleh karena itu, dari fakta $EBPC$ siklis, didapat

$$\angle BDP = \angle CDE = \angle PEC = \angle PBC = \angle PBD \implies BP = PD.$$

Karena $\angle DPB = \angle D_1PE_1$ maka $\triangle DPB \sim \triangle D_1PE_1$ sehingga $BD \parallel E_1D_1$. Dari fakta ini, diperoleh

$$\angle PE_1P_1 = \angle PBC = \angle PEC = \angle PEP_1 \implies PE_1EP_1 \text{ siklis.}$$

Sekarang perhatikan karena $\angle APE = \angle BCA$ dan $\angle PAE = \angle BAC$ maka $\triangle PAE \sim \triangle BAC$ maka rasio segmen-segmen yang bersinggungannya juga memiliki rasio yang sama dengan rasio sisi-sisi bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Oleh karena itu, $AE : AE_1 = AC : AP$ sehingga $EE_1 \parallel CP$. Dari fakta ini, diperoleh

$$\angle EBE_1 = \angle EBP = \angle ECP = \angle AEE_1 = \angle P_1EE_1 = \angle P_1PE_1 \implies BE \parallel PP_1$$

□