

Matematyka

Bartosz Świst

2025-02-25

Rozdział 1


Geometria

Definicja. *Symetralna odcinka to prosta prostopadła do odcinka dzieląca go na dwie równe części.*

Twierdzenie 1. *Symetralna odcinka jest zbiorem punktów płaszczyzny równoodległych od końców tego odcinka.*

Definicja. *Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta dzieląca go na dwa kąty równe.*

Twierdzenie 2. *Dwusieczną kąta wypukłego jest zbiór punktów równoodległych od ramion tego kąta.*



$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = \gamma_1 \\ \beta_1 = \delta_1 \\ \alpha_2 = \gamma_2 \\ \beta_2 = \delta_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kąty} \\ \text{wierzchołkowe} \end{array} \quad (1.1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = \alpha_2 \\ \beta_1 = \beta_2 \\ \gamma_1 = \gamma_2 \\ \delta_1 = \delta_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kąty} \\ \text{odpowiadające} \end{array} \quad (1.2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_2 = \gamma_1 \\ \delta_2 = \beta_1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kąty naprzemianległe} \\ \text{wewnętrzne} \end{array} \quad (1.3)$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = \gamma_2 \\ \delta_1 = \beta_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{kąty naprzemianległe} \\ \text{zewewnętrzne} \end{array} \quad (1.4)$$

Twierdzenie 3 (Twierdzenie Talesa).

1.1 Geometria trójkątów

Twierdzenie 4 (Twierdzenie Pitagorasa). *Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych.*

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (1.5)$$

Twierdzenie 5. *W dowolnym trójkącie odcinek łączący środki dwóch boków jest równoległy do boku trzeciego i jego długość jest równa połowie długości boku trzeciego.*

$$\begin{aligned} DE &\parallel AB \\ |DE| &= \frac{1}{2}|AB| \end{aligned} \quad (1.6)$$

Twierdzenie 6 (Twierdzenie sinusów). *W dowolnym trójkącie iloraz długości dowolnego boku i sinusa kąta naprzeciw tego boku jest stały i równy długości średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie.*

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \quad (1.7)$$

Twierdzenie 7 (Twierdzenie cosinusów). *W dowolnym trójkącie kwadrat długości dowolnego boku jest równy różnicy sum kwadratów długości dwóch pozostałych boków oraz iloczynu tych długości i cosinusa kąta zawartego między tymi bokami.*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (1.8)$$

Definicja. *Wysokością trójkąta* nazywamy odcinek łączący wierzchołek z prostą zawierającą przeciwległy bok.

Twierdzenie 8. *W dowolnym trójkącie wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie. Ten punkt to **ortocentrum**.*

Definicja. *Środkową trójkąta* nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.

Twierdzenie 9. *W dowolnym trójkącie jego środkowe przecinają się w jednym punkcie, który dzieli każdą z nich w stosunku 1:2. Ten punkt to **środek ciężkości trójkąta**.*

Twierdzenie 10. *W dowolnym trójkącie dwusieczna kąta dzieli przeciwległy bok na odcinki, których długość jest proporcjonalna do długości pozostałych boków.*

$$\frac{|AC|}{|CD|} = \frac{|AB|}{|BD|} \quad (1.9)$$

Twierdzenie 11. *Środek okręgu **opisanego** na danym trójkącie jest punktem przecięcia **symetralnych** boków trójkąta.*

Twierdzenie 12. *Środek okręgu **wpisanego** w dany trójkąt jest punktem przecięcia **dwusiecznych** kątów trójkąta.*

1.1.1 Wzory na pole trójkąta

$$P = \frac{1}{2}ah \quad (1.10a)$$

$$P = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \quad (1.10b)$$

$$P = \frac{abc}{4R} \quad (1.10c)$$

$$P = \frac{1}{2}Lr \quad (1.10d)$$

$$P = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{gdzie: } p = \frac{a+b+c}{2} \quad (1.10e)$$

1.2 Geometria okręgów

Twierdzenie 13. *Jeżeli przez punkt P , którego odległość od środka danego okręgu jest większa niż promień, poprowadzimy styczną do okręgu w punkcie A i sieczną przecinającą okrąg w punktach B i C , to:*

$$|PA|^2 = |PB| \cdot |PC| \quad (1.11a)$$

Twierdzenie 14. *Jeżeli dwie proste przetną okrąg odpowiednio w punktach A i B oraz C i D , a także przecinają się w punkcie P , którego odległość od środka danego okręgu jest większa niż promień, to:*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \quad (1.11b)$$

Twierdzenie 15. *Jeżeli cięciwy AB i CD okręgu przecinają się w punkcie P , to:*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \quad (1.11c)$$

1.3 Geometria czworokątów

Twierdzenie 16. *Środek okręgu **opisanego** na czworokącie jest punktem przecięcia się jego symetralnych.*

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ \quad (1.12)$$

Twierdzenie 17. *Środek okręgu **wpisanego** w czworokąt jest punktem przecięcia się dwusiecznych jego kątów.*


$$\left. \begin{array}{l} |AD| + |BC| = w + x + y + z \\ |AB| + |CD| = w + x + y + z \end{array} \right\} \Rightarrow |AD| + |BC| = |AB| + |CD| \quad (1.13)$$

1.3.1 Wzór na pole dla dowolnego czworokąta

$$P = \frac{1}{2}ef \sin \gamma \quad (1.14)$$

1.4 Szczególne figury geometryczne

1.4.1 Trójkąt prostokątny




$$h = \sqrt{c_1 \cdot c_2} \quad (1.15a)$$

$$s = \frac{1}{2}c \quad (1.15b)$$

$$r = \frac{a + b - c}{2} \quad (1.15c)$$

1.4.2 Trójkąt równoboczny




$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad (1.16a)$$

$$s = h \quad (1.16b)$$

$$r = \frac{1}{3}h = \frac{a\sqrt{3}}{6} \quad (1.16c)$$

$$r + R = h \quad (1.16d)$$

1.4.3 Kwadrat




$$P = a^2 = \frac{d^2}{2} \quad (1.17a)$$

$$R = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}a\sqrt{2} \quad (1.17b)$$


$$r = \frac{1}{2}a \quad (1.17c)$$

1.4.4 Prostokąt




$$P = ab = \frac{1}{2}d^2 \sin \gamma \quad (1.18)$$

1.4.5 Romb




$$P = ah = a^2 \sin \alpha = \frac{ef}{2} \quad (1.19)$$

1.4.6 Równoległobok




$$P = ah_a = ab \sin \alpha \quad (1.20)$$

1.4.7 Trapez




$$P = \frac{(a + b) \cdot h}{2} \quad (1.21)$$

1.4.8 Trapez równoramienny




1.4.9 Deltoid



Rozdział 2

Trygonometria



$$\sin \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\cos \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{a}{b}$$

(2.1)

	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-
$\operatorname{ctg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

2.1 Zależności trygonometryczne

$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{ctg} \alpha \\ \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{tg} \alpha\end{aligned}\tag{2.2}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \\ \operatorname{ctg} \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}\end{aligned}\tag{2.3}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1\tag{2.4a}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1\tag{2.4b}$$

2.2 Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

