

## Worksheet 6

1

(a)

no

(b)

yes, significant amount of inherent uncertainty.

(c)

no

(d)

yes, significant amount of inherent uncertainty.

2

(a)

$$P_r(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(w \cdot x + b)}} = 1/2$$

$$e^{-(w \cdot x + b)} = 1$$

$$w \cdot x + b = 0$$

$$x = \frac{-b}{w}$$

(b)

$$P_r(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(w \cdot x + b)}} = 3/4$$

$$e^{-(w \cdot x + b)} = \frac{1}{3}$$

$$w \cdot x + b = -\ln \frac{1}{3} = \ln 3 - \ln 1$$

$$x = (\ln 3 - \ln 1 - b)/w$$

(c)

$$P_r(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(w \cdot x + b)}} = 1/4$$

$$e^{-(w \cdot x + b)} = 3$$

$$-(w \cdot x + b) = \ln 3$$

$$x = -(\ln 3 + b)/w$$

## Worksheet 7

3

(a)

$$\frac{dL(w)}{dw_1} = 2w_1 + 2$$

$$\frac{dL(w)}{dw_2} = 4w_2 - 4$$

$$\frac{dL(w)}{dw_3} = 2w_3 - 2w_4$$

$$\frac{dL(w)}{dw_4} = -2w_3 + 2w_4$$

$$\nabla L(w) = \begin{pmatrix} 2w_1 + 2 \\ 4w_2 - 4 \\ 2w_3 - 2w_4 \\ 2w_4 - 2w_3 \end{pmatrix}$$

(b)

$$w = (0, 0, 0, 0)$$

$$\frac{dL(w)}{dw_1} = 2w_1 + 2 = 2$$

$$\frac{dL(w)}{dw_2} = 4w_2 - 4 = -4$$

$$\frac{dL(w)}{dw_3} = 2w_3 - 2w_4 = 0$$

$$\frac{dL(w)}{dw_4} = -2w_3 + 2w_4 = 0$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta \nabla L(w_t) = (0, 0, 0, 0) - \eta(2, -4, 0, 0) = \eta(-2, 4, 0, 0)$$

(c)

$$\frac{dL(w)}{dw_1} = 2w_1 + 2 = 0$$

$$\frac{dL(w)}{dw_2} = 4w_2 - 4 = 0$$

$$\frac{dL(w)}{dw_3} = 2w_3 - 2w_4 = 0$$

$$\frac{dL(w)}{dw_4} = -2w_3 + 2w_4 = 0$$

$$w = (-1, 1, w_3, w_4), w_3 = w_4$$

$$L(w) = 1$$

(d)

No, there is no unique solution  $w$  at which this minimum is realized.

4

(a)

$$\nabla L(w) = -2 \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - w \cdot x^{(i)}) x^{(i)} + 2\lambda w$$

(b)

$$\begin{aligned} w_{t+1} &= w_t - \eta_t \sum_{i=1}^n \nabla L(w_t; x^{(i)}, y^{(i)}) \\ &= w_t - \eta_t (2 \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - w_t \cdot x^{(i)}) (-x^{(i)}) + 2\lambda w_t) \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} w_{t+1} &= w_t - \eta_t \nabla L(w_t; x, y) \\ &= w_t - \eta_t (2(y^{(i)} - w_t \cdot x^{(i)}) (-x^{(i)}) + 2\lambda w_t) \end{aligned}$$