

PRO TOOL · 外食決策工具

外食補給導航 Pro

到哪裡吃，都知道這一餐下一步該補什麼。

這不是固定菜單。

它是一套幫你在超商、早餐店、便當店、麵店、滷味、火鍋、速食與外送情境中，快速判斷「這餐缺什麼、下一步補什麼」的隨身導航系統。

狀態掃描

缺口雷達

三段導航

收藏備案

可樂吉健康研究所 | 崇銘
老師

《7天嘴饞破關計畫》進階任務
道具

HOW TO USE

這本手冊怎麼用？

先看狀態，再看場景，最後才看食物。

同一份便當，對「午餐幾乎沒吃、現在餓到 9 分」的人，和「今天已經吃很飽、只是嘴饞」的人，導航方向不會一樣。

1 掃描當下狀態

飢餓、疲憊、趕時間、白天補給。

2 選擇外食場景

你現在是在超商、早餐店、便當店，還是外送頁面？

3 用四格法找缺口

蛋白質、蔬菜、主食、飲料。

4 挑一個可做到的版本

最穩版、最省事版、最低限度止損版。

5 吃完做 30 秒回顧

留下常用備案，下次不用重新想。

使用原則：這套工具不追求每餐完美，只追求每次都比原本多一個可執行的選擇。

STEP 01 • STATUS SCAN

出發前狀態掃描

先圈出最接近現在的狀況。

現在多餓？

0-3

只是想吃

4-6

正常餓

7-10

非常餓

現在多累？

0 完全不累 ← → 10 快沒電了

現在有多趕？

0 很有時間 ← → 10 只能快速解決

今天前面吃得怎麼樣？

☐ 早餐幾乎沒吃☐ 午餐吃很少☐ 蛋白質很少☐ 幾乎沒吃菜☐ 水喝很少☐ 今天其實很穩

如果飢餓 ≥ 7 、疲憊 ≥ 7 ，或白天明顯吃太少，這餐優先目標是「吃穩」，不要刻意選得太輕。

NAVIGATION MODES

6 種導航模式

高飢餓模式

避免只吃沙拉、咖啡或小點心。優先補蛋白質＋主食。

高疲憊模式

減少選擇成本，避開靠糖提神。準備固定組合。

趕時間模式

只保留最快可完成的 2-3 個選擇。

晚間止損模式

避免過度限制，先求穩定，降低回家後繼續找食物。

飲料高風險模式

先調杯型、糖度、加料，再處理其他部分。

白天補洞模式

早餐或午餐不足時，優先修補蛋白質、主食與水分。

你可以同時命中兩種模式。

例如「高飢餓＋高疲憊」，系統應優先給你簡單、足夠、可快速買到的組合。

CORE METHOD

外食補給 4 格判讀法

1. 蛋白質

蛋、魚、肉、豆腐、無糖豆漿、乳品等。

作用：幫助飽足感與餐後穩定。

2. 蔬菜

沙拉、燙青菜、菇類、海帶、菜盤。

作用：增加體積感與餐盤完整度。

3. 主食

飯、地瓜、飯糰、麵、冬粉、吐司等。

作用：避免吃太輕後又繼續找食物。

4. 飲料

水、無糖茶、無糖豆漿、無糖咖啡。

作用：減少額外含糖與「越喝越想喝」。

快速檢查

目前狀況	優先補什麼
只有麵包／飯糰	補蛋白質
只有雞胸／茶葉蛋	高飢餓時補主食
整餐都很乾、很鹹	補水或無糖飲
吃完常覺得空	檢查蛋白質與主食是否太少

SCORING

外食穩定分數怎麼看？

86

/ 100

範例：

雞胸＋飯糰＋沙拉＋無糖茶

項目	分數	判斷
蛋白質	0-30	是否有清楚的一份蛋白質
蔬菜	0-25	是否有一份以上蔬菜
主食	0-20	依飢餓與白天補給判斷
飲料	0-15	水／無糖優先
情境適配	0-10	是否符合你當下狀態

0-49缺口較多
先補一項**50-74**有基礎
再修一項**75-100**相對穩定
可收藏

分數是決策輔助，不是營養診斷，也不代表一餐的「好壞」。它的用途是幫你看見下一步最值得調整的地方。

SCENE 01

超商導航

場景特性

便利、選擇多，也最容易被甜點與飲料帶走。

蛋白質

茶葉蛋／雞胸／無糖豆漿

主食

飯糰／地瓜

蔬菜

沙拉／關東煮蔬菜

飲料

水／無糖茶

最省事導航

飯糰＋無糖豆漿

常見踩雷組合

只買麵包＋奶茶

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 02

早餐店導航

場景特性

常見問題是主食多、蛋白質不足，飲料又偏甜。

蛋白質

蛋／雞肉／鮪魚／無糖豆漿

主食

吐司／蛋餅／饅頭

蔬菜

生菜／小黃瓜／玉米蛋餅中的蔬菜

飲料

無糖豆漿／無糖茶

最省事導航

蛋餅＋無糖豆漿

常見踩雷組合

奶茶＋蘿蔔糕單吃

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 03

便當店導航

場景特性

最容易快速完成一餐，但配菜與主菜選擇差異很大。

蛋白質

雞腿／魚／滷肉之外再加蛋或豆腐

主食

飯半碗到一碗

蔬菜

至少 2 格青菜

飲料

水／無糖茶

最省事導航

主菜＋2 菜＋飯

常見踩雷組合

只吃菜、不吃主食後晚上又餓

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 04

自助餐導航

場景特性

自由度高，也最容易不小心全部選成同一類。

蛋白質

魚／肉／蛋／豆腐

主食

飯／地瓜

蔬菜

至少 2 種蔬菜

飲料

清湯／水

最省事導航

1 主菜 + 2 菜 + 飯

常見踩雷組合

炸物多、醬汁多、飯又完全不吃

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 05

麵店導航

場景特性

一碗麵通常主食充足，缺口常在蛋白質與蔬菜。

蛋白質

滷蛋／豆干／肉片／餛飩

主食

麵本身

蔬菜

燙青菜／海帶／菇類

飲料

水／無糖茶

最省事導航

麵＋燙青菜＋蛋

常見踩雷組合

只有乾麵＋含糖飲

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 06

滷味導航

場景特性

可以很完整，也可能變成全是加工品或高鹽。

蛋白質

豆腐／蛋／肉片

主食

冬粉／麵／玉米

蔬菜

青菜／菇類／海帶

飲料

水

最省事導航

蛋白質＋2 菜＋主食

常見踩雷組合

全部選丸子、甜不辣、王子麵

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 07

火鍋導航

場景特性

最容易建立完整餐盤，也容易被醬料、飲料、加工料拉高負擔。

蛋白質

肉片／魚／豆腐

主食

飯／冬粉／麵

蔬菜

菜盤

飲料

水／無糖茶

最省事導航

肉＋菜盤＋主食

常見踩雷組合

只吃肉不吃主食，回家後又找零食

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 08

速食店導航

場景特性

不用追求完美，先處理份量、飲料與加點方式。

蛋白質

漢堡主餐／烤雞

主食

麵包／薯類

蔬菜

沙拉可加分

飲料

無糖茶／水

最省事導航

單份主餐＋無糖飲

常見踩雷組合

套餐加大＋含糖飲＋甜點

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 09

外送導航

場景特性

最大風險不是食物本身，而是選擇過多與加購誘惑。

蛋白質

主餐中的肉魚蛋豆

主食

飯／麵

蔬菜

加青菜或沙拉

飲料

水／無糖飲

最省事導航

固定收藏 3 家穩定店家

常見踩雷組合

邊餓邊滑太久，最後一次點很多

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

SCENE 10

咖啡店／下午茶導航

場景特性

常見問題是把飲料當補給，卻沒有真正吃到東西。

蛋白質

優格／蛋／起司／牛奶類

主食

三明治／吐司

蔬菜

沙拉或水果少量

飲料

無糖咖啡／茶

最省事導航

三明治＋無糖拿鐵

常見踩雷組合

甜咖啡＋蛋糕當一餐

最小修正：不要整餐重來。先補最明顯的缺口，就能讓這餐更穩。

快速備忘：先找一份蛋白質，再看你現在的飢餓程度決定主食要不要保留，最後把飲料盡量換成水或無糖。

我的備案： _____

THREE ROUTES

同一個場景，給自己 3 個版本

A. 最穩版本

有時間、有選擇時使用。四格盡量完整。

例：雞胸＋飯糰＋沙拉＋無糖茶

B. 最省事版本

忙、累、懶得想時使用。保留最重要的兩到三格。

例：茶葉蛋 2 顆＋地瓜＋無糖豆漿

C. 最低限度止損版本

真的很趕、選擇少時使用。先避免只靠甜飲或零食撐。

例：飯糰＋無糖豆漿

最重要的不是永遠選 A，而是你在不同狀態下，都有一個不需要重新思考的版本。

COMMON TRAPS

常見「看起來還好」的踩雷組合

組合	常見問題	最小修正
沙拉＋咖啡	高飢餓時太輕	加蛋白質＋主食
麵包＋奶茶	蛋白質不足、飲料偏甜	改無糖豆漿＋加蛋
泡麵＋含糖飲	蔬菜不足、飲料風險高	加蛋／豆腐＋青菜＋換無糖
只吃肉、不吃主食	白天吃少時晚間可能繼續找食物	保留適量主食
堅果＋果汁當一餐	份量難抓、飽足不一定穩	補完整餐食或乳品蛋白質

判斷原則：不要問「這能不能吃？」先問「這餐現在最缺哪一格？」

MINIMUM FIX

最小修正法：一次只改一件事

只有主食

加蛋、豆漿、雞胸、豆腐或肉類。

只有蛋白質

高飢餓／白天吃少時，加地瓜、飯或麵。

飲料太甜

先縮小杯、降糖、拿掉加料。

幾乎沒菜

下一餐補，不用為一餐過度焦慮。

我的今天最小修正

今天不用完美，只要比原本多一個穩定選擇。

AFTER MEAL

吃完 30 秒回顧

把導航變成可重複使用的經驗。

我最後吃了什麼？

飽足感

0 1 2 3 4 5

吃完精神

更累／差不多／更穩

還想找東西吃？

沒有／一點／很強

這組合要收藏嗎？

☐ 要 ☐ 不要

如果同一組合連續 2-3 次都讓你覺得穩，就把它收進「我的常用導航」。

FAVORITES

我的常用外食收藏

情境	我的固定組合	備註
加班超商晚餐		
早餐店快速版		
超餓止損版		
晚間 9 點版		
飲料替換版		

收藏原則

只收藏你真的買得到、吃得下、願意重複的組合。

先建立 3 組固定備案：最忙時的超商版、最容易失控的晚餐版、最常出現的外送版。

WEEKLY REVIEW

一週外食導航回顧

本週最常出現的場景

最常缺少的一格

最成功的一組備案

下週只想先改善一件事

把「我又吃不好了」改成「我這週最常缺哪一格？」你會比較容易找到真正能調整的地方。

這週我最想複製的一次成功選擇：_____

7-DAY PRACTICE

7 天外食導航練習

日	今天的場景	最大缺口	最小修正
D1			
D2			
D3			
D4			
D5			
D6			
D7			

目標：7 天後，不是背下所有食物，而是更快看出「這餐缺什麼」。

練習提醒：每天只記一餐也可以，重點不是寫很多，而是慢慢建立「先看缺口再決定」的習慣。

FINAL MAP

我的外食補給導航卡

我最常遇到的 3 個場景

我最容易出現的缺口

我的 3 組不用思考備案

我的下一步

你要建立的不是完美菜單，而是能在忙亂生活裡反覆使用的選擇。

IMPORTANT NOTE

使用提醒

這套工具屬於一般健康教育與自我觀察用途。
它不能取代醫療診斷、營養治療或心理治療。

若你有以下情況，請優先尋求醫師、營養師、心理師或其他合格專業人員協助：

- 已確診飲食疾患或暴食症
- 嚴重焦慮、憂鬱或情緒困擾
- 懷孕、哺乳或有特殊疾病
- 正在接受藥物、代謝或腸胃相關治療

最後留給你一句話

外食不需要每次都選到最好。
先學會在當下，做一個比原本更穩的選擇。