

嘴饞快失控時立即使用

10 分鐘嘴饞 急救流程卡

當你已經很想吃、很想喝、很想叫外送，甚至已經站在冰箱或零食櫃前時，請先照著這張流程卡做 10 分鐘，再決定下一步。

我可以想吃，但我不用立刻吃。

這張卡的任務只有一個

先在衝動和行動之間，插入一個暫停鍵。它不是叫你完全不能吃，而是幫你從「自動失控」變成「有意識地選擇」。

什麼時候打開它？

- 已經想打開外送 App
- 已經想走去買手搖飲
- 晚餐後明明不餓，還是很想找東西吃
- 壓力很大、很累，想用食物放鬆
- 睡前特別想吃甜的或鹹的

先記住一件事

你現在不需要立刻戰勝嘴饞，也不需要逼自己完美。你只需要先延遲 10 分鐘。

為什麼延遲 10 分鐘有效？

- 很多衝動如果沒有立刻被滿足，強度會自然下降。
- 喝水、呼吸、換動作，可以幫身體先降速。
- 當你不再用自動反應處理嘴饞，就比較有機會做出穩定的選擇。

不用先問「我可不可以吃」，先問「我能不能多等 10 分鐘」。

使用原則

- 先做流程，再決定要不要吃。
- 10 分鐘後如果還想吃，不代表你失敗。
- 如果最後決定要吃，也請選比較不容易失控的版本。

10 分鐘急救流程

0-1 分鐘

停下來

先不要打開外送、冰箱、零食櫃，也不要立刻走去買飲料。
只要先停 60 秒。

1-2 分鐘

喝 300ml 水

你可能不是餓，而是渴、累，或想放鬆。先讓身體收到被照顧的訊號。

2-3 分鐘

深呼吸 5 次

吸氣 4 秒，吐氣 6 秒，連續做 5 次，讓身體先降速。

3-5 分鐘

辨認狀態

我現在比較像是：真餓、壓力、疲憊、委屈、無聊、想喝飲料，還是想獎勵自己？

5-8 分鐘

換一個動作

先做一個非食物行動 3 分鐘，例如走路、刷牙、泡熱茶、洗澡、寫下情緒、離開零食旁邊。

8-10 分鐘

再決定

10 分鐘後如果還想吃，可以吃，但請先選比較不容易失控的版本。

如果 10 分鐘後還想吃

這不代表你失敗。代表你已經從「自動失控」變成「有意識地選擇」。

現在的狀態	建議選擇
真的餓	請選正常正餐，或蛋白質＋水，不要硬忍到下一波失控。
想喝飲料	先降糖、不加料、改小杯，或改成無糖茶、無糖拿鐵。
想吃甜	優格、水果、少量黑巧克力，先不要直接開吃一整包餅乾。
想吃鹹	毛豆、海苔、滷味安全選項，避免直接配劇吃零食。
想叫外送	先選主餐，不加點飲料和甜點，讓這一餐回到正常吃飯。
其實只是想放鬆	洗澡、泡熱茶、走路、伸展，先讓身體放鬆再決定要不要吃。

安全提醒

急救流程不是逼你完全禁止，而是幫你將損失降到比較小、把選擇拉回你手上。

急救後紀錄表

今天幾點使用急救流程？

我原本想吃或想喝什麼？

我做了哪幾步？

 停下來

 喝 300ml 水

 深呼吸 5 次

 辨認現在狀態

 做了一個非食物動作

10 分鐘後，嘴饞有下降嗎？

 有下降

 一點點

 沒有明顯下降

最後我怎麼選？

我想給自己的提醒

下一步：找出更深層原因

如果你發現自己很常需要用到這張急救流程卡，代表嘴饞背後可能不只是想吃而已。它也可能跟壓力、睡眠、外食、水量不足、營養缺口或情緒累積有關。

這個連結會自動判斷你的狀態

如果你已經加購 **1 元 AI 能量減脂初評**，點擊下方按鈕後，系統會直接帶你進入領取與後續聯繫頁面。

如果你尚未加購，點擊後會先進入加購頁，完成後就可以開始測驗。

前往 AI 能量減脂初評

用更完整的方式，看懂你為什麼總在同一個時間嘴饞、喝飲料或失控。

[立即前往測驗入口](#)

免責聲明

本工具僅供一般健康教育與自我觀察使用，不能取代醫療診斷與治療。若你有特殊疾病、飲食疾患或情緒困擾，請優先尋求專業醫療協助。