

嘴饞當下可使用的 3 分鐘覺察工具

嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本

在吃之前，先聽懂身體真正想說什麼。用 3 分鐘分辨：你現在是真的餓、情緒想吃、身體太累，還是只是想放鬆。

下班後嘴饞

含糖飲料衝動

壓力想吃

手機閱讀友善

這不是叫你忍住。

這份工作本的目的，是在自動吃下去之前，幫你多一個覺察與選擇。

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師

嘴饞出現時，先不要急著判斷自己

很多人一嘴饞，腦中會立刻出現兩種聲音：

「不可以吃。」

靠意志力硬壓，最後可能反彈。

「算了，吃吧。」

衝動過去後，又開始後悔。

這份工作本想提供第三個選項：

我先停 3 分鐘，看懂現在真正需要的是什麼。

什麼時候可以用？

- 下班後突然想買零食。
- 晚餐後明明不餓，還想找東西吃。
- 下午很想喝手搖飲、奶茶或含糖咖啡。
- 壓力大、很累、心情悶時想叫外送。
- 睡前想打開冰箱或外送 App。

S.E.C. 三步驟：停一下、看一下、選一下

當嘴饞剛出現時，你不需要立刻決定「能不能吃」。先照著下面三步做。

S Stop 停一下

中斷自動反應。不急著下單、不急著打開冰箱、不急著拿食物。

E Examine 看一下

檢查身體、情緒、疲憊、壓力、飢餓程度，先弄清楚自己真正的訊號。

C Choose 選一下

根據真正需求，選擇吃、喝、休息、補水、放鬆，或啟動 10 分鐘急救流程。

重要提醒

這個流程不是要你每次都不能吃，而是讓你從「自動反應」變成「有意識地選擇」。

3 分鐘和 10 分鐘流程差在哪？

工具	使用時機	功能
3 分鐘身心連結	嘴饞剛出現	分辨真正需求
10 分鐘急救流程	快要失控時	延遲衝動、降低失控

第 1 分鐘：停下來，回到身體

當你很想吃東西或喝飲料時，先不要急著判斷自己可不可以吃。請先停下來 30 秒，問自己：

我現在的身體正在發出什麼訊號？

請做 3 件事

- 1 放下手機、外送 App 或手上的食物。
- 2 慢慢吸氣 4 秒、吐氣 6 秒，重複 3 次。
- 3 把注意力放回身體，不急著做決定。

今天的小練習

嘴饞出現時，不要先罵自己。先把手放在胸口或腹部，感覺身體現在是緊、空、累，還是悶。

身體掃描表

請用 30 秒快速掃描身體。你不用分析得很精準，只要先看見訊號。

☐ 胃：空、脹、緊、沒感覺

☐ 胸口：緊、悶、放鬆、沒感覺

☐ 肩頸：緊繃、痠、放鬆

☐ 頭腦：混亂、很累、清楚

☐ 嘴巴：想咬東西、想喝甜的、沒特別感覺

☐ 全身能量：很低、普通、還可以

0 到 10 分快速圈選

身體飢餓程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

嘴巴想吃程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全身疲憊程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

第 2 分鐘：辨識情緒與需求

很多嘴饞，表面是想吃，底下可能是壓力、疲憊、委屈、無聊，或需要被安慰。

如果食物先不出現，我真正想要的是什麼？

我現在比較像是

☐ 壓力太大

☐ 很疲憊

☐ 心情委屈

☐ 有點焦慮

☐ 很無聊

☐ 想獎勵自己

☐ 想被安慰

☐ 真的餓

☐ 喝飲料成習慣

☐ 不確定

情緒與需求檢查表

請圈選或記下分數。這一頁是讓你分辨：現在是身體餓，還是情緒需要出口。

壓力程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

疲憊程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

情緒需要被安慰的程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

想喝含糖飲料的程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

如果不靠食物或飲料，我真正想得到的是：

第 3 分鐘：做出下一個選擇

你可以吃，也可以不吃。但在做決定前，先讓自己多一個選擇。

如果我真正需要的是	我可以先做
壓力釋放	深呼吸、走路 3 分鐘、洗澡、寫下煩惱。
休息	躺 10 分鐘、提早睡、泡熱茶。
安慰	傳訊息給信任的人、抱抱自己、聽音樂。
放鬆	泡腳、香氛、伸展、看一集劇但不配零食。
補水	喝 300ml 水，10 分鐘後再決定。
真的餓	選擇安全食物或正常正餐。
想喝飲料	先降糖、拿掉加料、改小杯或先喝水。
嘴巴無聊	刷牙、嚼無糖口香糖、整理桌面。

關鍵句

我可以想吃，但我不用立刻吃。我可以先做一個比較照顧自己的選擇。

含糖飲料衝動檢查表

很多人戒不掉飲料，不只是因為甜，而是飲料已經變成提神、放鬆、獎勵自己的儀式。

我現在想喝什麼？

我想喝的原因：

☐ 提神

☐ 放鬆

☐ 壓力

☐ 獎勵

☐ 習慣

☐ 口渴

喝之前先問 5 個問題

- 我現在是真的渴，還是想放鬆？
- 我今天水喝夠了嗎？
- 我是想喝甜的，還是想要儀式感？
- 我可以糖度降一階嗎？
- 我可以先喝 300ml 水，10 分鐘後再決定嗎？

嘴饞前 3 分鐘紀錄表

這一頁可以重複使用。你不需要每天填很多次，先從一天一次開始就好。

日期 / 時間：

我現在想吃或想喝什麼？

我現在在哪裡？

嘴饞出現前，我正在做什麼？

我現在最接近哪一種狀態？

☐ 真餓

☐ 壓力

☐ 疲憊

☐ 委屈

☐ 無聊

☐ 想喝飲料

我決定先做哪一個行動？

3 分鐘後，嘴饞有變化嗎？

☐ 降低

☐ 一樣

☐ 更強

一週練習追蹤表

這不是考核表，只是幫你看見「我有沒有在衝動前多停一下」。

日期	有使用 3 分鐘流程嗎？	主要狀態	我學到什麼
Day 1	☐ 有 ☐ 無		
Day 2	☐ 有 ☐ 無		
Day 3	☐ 有 ☐ 無		
Day 4	☐ 有 ☐ 無		
Day 5	☐ 有 ☐ 無		
Day 6	☐ 有 ☐ 無		
Day 7	☐ 有 ☐ 無		

一週後回顧

我最常在什麼情境下嘴饞？

哪一個方法對我最有幫助？

我下一步想先調整什麼？

手機流程卡

這一頁可以截圖存到手機。嘴饞時，不用打開整份 PDF，直接照著做就好。

嘴饞前 3 分鐘

1 停一下

先不要下單、不要打開冰箱。深呼吸 3 次。

2 看一下

我現在是：真餓 / 壓力 / 疲憊 / 委屈 / 無聊 / 想喝飲料 / 想放鬆。

3 選一下

我可以先喝水、走路 3 分鐘、泡熱茶、寫下情緒、洗澡，或啟動 10 分鐘急救流程。

我可以想吃，但我不用立刻吃。

如何搭配其他工具使用？

這份工作本不是單獨存在，它是整套「下班後嘴饞止損包」裡的即時覺察工具。

工具	建議使用順序
情緒性進食 6 型測驗	先知道自己是哪一種嘴饞模式。
嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本	嘴饞當下使用，分辨身體與情緒訊號。
7 天嘴饞止損行動手冊	用 7 天建立穩定的觀察與調整流程。
10 分鐘嘴饞急救流程	快失控時用來延遲衝動、降低失控機率。
AI 能量減脂初評	想找更深層原因時，再進一步使用。

建議做法

先完成 6 型測驗，再把這份 3 分鐘工作本存到手機。接著搭配 7 天手冊，每天記錄一個最明顯的嘴饞情境。

如果你想找更深層原因

嘴饞有時候只是表面訊號。背後可能還和壓力、睡眠、外食習慣、營養缺口、水量不足與身心狀態有關。

AI 能量減脂初評

如果你已經用 1 元加購 AI 減脂測驗，點擊下方連結即可進入測驗領取與聯繫頁面。

如果你尚未加購，系統會引導你進入加購頁面，完成後即可開始。

[前往 AI 能量減脂初評](#)

使用提醒

你不需要把所有問題一次解決。先從最常出現的一個嘴饞情境開始，這樣最容易持續。

免責聲明與最後提醒

本工作本內容僅作為一般健康教育、自我觀察與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。

若你有特殊疾病、懷孕、正在服藥、疑似飲食疾患、暴食症、嚴重焦慮或憂鬱狀況，請優先諮詢合格醫療專業人員。

給你的最後提醒

你不需要每次都完美控制。你只需要在衝動出現前，多停一下，看一下，再選一下。

當你願意聽懂身體和情緒的訊號，減脂就不再只是硬撐。

可樂吉健康研究所

崇銘老師

陪你從情緒、外食、作息與營養缺口，找到更適合自己的減脂方式。