

手機友善閱讀版

7 天行動工作本

# 7 天嘴饞 止損行動手冊

## 情緒性進食 + 含糖飲料重置計畫

給明明知道要減重，卻總是在下班後、壓力大、晚餐後、睡前忍不住吃零食、喝手搖飲的人。

這份手冊會陪你做三件事：

- ☐ 看懂自己為什麼會嘴饞
- ☐ 找出含糖飲料戒不掉的觸發點
- ☐ 建立一套不靠硬忍的 10 分鐘止損流程

本手冊為一般健康教育與自我觀察工具，不能取代醫療診斷或治療。

# 開始前，先給你一個提醒

**你不是要變成完全不嘴饞的人，  
你只是要在失控前，多一個選擇。**

這份手冊的目標，不是叫你完全不能吃零食，也不是要求你馬上戒掉所有含糖飲料。

我們先做一件更重要的事：看懂嘴饞背後的訊號。你會透過 7 天的記錄與練習，找出自己最容易嘴饞的時間、情緒、場景、飲料習慣與營養缺口。

如果你目前有疑似暴食症、飲食疾患、嚴重焦慮、憂鬱，或正在接受醫療治療，請優先尋求醫師、心理師、營養師或合格醫療專業協助。本手冊僅作為一般健康教育與自我觀察工具。

## 這份手冊怎麼使用？

### 每天只需要 5-10 分鐘

#### 1 看完當天簡短說明

先理解今天要觀察什麼。

#### 2 填寫當天表格

不用完美，只要誠實記錄。

#### 3 做一個小行動

讓身體和生活開始有一點點改變。

## 這 7 天不是要你完全不破功

重點是讓你開始知道：我通常什麼時候最想吃？想吃之前發生了什麼？我是身體餓、情緒累，還是白天營養沒補夠？

# 目錄

- 1 使用前提醒與使用方式
- 2 開始前：嘴饞狀態盤點表
- 3 Day 1：我是真的餓，還是想放鬆？
- 4 Day 2：找出我的嘴饞觸發點
- 5 Day 3：含糖飲料為什麼戒不掉？
- 6 Day 4：建立 10 分鐘嘴饞急救流程
- 7 Day 5：白天營養缺口檢查
- 8 Day 6：下班後防暴食晚餐公式
- 9 Day 7：我的個人嘴饞止損計畫
- 10 完成後：下一步怎麼做
- 11 附錄：安全零食與飲料替換清單
- 12 附錄：7 天總紀錄與前後對照

## 這份手冊適合誰？

如果你勾選 3 項以上，建議你完整執行這 7 天。

- ☐ 下班後特別想吃零食
- ☐ 晚餐後明明不餓，還是想找東西吃
- ☐ 壓力大時會想吃甜食、炸物、宵夜
- ☐ 每天都想喝手搖飲、奶茶、含糖咖啡
- ☐ 白天吃很少，晚上卻容易失控
- ☐ 常常靠意志力撐幾天，最後又回到原本習慣
- ☐ 想知道自己嘴饞背後真正的原因

# 開始前：嘴饞狀態盤點

## A. 我的嘴饞頻率

我一週大概幾天會在下班後或晚上嘴饞？

---

我一週大概喝幾杯含糖飲料？

---

我最容易嘴饞的時間

☐ 下午

☐ 下班後

☐ 晚餐後

☐ 睡前

☐ 半夜

我最常想吃或想喝

☐ 甜食

☐ 炸物

☐ 餅乾零食

☐ 宵夜

☐ 手搖飲

☐ 含糖咖啡

☐ 其他

## B. 我的目前狀態打分數

0 分代表完全沒有，10 分代表非常強烈。

### 下班後嘴饞程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---

### 含糖飲料依賴程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---

### 壓力程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---

### 疲憊程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---

### 晚餐後想吃東西的程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---

### 對自己飲食失控的挫折感

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## DAY 1

# 我是真的餓，還是想放鬆？

**今日目標** 分辨身體飢餓和情緒嘴饞。

很多人晚上想吃東西，當下會覺得自己很餓。但仔細觀察會發現，有時候想吃的不是一份正餐，而是甜食、零食、飲料或炸物。

### 身體飢餓

### 情緒嘴饞

什麼食物都可以接受

特別想吃某一種食物

慢慢變餓

突然很想吃

吃正餐會滿足

吃完還想繼續找東西

胃有空的感覺

嘴巴、心情、腦袋想吃



## Day 1 填寫表

現在時間

我現在想吃或想喝什麼？

我現在胃的飢餓程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

我現在壓力程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

我現在疲憊程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

我現在想放鬆程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

如果現在有一份正常正餐，我會想吃嗎？

☐ 會

☐ 不會

☐ 不確定

我是比較想要

☐ 食物

☐ 放鬆

☐ 情緒安慰

☐ 嘴巴無聊

☐ 不確定

我最後吃了或喝了什麼？

吃完或喝完後的感覺

☐ 滿足

☐ 放鬆

☐ 內疚

☐ 更想吃

☐ 沒感覺

今天只問自己一句：  
我現在是真的餓，還是想放鬆？

## DAY 2

# 找出我的嘴饞觸發點

**今日目標** 找出嘴饞發生之前，通常發生了什麼事。

嘴饞通常不是隨機發生的，它常常跟時間、地點、情緒、壓力、人際互動和習慣有關。

### 壓力型

工作太多、被催、事情做不完。

### 疲憊型

睡不好、下班後腦袋很累。

### 委屈型

覺得自己很辛苦，想用食物補償。

### 營養不足型

白天吃太少，晚餐前已經失控。

## Day 2 填寫表：第 1 次嘴饞事件

發生時間

---

發生地點

---

當時在做什麼？

---

嘴饞前 30 分鐘發生了什麼？

當下情緒

☐ 壓力

☐ 疲憊

☐ 委屈

☐ 無聊

☐ 習慣

☐ 營養不足

☐ 睡眠不足

☐ 其他

想吃或想喝什麼？

---

飢餓程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

壓力程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

疲憊程度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

最後有吃或喝嗎？

☐ 有

☐ 沒有

吃完後感覺

## Day 2 總結

今天我最明顯的觸發點

☐ 壓力

☐ 疲憊

☐ 委屈

☐ 無聊

☐ 習慣

☐ 營養不足

☐ 睡眠不足

☐ 其他

我發現自己最容易在這個時間嘴饞

我發現自己最常因為這個情緒想吃

## DAY 3

# 含糖飲料為什麼戒不掉？

**今日目標** 觀察我喝含糖飲料，是因為想喝，還是因為它已經變成情緒獎勵。

很多人戒不掉手搖飲，不只是因為甜。更常見的是，它已經和某種情境綁在一起：下午累了、工作很煩、今天很辛苦、吃飯沒飲料覺得少了什麼。

**先降糖，不急著戒掉。**

全糖到半糖，半糖到微糖，微糖到無糖；先拿掉加料、奶蓋或大杯，打破「想喝就立刻買」的慣性。

## Day 3 含糖飲料盤點表

今天喝了什麼飲料？

幾分糖？

☐ 全糖

☐ 少糖

☐ 半糖

☐ 微糖

☐ 無糖

有沒有加料？

☐ 珍珠

☐ 椰果

☐ 布丁

☐ 粉粿

☐ 奶蓋

☐ 沒有

幾點喝？

喝之前的情緒是什麼？

喝之前有沒有先喝水？

☐ 有

☐ 沒有

當時更像是

☐ 真的渴

☐ 想放鬆

☐ 想獎勵自己

☐ 下午提神

☐ 習慣

☐ 不確定

喝完後的感覺

☐ 滿足☐ 放鬆☐ 罪惡感☐ 想睡☐ 更想吃

如果明天要降一階，我可以怎麼調整？

## Day 3 飲料降糖計畫

我平常最常喝

明天可以改成

我先選一個調整方向

☐ 糖度降一階☐ 拿掉加料☐ 大杯改中杯☐ 想喝前先喝水☐ 設定固定飲料日



## DAY 4

# 建立 10 分鐘嘴饞急救流程

**今日目標** 在自動失控前，幫自己多一個暫停鍵。

## 10 分鐘嘴饞急救流程

- 1 停下來 30 秒，不要立刻拿食物。
- 2 喝 300ml 水。
- 3 做 5 次深呼吸。
- 4 問自己：我現在餓幾分？
- 5 寫下現在的情緒。
- 6 選一個替代行動。
- 7 10 分鐘後還想吃，就選安全選項。

## 替代行動清單

狀態

可以先做

壓力大

洗澡、走路 5 分鐘、深呼吸、寫下煩惱

很疲憊

泡熱茶、躺 10 分鐘、提早睡

無聊

整理桌面、傳訊息給朋友、看短影片但不配零食

想獎勵自己

聽音樂、擦香氛、泡腳、看一集劇

真的餓

選擇安全食物，不要硬忍

## Day 4 急救紀錄

我今天什麼時候使用急救流程？

---

當時想吃或想喝什麼？

---

我先喝水了嗎？

☐ 有

☐ 沒有

---

我做了幾次深呼吸？

---

我的飢餓程度

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

---

我的情緒是什麼？

---

我選的替代行動

☐ 洗澡

☐ 走路5分鐘

☐ 深呼吸

☐ 寫下情緒

☐ 泡熱茶

☐ 躺10分鐘

☐ 傳訊息

☐ 其他

---

10 分鐘後，嘴饞程度變化

☐ 下降

☐ 一樣

☐ 更強

---

最後我有吃或喝嗎？

☐ 有

☐ 沒有

如果有，我選了什麼？

---

## DAY 5

# 白天營養缺口檢查

**今日目標** 觀察晚上嘴饞，會不會跟白天吃太少、蛋白質不足、水喝太少有關。

很多人以為晚上失控是自己沒自制力。但有時候是身體在補償白天的不足：早餐只有咖啡、午餐只有澱粉、下午靠飲料撐、水喝很少、晚餐前已經餓到沒力氣選擇。

## 白天營養缺口檢查

- ☐ 早餐有吃到蛋白質
- ☐ 午餐有吃到蛋白質
- ☐ 今天有吃到蔬菜
- ☐ 今天水量足夠
- ☐ 下午有靠含糖飲料或咖啡撐精神
- ☐ 晚餐前已經餓到很難控制
- ☐ 今天有吃得太少，晚上才想補回來
- ☐ 今天睡眠不足

## Day 5 詳細紀錄

早餐：我吃了什麼？蛋白質夠嗎？

---

早餐飽足感



---

午餐：我吃了什麼？蛋白質夠嗎？

---

午餐飽足感



---

下午點心/飲料：我吃或喝了什麼？

---

晚餐：我吃了什麼？

---

晚餐後嘴饞程度



## 營養缺口總結

### 今天我最可能的缺口

☐ 早餐蛋白質不足

☐ 午餐蛋白質不足

☐ 水喝太少

☐ 白天吃太少

☐ 下午含糖飲料太多

☐ 睡眠不足

☐ 壓力太高

---

### 明天我最想先補上的一件事

DAY 6

## 下班後防暴食晚餐公式

**今日目標** 建立一套外食族也能用的晚餐公式。

**蛋白質一掌＋蔬菜三拳＋澱粉一拳＋水或無糖飲**

不用完美，只要比原本更穩定。這個公式的目的，是讓你下班後不用靠零食、飲料或宵夜補償自己。

### 外食範例

場景

建議搭配

便當店

主菜選雞肉、魚、瘦肉、豆腐，飯半碗，多青菜。

超商

茶葉蛋＋雞胸＋沙拉＋地瓜或飯糰。

早餐店當晚餐

蛋餅加蛋＋無糖豆漿，避開奶茶、薯餅、鐵板麵加飲料。

速食店

主餐保留，飲料換無糖茶，薯條減量或不加點。

自助餐

先夾蛋白質與菜，再決定飯量。



## Day 6 我的防暴食晚餐設計

我今天晚餐在哪裡吃？

---

我選了什麼主餐？

---

有蛋白質嗎？

☐ 有

☐ 沒有

---

有蔬菜嗎？

☐ 有

☐ 沒有

---

澱粉份量大約多少？

☐ 沒吃

☐ 半碗

☐ 一碗

☐ 超過一碗

---

飲料是什麼？

---

晚餐後 2 小時有嘴饞嗎？

☐ 有

☐ 沒有

---

如果有，想吃什麼？

---

我下次可以怎麼調整？

---

## 我的外食備案清單

店家/類型 1：我可以怎麼點比較穩定？

店家/類型 2：我可以怎麼點比較穩定？

店家/類型 3：我可以怎麼點比較穩定？

DAY 7

## 我的個人嘴饞止損計畫

**今日目標** 把前 6 天的觀察整理成自己的止損計畫。

你不需要變成完全不嘴饞的人。你只需要知道自己什麼時候容易失控、失控前通常有什麼訊號，以及你可以先做什麼。

## 我的嘴饞模式

我最容易嘴饞的時間

---

我最容易嘴饞的地點

---

我最常見的情緒觸發

---

我最常想吃的食物

---

我最常想喝的飲料

---

我最容易忽略的營養缺口

---

我最有效的替代行動

---

我最需要避免的情境

---

## 我的含糖飲料規則

一週最多喝幾杯？

---

糖度限制

---

加料規則

---

什麼情況可以喝？

---

想喝前要先做什麼？

---

替代選項

---

## 我的 10 分鐘急救計畫

想喝手搖飲時，我先做

---

想吃甜食時，我先做

---

想吃炸物時，我先做

---

想叫宵夜時，我先做

---

壓力大想吃時，我先做

---

很累想吃時，我先做

---

## 我的下週行動承諾

- ☐ 每天記錄一次嘴饞時間
- ☐ 想喝飲料前先喝水
- ☐ 含糖飲料糖度降一階
- ☐ 晚餐加入蛋白質
- ☐ 下午先補水，不先喝飲料
- ☐ 睡前使用 10 分鐘急救流程
- ☐ 完成 AI 能量減脂初評
- ☐ 預約一對一諮詢

這 7 天我最大的發現是

我發現自己最需要改善的是

我下一步願意先做的是

## 完成後：下一步怎麼做？

如果你完成這 7 天後，發現自己有以下狀況，那你可能需要的不是更多責備，而是一套更適合你生活的調整方式。

- ☐ 白天吃太少，晚上容易失控
- ☐ 蛋白質明顯不足
- ☐ 外食不知道怎麼選
- ☐ 含糖飲料跟壓力綁在一起
- ☐ 情緒一來就想吃
- ☐ 睡眠差，晚上特別嘴饞
- ☐ 知道問題，但自己很難持續

### 你已經看見自己的模式， 下一步是找出真正卡住的原因

如果你想知道自己更深層的減脂卡關原因，  
可以進入 AI 能量減脂初評頁面。

已用 1 元加購：直接進入測驗領取與聯繫頁面。

尚未加購：會先進入加購頁，完成後即可開始。

[前往 AI 能量減脂初評](#)



## 附錄 1：安全零食與飲料替換清單

### 想吃甜的

原本想吃

可以先換成

蛋糕、甜甜圈

希臘優格、水果一份

巧克力

少量黑巧克力＋無糖茶

餅乾

無糖豆漿＋茶葉蛋

冰淇淋

無糖優格＋莓果

甜麵包

地瓜＋蛋白質

## 想吃鹹的

原本想吃

可以先換成

洋芋片

海苔、毛豆

鹽酥雞

滷味選豆干、海帶、青菜、蛋

炸物

烤雞、滷雞腿、雞胸

泡麵

湯品+蛋+青菜

宵夜

茶葉蛋、無糖豆漿、熱湯

## 想喝飲料

原本想喝

可以先換成

全糖奶茶

微糖鮮奶茶，不加料

珍珠奶茶

無糖拿鐵或無糖豆漿

含糖咖啡

無糖拿鐵、美式

果汁

無糖茶+水果一份

汽水

氣泡水

## 附錄 2：7 天總紀錄表

每天完成後，用這一頁快速回顧。這會幫你看見一週內最常出現的模式。

天數

紀錄

Day 1

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

Day 2

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

Day 3

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

Day 4

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

Day 5

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

Day 6

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

## Day 7

今日嘴饞程度：\_\_\_\_ / 10

有喝含糖飲料嗎？ ☐ 有 ☐ 無

今日最大觸發點：\_\_\_\_\_

今日完成的小行動：\_\_\_\_\_

# 附錄 3：7 天前後對照

## 開始前

下班後嘴饞程度

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

---

含糖飲料依賴程度

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

---

壓力想吃程度

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

---

晚餐後想吃程度

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

---

對飲食失控的挫折感

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

## 7 天後

下班後嘴饞程度



含糖飲料依賴程度



壓力想吃程度



晚餐後想吃程度



對飲食失控的挫折感



這 7 天我有進步的地方

我還想繼續改善的地方

# 健康免責聲明

本手冊內容僅作為一般健康教育、飲食紀錄與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。

若你有特殊疾病、懷孕、正在服藥、疑似飲食疾患、暴食症、嚴重焦慮或憂鬱狀況，請先諮詢合格醫療專業人員。

## 可樂吉健康研究所

### 崇銘老師

謝謝你願意開始觀察自己。  
看懂自己，是改變的第一步。