

7 天飲料降糖重置計畫

7 天含糖飲料 重置表

不靠硬戒，先找出你戒不掉手搖飲、奶茶、含糖咖啡的真正原因。

降糖

減加料

先補水

建立飲料規則

這不是叫你明天開始完全戒飲料。

這份工具會陪你先看懂為什麼想喝，再一步一步降低它對你的控制。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

你戒不掉的可能不是飲料，而是情境

你知道含糖飲料會影響減重，也知道每天一杯手搖飲，可能讓努力變得更難。

可是下午一累、工作一煩、吃飯沒飲料，還是會忍不住想買。

這不一定代表你沒自制力。很多時候，飲料已經跟疲憊、壓力、獎勵感和習慣綁在一起。

這 7 天，我們先做三件事

- 看懂你為什麼想喝。
- 從糖度、加料、水量與替代選項開始調整。
- 建立一套你真的做得到的飲料規則。

重點不是完美戒掉。

重點是讓你從「想喝就立刻買」變成「我知道自己為什麼想喝，也知道可以怎麼選」。

7 天重置流程總覽

天數	任務	目標
Day 1	只記錄，不改變	看見飲料習慣
Day 2	找出觸發點	知道為什麼想喝
Day 3	糖度降一階	降低糖分衝擊
Day 4	拿掉加料	減少隱形負擔
Day 5	想喝前先補水	分辨口渴與嘴饞
Day 6	建立替代清單	多幾個安全選擇
Day 7	設計飲料規則	長期可執行

每天只做一個小任務。

你不需要一次變成只喝水的人，只要比原本更清楚、更穩定。

只記錄，不改變

今天不用戒，也不用改。只要把飲料事件記下來，先讓模式浮現。

Day 1 飲料紀錄

今天喝了什麼飲料？

幾點喝？

幾分糖？

☐ 全糖	☐ 少糖	☐ 半糖	☐ 微糖	☐ 無糖
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

有沒有加料？

☐ 珍珠	☐ 椰果	☐ 布丁	☐ 粉粿	☐ 奶蓋
☐ 沒有				

大小杯？

☐ 大杯	☐ 中杯	☐ 小杯
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Day 1 補充觀察

今天的重點只是觀察，不評價自己做得好不好。

喝之前的情緒

☐ 累	☐ 壓力	☐ 無聊	☐ 想獎勵	☐ 口渴
☐ 習慣				

喝完後的感覺

☐ 滿足	☐ 放鬆	☐ 想睡	☐ 內疚	☐ 更想吃
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

我今天觀察到什麼？

今天不用改變。

先把飲料和情緒、時間、習慣的關係看清楚，明天再開始找觸發點。

找出飲料觸發點

飲料不是突然想喝，通常是某個按鈕被按下。

疲憊型 下午累了

想靠甜或咖啡因提神。

壓力型 工作很煩

想喝一杯放鬆。

獎勵型 今天很辛苦

想犒賞自己。

習慣型 吃飯要配

少了飲料覺得不完整。

社交型 同事揪團

不好意思不跟。

營養不足型 白天吃太少

下午想靠糖撐。

我最容易想喝飲料的時候

☐ 下午 2-5
點

☐ 下班路
上

☐ 吃飯
時

☐ 工作壓力
大

☐ 心情不
好

☐ 同事揪
團

☐ 睡不好很
累

☐ 想犒賞自
己

☐ 口渴但懶得喝
水

☐ 習慣想
喝

這次我最主要的觸發點是：

糖度降一階

不要先要求自己完全戒掉。先把衝擊降下來，就已經是進步。

我平常喝	明天可以改成
全糖	少糖或半糖
半糖	微糖
微糖	無糖
含糖咖啡	無糖拿鐵或美式
奶茶	鮮奶茶微糖或無糖茶

我的降糖設定

我最常喝的飲料

平常糖度

明天我願意降到

我最怕降糖後少了什麼感覺？

提醒：降糖不是失敗的妥協，而是讓身體和習慣慢慢有空間調整。

拿掉最容易爆糖的加料

很多人以為自己只是喝一杯飲料，但真正讓它變重的，常常是加料與大杯。

這週先暫停的加料



今天如果我想喝飲料，我先拿掉：

小技巧

如果完全不加料太難，可以先從「一週只加一次」開始。你不是在否定自己喜歡的東西，而是在把選擇權拿回來。

加料衝動觀察

我最難放下的加料是：

它帶給我的感覺比較像：



想喝前先補水

想喝飲料前，先喝 300ml 水，等 10 分鐘再決定。

有時候你以為自己想喝甜，其實身體只是渴了、累了，或嘴巴想要一點儀式感。

補水後再決定

我幾點想喝飲料？

喝水前想喝程度 0-10

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

我先喝了多少水？

10 分鐘後還想喝嗎？

☐ 想 ☐ 不想 ☐ 降低很多

如果還想喝，我做了什麼調整？

☐ 降糖 ☐ 不加料 ☐ 改小杯 ☐ 改無糖

建立我的替代飲料清單

不要只有「喝」或「不喝」兩個選項。先準備比較安全的選擇。

情境	我的替代選擇
下午想提神	
工作很煩想喝甜	
吃飯想配飲料	
想喝奶茶	
想喝咖啡	
想喝氣泡感	
想要儀式感	

參考選擇

無糖茶、無糖拿鐵、氣泡水、熱茶、黑咖啡、無糖豆漿、無糖茶加正常正餐。

我最想先放進清單的 3 個選擇：

設計我的飲料規則

重點不是永遠不能喝，而是讓規則變得清楚、可執行。

我的飲料規則

一週最多喝幾杯？

糖度上限

加料規則

哪些情況可以喝？

想喝前要先做什麼？

如果今天已經喝了，晚餐怎麼調整？

如果破功，下一步怎麼回穩？

範例

一週最多 2 杯。糖度微糖以下。不加珍珠、奶蓋、布丁。想喝前先喝 300ml 水。如果下午很累，先檢查午餐有沒有吃夠蛋白質。

一週飲料追蹤表

日期	有喝？	糖度	加料	主要觸發點
Day 1	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 2	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 3	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 4	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 5	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 6	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	
Day 7	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無	

這 7 天我有進步的地方

我下一週想繼續做的事

SUMMARY

完成後：你看到什麼模式？

我最常想喝飲料的時間

我最常見的觸發點

我最難放下的是



我這 7 天做得最好的地方

我下一週想繼續做的事

你可以把結果這樣理解：

如果你總是在下午想喝，可能和疲憊、午餐不足或水量不足有關。如果你總是在壓力大時想喝，飲料可能已經變成情緒放鬆工具。

搭配工具使用方式

如果你發現

建議搭配

想喝飲料和情緒有關

情緒性進食 6 型測驗

想喝前停不下來

嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本

下班後固定想買飲料

下班後嘴饞觸發點分析表

白天吃太少下午想喝

7 天嘴饞止損行動手冊 Day 5

想找更深層原因

AI 能量減脂初評

最自然的使用順序

先做情緒性進食 6 型測驗，再用這份 7 天飲料重置表觀察自己的飲料習慣。當你發現飲料和壓力、疲憊、營養缺口有關，就可以進一步完成 AI 能量減脂初評。

下一步：AI 能量減脂初評

如果你發現自己總是靠飲料撐過下午，可能不只是飲料問題，而是白天營養、蛋白質、水量、壓力和作息一起影響。

已加購 1 元 AI 減脂測驗的人

點擊下方連結後，系統會自動判斷你的購買狀態，並帶你進入測驗領取與聯繫頁面。

尚未加購的人

點擊後會先進入加購買，完成後即可開始 AI 能量減脂初評。

前往 AI 能量減脂初評

找出你更深層的減脂卡關原因，包含情緒、睡眠、壓力、外食與營養缺口。

[點擊前往測驗入口](#)

免責聲明

本工具僅作為一般健康教育、自我觀察與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。