

找出破功前的線索

下班後嘴饞 觸發點分析表

幫你回推每次嘴饞前的時間、情緒、場景與身體訊號，把「我又失控了」變成「我看懂模式了」。

下班後

手搖飲

外送衝動

晚餐後嘴饞

這份工具不是叫你不能吃。

它是幫你看懂：每次破功前，到底是哪一個開關被打開了。

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師

你的嘴饞不是突然發生的

很多人以為嘴饞是突然出現的，但實際上，嘴饞通常有前奏。

破功前 30 分鐘，通常已經有線索。

- 可能是某個時間到了。
- 可能是壓力累積太多。
- 可能是回家路上剛好經過飲料店。
- 可能是白天吃太少，晚上身體開始討食物。
- 也可能是你已經習慣用零食結束一天。

當你找出觸發點，就不需要每次都靠意志力硬撐。你可以提前改變路線、補足營養、調整晚餐，或建立新的下班流程。

使用重點

不要只記錄「我吃了什麼」。請回頭看「我吃之前發生了什麼」。

6 大嘴饞觸發點總覽

先用這 6 張卡快速判斷，這次嘴饞最可能是從哪裡開始的。

01

時間觸發

固定時間一到，自然想吃或想喝。

02

場景觸發

看到店家、冰箱、外送 App，就被提醒。

03

情緒觸發

壓力、委屈、焦慮、無聊、想獎勵自己。

04

身體觸發

睡眠不足、太累、生理期前、真的餓。

05

營養觸發

白天吃太少、蛋白質不足、水喝太少。

06

習慣觸發

追劇配零食、飯後甜點、下班飲料儀式。

提醒

一次嘴饞可能有兩個以上觸發點。例如：下午疲憊 + 含糖飲料習慣 + 水喝太少。

4 步驟找出你的破功模式

1 記錄一次嘴饞事件

先不要分析，先把時間、地點、想吃什麼記下來。

2 回推嘴饞前 30 分鐘

真正的觸發點，常常藏在吃之前。

3 分類觸發點

從時間、場景、情緒、身體、營養、習慣裡找線索。

4 設計下次的止損策略

把下一次遇到同樣情境時要做的事，寫成一句清楚的行動。

目標不是完美控制，而是讓你越來越早看見線索。

嘴饞事件紀錄表

日期 / 時間

我當時在哪裡？

我想吃或想喝什麼？

嘴饞強度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

飢餓程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

壓力程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

疲憊程度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

最後有吃或喝嗎？

☐ 有

☐ 沒有

如果有，我吃了或喝了什麼？

嘴饞前 30 分鐘回推表

請不要只看嘴饞那一刻。真正的觸發點，通常在前面 30 分鐘就出現了。

嘴饞前 30 分鐘，我正在做什麼？

嘴饞前 30 分鐘，我剛發生什麼事？

我那時候的情緒是什麼？

我那時候身體狀態如何？

我上一餐是什麼時候吃的？

上一餐吃得夠嗎？

☐ 夠

☐ 不夠

☐ 不確定

今天水喝得夠嗎？

☐ 夠

☐ 不夠

今天有沒有睡不好？

☐ 有

☐ 沒有

觸發點分類表

這次嘴饞最可能被哪些因素啟動？可以複選。

時間與場景

☐ 固定時間到了

☐ 經過特定店家

☐ 打開外送 App

☐ 便利商店

☐ 沙發追劇

情緒與身體

☐ 壓力太大

☐ 很疲憊

☐ 心情委屈

☐ 無聊

☐ 想獎勵自己

☐ 睡眠不足

營養與習慣

☐ 白天吃太少

☐ 蛋白質不足

☐ 水喝太少

☐ 飯後習慣想吃

☐ 追劇想配東西

這次最主要的觸發點是：

我想先處理的原因是：

我的下班後破功地圖

很多嘴饞不是意志力問題，而是環境設計問題。請寫下你的高風險路線與場景。

下班後路線 / 場景	容易觸發什麼？	可以怎麼避開或調整？
公司附近		
通勤路上		
便利商店		
回到家後		
晚餐後		
睡前		

小提醒

如果你每天都經過同一家手搖飲店，或每次回家都坐在同一張沙發滑手機，嘴饞就很容易被環境提醒出來。

我的 3 大高風險觸發點

請從前面的紀錄中，整理出最常出現、最容易讓你破功的 3 個觸發點。

排名	高風險觸發點	常見時間	常見食物 / 飲料
1			
2			
3			

我最需要先處理的是：

因為它最常讓我：

先處理最常出現的一個觸發點，比一次想改全部更有效。

如果...那我就...止損計畫

把下次要做的事寫得越具體，越容易真的執行。

如果我遇到...	那我就先...
下班後想買手搖飲	先喝 300ml 水，10 分鐘後再決定。
晚餐後想吃甜食	先刷牙或泡熱茶。
壓力大想叫外送	先做 3 分鐘身心連結工作本。
很累不想選餐	用我的固定晚餐備案。
追劇想配零食	換成無糖飲或安全點心。
白天吃太少，晚上想吃	明天早餐或午餐補蛋白質。

我自己的止損句：

下一次遇到同樣情境時，我會先：

一週觸發點追蹤表

連續記錄 3 到 7 次，你會更容易看見自己的規律。

日期	最強嘴饞時間	主要觸發點	有止損嗎？
Day 1			有 / 無
Day 2			有 / 無
Day 3			有 / 無
Day 4			有 / 無
Day 5			有 / 無
Day 6			有 / 無
Day 7			有 / 無

這週我學到：

我下週最想先調整：

搭配工具使用方式

如果你發現...	建議搭配
主要是情緒觸發	情緒性進食 6 型測驗
當下很難停下來	嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本
已經快要失控	10 分鐘嘴饞急救流程卡
白天吃太少	7 天嘴饞止損行動手冊 Day 5
晚餐後失控	7 天嘴饞止損行動手冊 Day 6
想找更深層原因	AI 能量減脂初評

前往 AI 能量減脂初評

如果你已經加購 1 元 AI 減脂測驗，點擊後可直接進入測驗領取與聯繫頁面。
若尚未加購，系統會引導你進入加購買。

點擊前往 AI 能量減脂初評

免責聲明

本工具僅作為一般健康教育、自我觀察與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。若你有特殊疾病、懷孕、正在服藥、疑似飲食疾患、暴食症、嚴重焦慮或憂鬱狀況，請優先諮詢合格醫療專業人員。

可樂吉健康研究所

崇銘老師

陪你從情緒、外食、作息與營養缺口，找到更適合自己的減脂方式。