

外食族也能用的穩定晚餐選擇法

下班後防暴食 晚餐公式

不用自己煮，也能讓晚餐更有飽足感，降低晚餐後繼續嘴饞、喝飲料或找零食的機率。

不用完美，只要讓晚餐比原本更穩一點。

這份工具適合你，如果你常常...

- 下班後很累，完全不想思考晚餐要吃什麼
- 晚餐隨便吃，睡前又開始找零食
- 外食居多，覺得很難吃得穩定
- 常用飲料、炸物、外送結束一天

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

為什麼下班後最容易暴食？

下班後暴食，常常不是因為你不够自律。很多時候，是一整天的身體狀態已經累積到太低。

- 早餐很隨便，甚至沒吃。
- 午餐吃太快，蛋白質不足。
- 下午靠飲料或咖啡撐過去。
- 水喝不夠，壓力又很高。
- 下班時已經又累又餓。

這時候，如果晚餐又只靠澱粉、炸物、甜飲或外送，身體很容易吃完還不滿足，晚上繼續找零食。

這份工具不是要你少吃，而是幫你晚餐吃得更穩。

今晚先做一個判斷

我現在是很餓、很累、很煩、很想喝飲料，還是只是懶得想？你的狀態，會影響今晚最適合的晚餐備案。

3-1-1 防暴食晚餐公式

外食時不用先算熱量，先看這餐有沒有下面四個元素。

3

拳蔬菜

增加體積感與滿足感

1

掌蛋白質

幫助飽足與穩定

1

拳澱粉

提供能量，不用完全禁止

1

杯水 / 無糖飲

避免把口渴誤認成嘴饞

記法

3 拳蔬菜 + 1 掌蛋白質 + 1 拳澱粉 + 1 杯水或無糖飲。

元素	你可以這樣想
蛋白質	讓晚餐比較穩，不容易睡前又餓。
蔬菜	讓胃有份量，也提高吃完的滿足感。
澱粉	可以吃，但不要讓它變成整餐唯一主角。
水 / 無糖飲	先把口渴和想喝甜分開。

第一步：先找蛋白質

不要先問吃什麼，先問蛋白質在哪裡。

外食族最常見的問題，是餐點以澱粉為主，蛋白質太少。先找到蛋白質，晚餐會穩很多。

外食場景	蛋白質選項
便當店	雞腿、雞胸、魚、瘦肉、滷排骨、豆腐。
超商	茶葉蛋、雞胸、無糖豆漿、豆腐、鮭魚、毛豆。
麵店	滷蛋、豆干、燙肉片、雞肉、魚丸貢丸適量。
早餐店	雞蛋、鮭魚、里肌、無糖豆漿。
速食店	雞肉、牛肉、魚排，先保留主餐蛋白質。
滷味	豆干、海帶、青菜、雞肉、蛋、菇類。

今晚小任務

買晚餐前，先找到這餐的蛋白質。只要做到這件事，就已經比原本更穩。

第二步：補蔬菜或高纖選項

蔬菜不是裝飾，是防止晚餐後繼續嘴饞的關鍵之一。

場景	可以怎麼補
便當店	飯少一點，多夾兩格青菜。
超商	加一盒沙拉、毛豆、菇類或燙青菜。
麵店	加點燙青菜、海帶、豆芽。
自助餐	先夾菜，再夾肉，最後決定飯量。
滷味	青菜、菇類、海帶、豆干一起選。
速食店	至少不要再加甜飲與甜點，可搭配無糖飲。

如果真的買不到菜怎麼辦？

不要因為買不到菜就放棄整餐。先把蛋白質找到，飲料先穩住，下一餐再補蔬菜。穩定比完美重要。

第三步：澱粉留一拳，不要亂砍

很多人下班後暴食，是因為白天或晚餐太用力限制澱粉，結果晚一點更想吃甜食、零食或宵夜。

澱粉可以吃，重點是份量穩定

半碗飯到一碗飯

一份地瓜

一顆飯糰

一份麵

一片吐司

一份饅頭

重點不是完全不吃，而是不要讓澱粉變成整餐唯一主角。

蛋白質先到位，澱粉留一拳，晚餐會更穩。

常見陷阱

只吃麵、只吃飯糰、只吃鐵板麵、只吃麵包，看起來有吃晚餐，但身體很可能沒有真的滿足。

第四步：飲料先穩住

晚餐配含糖飲料，常常會讓甜味和吃飯綁在一起，晚一點更難停下來。

原本習慣	先改成
全糖手搖飲	微糖或無糖茶。
珍珠奶茶	鮮奶茶微糖、不加料。
含糖咖啡	無糖拿鐵或美式。
汽水	氣泡水。
果汁	水或無糖茶，水果留在白天吃。
吃飯一定要喝甜	先喝水，飯後 10 分鐘再決定。

今天只做一個降階

全糖改半糖、加料改不加料、大杯改中杯，都算進步。

五大外食場景範例

便當店

主菜選雞、魚、瘦肉、豆腐；飯半碗到一碗；菜多一點；飲料選水或無糖茶。

超商

雞胸 + 茶葉蛋 + 沙拉 + 地瓜，或無糖豆漿 + 飯糰 + 茶葉蛋。

早餐店當晚餐

蛋餅加蛋 + 無糖豆漿，或里肌蛋吐司 + 無糖茶。避免奶茶 + 鐵板麵 + 薯餅三連擊。

麵店

湯麵 + 蛋或肉 + 燙青菜，或乾麵減醬 + 燙青菜 + 滷蛋。少喝湯，避免再加甜飲。

速食店

主餐保留，飲料換無糖，薯條減量或不加點，不加甜點。

今晚我可以怎麼選？

我今晚最可能去哪裡買晚餐？

這餐的蛋白質是什麼？

我可以補哪一種蔬菜或高纖選項？

澱粉份量大約多少？

飲料我準備選什麼？

晚餐後我準備做什麼收尾動作？

今晚只要抓住一個原則

先找到蛋白質，再補蔬菜，澱粉留一拳，飲料先降階。

我的下班後晚餐備案清單

真正讓你穩定的不是知識，而是「不用思考的選項」。請先寫下 3 到 5 個固定備案。

場景	我的固定備案
很累、不想想	
很餓、怕失控	
想喝飲料	
想吃炸物	
只能吃超商	
晚餐很晚才吃	

備案範例

超商：雞胸 + 茶葉蛋 + 沙拉 + 地瓜。

便當：主菜保留、飯半碗、多菜、無糖茶。

麵店：湯麵 + 滷蛋 + 燙青菜。

晚餐後防嘴饞收尾流程

晚餐吃完，不要直接進入零食模式。請先做一個收尾動作。

 喝水

 收掉食物包裝

 刷牙或泡熱茶

 散步 5 分鐘

 不把零食放在視線內

 先不打開外送 App

 如果還想吃，使用 10 分鐘嘴饞急救流程卡

晚餐後的收尾，決定你會不會進入第二輪嘴饞。

一週晚餐穩定追蹤表

日期	蛋白質	蔬菜	澱粉	甜飲	晚餐後嘴饞
Day 1	☐	☐	☐	☐	☐
Day 2	☐	☐	☐	☐	☐
Day 3	☐	☐	☐	☐	☐
Day 4	☐	☐	☐	☐	☐
Day 5	☐	☐	☐	☐	☐
Day 6	☐	☐	☐	☐	☐
Day 7	☐	☐	☐	☐	☐

這週我觀察到：

下週我最想先調整：

搭配工具使用方式

如果你發現	建議搭配
晚餐後還是很想吃	10 分鐘嘴饞急救流程卡
不知道是真餓還是情緒想吃	嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本
下班路上固定想買飲料	下班後嘴饞觸發點分析表
白天吃太少，晚上失控	正念營養追蹤表
飲料是最大問題	7 天含糖飲料重置表
想找更深層原因	AI 能量減脂初評

這份公式的重點

不是讓你每餐都吃得完美，而是讓你下班後有一套不用想太多，也能比較穩的晚餐選擇法。

下一步：AI 能量減脂初評

如果你發現自己最大問題不是不知道怎麼吃，而是下班後太累、沒時間準備、外食選擇很不穩，那你需要的可能不是更複雜的菜單，而是一套更簡單、固定、可以每天執行的營養安排。

這個連結會自動判斷你的狀態

如果你已經加購 **1 元 AI 能量減脂初評**，點擊下方按鈕後，系統會直接帶你進入領取與後續聯繫頁面。

如果你尚未加購，點擊後會先進入加購頁，完成後就可以開始測驗。

前往 AI 能量減脂初評

用更完整的方式，看懂你的晚間嘴饞是否和情緒、睡眠、外食、壓力或營養缺口有關。

立即前往測驗入口

免責聲明

本工具僅供一般健康教育與自我觀察使用，不能取代醫療診斷與治療。若你有特殊疾病、飲食疾患或情緒困擾，請優先尋求專業醫療協助。