

測驗完成後的結果說明 × 行動指南

情緒性進食 6 型解讀手冊

看懂你為什麼總是在壓力大、很累、想放鬆時，忍不住吃東西或喝飲料，並找到更適合自己的第一步調整方向。

下班後嘴饞

含糖飲料戒不掉

壓力想吃

手機閱讀友善

建議使用方式

先完成互動測驗，再依照你的主要類型與次要類型，閱讀對應解讀頁。這份手冊不是要替你貼標籤，而是幫你找到最適合先開始調整的地方。

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師

你為什麼會嘴饞？

嘴饞，不一定只是嘴巴想吃。

很多人把嘴饞理解成「自己不夠自律」。但其實，嘴饞常常只是表面現象。

- 有些人是壓力太大，想用食物讓自己放鬆。
- 有些人是太累，沒有力氣做選擇。
- 有些人是覺得委屈，想用吃東西犒賞自己。
- 有些人是一到某個時間、某個情境就自然想吃。
- 有些人看起來是想喝飲料，其實是把飲料當成情緒獎勵。
- 也有些人白天吃得太少，晚上才特別容易失控。

所以，真正重要的不是一直責怪自己，而是先看懂：**你最常是因為什麼原因而想吃。**

這份手冊能幫你什麼？

- 理解自己的嘴饞模式
- 找出最容易破功的情境
- 知道第一步應該從哪裡開始調整
- 更順利搭配《7 天嘴饞止損行動手冊》使用

情緒性進食 6 型總覽

你可以先用下面的 6 張卡，快速對照自己的主要傾向。

TYPE 1

壓力釋放型

壓力越大，越想靠食物放鬆。

TYPE 2

疲憊失控型

太累時，很難控制飲食選擇。

TYPE 3

委屈補償型

辛苦了一整天，想用食物犒賞自己。

TYPE 4

無聊習慣型

不一定餓，但一到某些情境就想吃。

TYPE 5

含糖飲料依賴型

飲料也是提神、獎勵和放鬆。

TYPE 6

營養不足型

白天補不夠，晚上就容易特別想吃。

最常見的結果，其實是「混合型」。

例如壓力釋放型加上含糖飲料依賴型，代表你可能最常在壓力大時，用飲料或食物安撫自己。

如何看懂你的測驗結果

結果	怎麼理解
最高分	你目前最主要的情緒性進食傾向。
第二高分	你常一起出現的次要傾向。
兩型接近	代表你可能屬於混合型，需要同時觀察兩個觸發來源。

這不是診斷，也不是固定不變的人格。它只是幫你更快看見：你在什麼情境下最容易破功，以及第一步該從哪裡調整。

TYPE 1

壓力釋放型

壓力越大，越想靠食物讓自己鬆一口氣。

你可能有這些感覺

- 工作一忙、一煩，就很想吃東西。
- 下班後腦袋停不下來，會想吃甜食、炸物或宵夜。
- 覺得今天真的太累了，想靠吃東西放鬆一下。
- 吃東西的當下像是在喘一口氣。

你最容易破功的場景

工作壓力大

被主管催

事情做不完

下班回到家

這一型真正缺的，常常不是食物。

你需要的可能是放鬆、轉換情緒、暫時逃離壓力，或一點被安撫的感覺。

第一個調整方向

當你想吃時，不要先問自己「能不能吃」。先問自己：**我現在是餓，還是壓力太滿？**

最適合先做

原因

Day 4：10 分鐘嘴饞急救流程

先在壓力衝動和自動進食之間，插入一個暫停鍵。

你不是沒自制力。你只是太常用食物替自己撐住壓力。

TYPE 2

疲憊失控型

太累時，你不是不想控制，而是已經沒有餘裕做選擇。

你可能有這些感覺

- 睡不好時，特別容易亂吃。
- 累的時候懶得想要吃什麼，看到什麼就吃什麼。
- 下班後很沒電，只想趕快吃點東西或喝點飲料。
- 太累時會覺得「今天先這樣吧」。

你最容易破功的場景

睡眠不足

下班後沒電

晚上腦袋疲憊

作息亂掉

這一型真正的問題

很多時候，不是你不想控制，而是你已經累到沒有力氣做選擇。

第一個調整方向

先處理疲憊，再處理飲食。你需要的是不用思考的備案，而不是更用力硬撐。

最適合先做

原因

Day 5：白天營養缺口檢查

檢查睡眠、疲憊、下午提神方式與晚餐備案。

你不是意志力差。你只是身體和大腦都太累了。

TYPE 3

委屈補償型

你吃的不是食物本身，而是一種「我也該被照顧」的感覺。

你可能有這些感覺

- 常覺得自己很辛苦，所以想吃點東西犒賞自己。
- 心情委屈時，很想用食物安慰自己。
- 容易冒出「今天已經夠累了，吃一下沒關係」的念頭。
- 吃東西時，常有一種補償自己的感覺。

你最容易破功的場景

被忽略

被誤解

一直配合別人

想要自己的空間

這一型真正缺的

你真正想要的，常常是被理解、被照顧、被允許喘口氣，或有一點自己的空間。

第一個調整方向

先辨認委屈感，而不是一有感受就去找食物。把「我現在很委屈」說出來，是第一步。

最適合先做

原因

Day 2：嘴饞觸發點分析

找出委屈感出現的場景，建立非食物的安慰方式。

你要補的，不一定是熱量。很多時候，是情緒上的被照顧感。

TYPE 4

無聊習慣型

不一定餓，但一進入某個情境，嘴巴就想找東西。

你可能有這些感覺

- 不一定餓，但嘴巴就是想吃。
- 追劇、滑手機、放空時很容易配零食。
- 晚餐後沒多久，就習慣找東西吃。
- 一到某個時間，就自然會想喝飲料或吃點心。

你最容易破功的場景

追劇

滑手機

晚餐後坐下來

一個人放空

這一型的核心是習慣迴路

你的大腦已經把某個情境和食物綁在一起，不一定是強烈情緒。

第一個調整方向

不是靠忍耐，而是先打斷「情境 → 想吃 → 立刻吃」的自動流程。

最適合先做	原因
Day 4：10 分鐘嘴饞急救流程	替追劇、滑手機、放空時設計替代行動。

你不是太貪吃。你只是太習慣在某些時候用吃東西陪自己。

TYPE 5

含糖飲料依賴型

飲料已經不只是飲料，而是提神、放鬆和獎勵自己的方式。

你可能有這些感覺

- 明知道飲料會影響減重，還是很難不喝。
- 下午累的時候特別想喝手搖飲、奶茶、含糖咖啡。
- 吃飯沒有飲料，覺得少了什麼。
- 飲料像是提神、放鬆、獎勵自己的儀式。

你最容易破功的場景

下午 2-5 點

工作很煩

飯後想喝

想犒賞自己

你依賴的可能不只是甜味

更可能是飲料帶來的儀式感、放鬆感、提神感和情緒獎勵感。

第一個調整方向

先不要急著完全戒掉。先從記錄、降糖、減少加料、想喝前先喝水開始。

最適合先做

原因

Day 3：含糖飲料為什麼戒不掉？

先看見飲料和情緒、疲憊、習慣的連結。

Day 5：白天營養缺口檢查

確認是否因白天吃太少而更想喝飲料。

你不是只愛喝飲料。很多時候，你是在用飲料撐過疲憊和壓力。

TYPE 6

營養不足型

白天補不夠，晚上就容易特別想吃。

你可能有這些感覺

- 白天常常吃得很少，晚上特別想吃。
- 早餐可能只有咖啡、飲料，甚至沒吃。
- 午餐吃得隨便，蛋白質不一定夠。
- 晚餐前已經餓到很難控制，晚上也容易繼續找東西吃。

你最容易破功的場景

晚餐前超餓

白天一直忍

下午沒補充

晚上回家失控

這不一定是情緒問題

很多時候，是身體真的在補償白天的不足。

第一個調整方向

先不要一直怪自己晚上失控。先檢查白天有沒有蛋白質不足、水喝太少、正餐份量太少，或太常靠飲料撐著。

最適合先做	原因
Day 5：白天營養缺口檢查	找出晚上嘴饞前，白天已經累積的缺口。
Day 6：下班後防暴食晚餐公式	建立外食族也能執行的穩定晚餐。

你不是不夠努力。你可能只是白天沒有真正補夠。

混合型怎麼看？

很多人不會只落在單一型。混合型其實很常見，代表你可能有兩個主要觸發來源。

壓力釋放型 + 含糖飲料依賴型

壓力大時，最容易用飲料安撫自己。調整方向可以從「想喝前先喝水」和「下班後放鬆流程」開始。

疲憊失控型 + 營養不足型

白天吃不夠，加上太累，晚上更容易失控。調整方向要先放在白天蛋白質、水量與晚餐備案。

委屈補償型 + 無聊習慣型

有情緒時會吃，沒情緒時也容易因習慣而吃。調整方向是同時記錄情緒觸發與固定情境。

如何使用結果

你不用一次解決所有問題。先抓最高分的一型，再觀察第二型怎麼影響你。

每一型的第一步調整方向

調整不是從完美開始，而是從最容易做到的一步開始。

類型	第一個建議動作
壓力釋放型	先學會在想吃前辨認壓力，使用 10 分鐘急救流程。
疲憊失控型	先檢查睡眠、疲憊與下班後的晚餐備案。
委屈補償型	先找出讓你委屈、辛苦、想補償自己的情境。
無聊習慣型	先打斷固定情境下的習慣迴路。
含糖飲料依賴型	先記錄、降糖、減加料，不急著硬戒。
營養不足型	先補早餐蛋白質、午餐份量和白天水分。

今天就能開始的小任務

-  想喝飲料前先喝 300ml 水。
-  晚上嘴饞時，先做 5 次深呼吸。
-  明天早餐加一份蛋白質。
-  記錄一次自己最想吃的時間點。

如何搭配《7 天嘴饞止損行動手冊》

測驗的目的，不只是知道自己是哪一型。更重要的是，讓你知道接下來該先從哪裡開始。

你的類型	最建議優先完成的內容
壓力釋放型	Day 4：10 分鐘嘴饞急救流程
疲憊失控型	Day 5：白天營養缺口檢查
委屈補償型	Day 2：嘴饞觸發點分析
無聊習慣型	Day 4：10 分鐘嘴饞急救流程
含糖飲料依賴型	Day 3：含糖飲料重置表
營養不足型	Day 5 + Day 6：營養缺口與防暴食晚餐公式

建議使用方式

先看自己的最高分類型，再優先完成對應的那一天。若你願意完整做完 7 天，效果通常會更完整。

我的行動整理頁

把測驗結果變成下一步行動，比只看懂更重要。

我的主要類型：

我的次要類型：

我最常嘴饞的時間：

我最常出現的觸發情緒：

我最常想吃或想喝的東西：

我這週最想先改善的一件事：

這週我想先執行的行動

 想喝飲料前先喝水

 晚餐前不要餓太久

 記錄一次嘴饞觸發點

 完成 7 天手冊對應章節

 安排一個非食物的放鬆方式

NEXT STEP

下一步：要不要做 AI 能量減脂初評？

情緒性進食只是表面看得到的一層。很多人背後，還會同時受到以下因素影響：

📌 壓力

📌 睡眠

📌 外食習慣

📌 營養缺口

📌 水量不足

📌 身心狀態失衡

如果你完成測驗後，發現自己常常明知道要減重，卻還是在特定情境下忍不住吃、喝、破功，下一步可以用 AI 能量減脂初評，把情緒、睡眠、外食與營養缺口一起看得更清楚。

進入 AI 能量減脂初評

點擊下方連結後，系統會自動判斷你的購買狀態。

已用 1 元加購的人

會直接進入測驗領取與聯繫頁面，依照頁面提示完成下一步。

尚未加購的人

會進入加購頁面，完成後即可取得 AI 測驗入口。

[前往 AI 能量減脂初評](#)

常見問題

Q1. 這個結果是不是代表我就是這種人？

不是。這只是目前生活狀態下的傾向，會隨著壓力、睡眠、飲食與生活節奏改變。

Q2. 如果我很多型分數都很高怎麼辦？

先看最高分，再看第二高分。不要一次調整全部，先選最常出現、最痛的一個情境開始。

Q3. 我是不是一定要完全戒掉零食和飲料？

不一定。第一步不是完全禁止，而是先看見模式，建立更好的止損流程與替代選擇。

免責聲明與最後提醒

本手冊內容僅作為一般健康教育、自我觀察與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。

若你有特殊疾病、懷孕、正在服藥、疑似飲食疾患、暴食症、嚴重焦慮或憂鬱狀況，請優先諮詢合格醫療專業人員。

給你的最後提醒

你不是只能靠意志力硬撐。當你開始看懂自己為什麼想吃，你就多了一個選擇。

請把這份測驗結果，當成理解自己的入口，而不是責備自己的理由。

可樂吉健康研究所

崇銘老師

陪你從情緒、外食、作息與營養缺口，找到更適合自己的減脂方式。