

7 天正念營養觀察工具

正念營養 追蹤表

不算熱量，也能找出你晚上嘴饞、下午想喝飲料、下班後失控的營養缺口。

蛋白質

水分

飽足感

吃飯速度

晚間嘴饞

這不是熱量計算表。

這份工具會陪你觀察身體是不是被好好照顧，讓你找到更容易穩定的調整方向。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師

一般健康教育與自我觀察工具，不取代醫療診斷或治療。

為什麼不要只看熱量？

很多人減重時，只問自己今天熱量有沒有超標。可是晚上嘴饞常常不只和熱量有關。

- 你可能白天吃太少，晚上才開始補回來。
- 早餐沒有蛋白質，下午就容易想喝甜。
- 午餐吃太趕，身體沒有真正感覺到滿足。
- 水喝太少，把口渴誤認成嘴饞。
- 壓力太高，吃飯速度變快，飽足感跟不上。

這份表的重點，是看懂你的身體哪裡沒有被好好照顧。

每天只需要 3-5 分鐘。

不用秤重、不用算克數、不用追求完美。你只要誠實記錄，模式就會慢慢浮現。

正念營養追蹤的 6 個指標

01

蛋白質

觀察早餐、午餐、晚餐是否有穩定蛋白質。

02

水分

確認自己是口渴、疲憊，還是真的想喝甜。

03

正餐穩定度

看看有沒有白天隨便吃，晚上才失控。

04

吃飯速度

不只看吃什麼，也觀察你怎麼吃。

05

壓力疲憊

壓力與疲憊會影響選擇和嘴饞強度。

06

晚間嘴饞

回頭看嘴饞和白天狀態的關係。

使用重點

不要把它當成考卷。這是一張幫你更了解自己的地圖。

每日營養追蹤表 A

早餐與午餐

日期

早餐吃了什麼？

早餐有蛋白質嗎？

☐ 有

☐ 沒有

☐ 沒吃

午餐吃了什麼？

午餐有蛋白質嗎？

☐ 有

☐ 沒有

☐ 不確定

今天先觀察就好。

你不需要馬上改變每一餐，只要先看見哪一餐最容易空掉。

每日營養追蹤表 B

水分、飲料與晚餐

今天水喝得夠嗎？

☐ 夠☐ 不夠☐ 不確定

下午有喝含糖飲料嗎？

☐ 有☐ 沒有

晚餐吃了什麼？

晚餐有蛋白質嗎？

☐ 有☐ 沒有☐ 不確定

晚餐後有嘴饞嗎？

☐ 有☐ 沒有

今天最不穩的一餐是？

☐ 早餐☐ 午餐☐ 晚餐☐ 點心飲料

SCORES

飽足感與嘴饞分數

請用 0-10 分做直覺評估。0 代表完全沒有，10 代表非常強烈。

早餐後飽足感

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

午餐後飽足感

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

下午疲憊程度

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

下午想喝飲料程度

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

晚餐後飽足感

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

睡前嘴饞程度

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

觀察提示

如果下午疲憊很高、午餐飽足感很低，晚上嘴饞可能和白天營養不足有關。

吃飯速度與正念檢查

今天吃飯時，我有做到嗎？

☐ 坐下來好好吃飯

☐ 有放慢速度

☐ 沒有一直滑手機

☐ 有感覺幾分飽

☐ 吃完有滿足感

☐ 有一餐匆忙解決

☐ 吃完仍覺得空

☐ 壓力大吃很快

今天我吃得最急的一餐是：

當時我正在趕什麼，或心裡在想什麼？

小提醒

正念營養不只看食物內容，也看你吃飯時的身體狀態。吃太快時，身體可能還沒收到「我吃夠了」的訊號。

白天營養缺口檢查表

今天可能出現的缺口

☐ 早餐沒吃

☐ 早餐沒有蛋白質

☐ 午餐只有澱粉

☐ 午餐份量太少

☐ 水喝太少

☐ 下午靠含糖飲料撐

☐ 晚餐太晚吃

☐ 晚餐蛋白質不足

☐ 壓力太高

☐ 睡眠不足

今天最可能影響我晚上嘴饞的缺口是：

請先找一個缺口就好。

例如早餐加蛋白質、午餐多吃一點、水喝足一點。不要同時改太多。

晚間嘴饞回推表

晚上嘴饞出現時，請不要只記錄吃了什麼。請回頭看白天哪裡不穩。

我晚上幾點開始嘴饞？

我想吃或想喝什麼？

當時是真的餓嗎？

☐ 是

☐ 否

☐ 不確定

今天哪一餐最不穩？

今天有沒有水喝太少？

☐ 有

☐ 沒有

今天有沒有蛋白質不足？

☐ 有

☐ 沒有

今天壓力或疲憊高嗎？

☐ 有

☐ 沒有

這次嘴饞最可能和什麼有關？

我的外食營養穩定公式

蛋白質一掌 + 蔬菜三拳 + 澱粉一拳 + 水或無糖飲

場景	可以怎麼選
早餐店	蛋餅加蛋 + 無糖豆漿，少用奶茶當早餐。
便利商店	茶葉蛋 + 雞胸 + 沙拉 + 地瓜或飯糰。
便當店	主菜 + 多青菜 + 飯半碗到一碗。
麵店	湯麵加蛋或肉，再補一份青菜。
速食店	主餐保留，飲料換無糖，薯條減量。

我生活中最常買的外食是：

我可以怎麼調整得更穩定？

7 天營養追蹤總表

日期	早餐蛋白質	午餐蛋白質	水分	飲料	晚上嘴饞
Day 1	☐	☐	☐	☐	☐
Day 2	☐	☐	☐	☐	☐
Day 3	☐	☐	☐	☐	☐
Day 4	☐	☐	☐	☐	☐
Day 5	☐	☐	☐	☐	☐
Day 6	☐	☐	☐	☐	☐
Day 7	☐	☐	☐	☐	☐

這 7 天我最常出現的缺口：

我最想先補上的一件事：

SUMMARY

完成後：我的營養缺口模式

我最常不穩的是哪一餐？

☐ 早餐

☐ 午餐

☐ 晚餐

☐ 點心飲料

我最常缺的是什麼？

☐ 蛋白質

☐ 水分

☐ 蔬菜

☐ 正餐

☐ 睡眠

☐ 放鬆

我最常嘴饞的時間

我晚上嘴饞最常和什麼有關？

我下週最想先補上的一件事

請選最簡單的一步開始。

早餐加一份蛋白質、午餐不要只吃澱粉、下午先喝水，都可能是很好的起點。

搭配工具使用方式

如果你發現	建議搭配
晚上嘴饞和情緒有關	情緒性進食 6 型測驗
嘴饞當下停不下來	嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本
下班後有固定觸發點	下班後嘴饞觸發點分析表
含糖飲料影響很大	7 天含糖飲料重置表
想知道更深層原因	AI 能量減脂初評

這份表的最大價值

讓你看見：晚上想吃，可能早在早餐、午餐、水量、壓力或吃飯速度裡就已經有線索。

下一步：AI 能量減脂初評

如果你發現自己常常早餐不穩、午餐蛋白質不足、下午靠飲料撐，這就不只是少吃能解決的問題。

前往 AI 能量減脂初評

如果你已經加購 1 元 AI 能量減脂初評，點擊後即可前往填寫與領取。若尚未加購，點擊後會進入加購頁，完成後即可開始測驗。

[點擊前往測驗入口](#)

完成初評後，你可以更清楚看見

- 情緒、睡眠、壓力和外食習慣的關聯。
- 白天營養缺口和晚上嘴饞的連動。
- 下一步更適合你的調整方向。

免責聲明

本工具僅作為一般健康教育、自我觀察與生活習慣調整參考，不能取代醫師、營養師、心理師或其他醫療專業人員的診斷、治療或建議。若你有特殊疾病、懷孕、正在服藥、疑似飲食疾患、暴食症、嚴重焦慮或憂鬱狀況，請優先諮詢合格醫療專業人員。

可樂吉健康研究所 | 崇銘老師