

Algoritmul SIMPLEX (example)

①

I) Să se rezolve (P.P.L.) :

$$(P.P.L.)_f \begin{cases} (1_s) (\min) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ (2_s) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 8 \end{cases} \\ (3_s) x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

→ forma generală

1) aducem (P.P.L) la forma standard :

$$(P.P.L)_s \begin{cases} (1_s) (\min) f(x_1, x_2, x_3; x_4^e, x_5^e) = 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 0 \cdot x_4^e + 0 \cdot x_5^e \\ (2_s) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4^e = 10 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5^e = 8 \end{cases} \\ (3_s) x_1, x_2, x_3, x_4^e, x_5^e \geq 0 \end{cases}$$

→ forma standard

2) determinăm o soluție de bază admisibilă inițială (S.B.A.i) \bar{X}_0 a (P.P.L)_s (adică a sistemului (2_s)) cu metoda lui Gauss.

$$(2_s) \xrightarrow{\text{gauss}} \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 10 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{X}_0 = (0, 0, 0, 10, 8)^T \text{ - S.B.A.i}$$

$\underbrace{x_1 \ x_2 \ x_3}_{\text{var. } = 0} \quad \underbrace{x_4^e \ x_5^e}_{\text{var. prime.}}$

3) Construim tabelul Simplex (corespunzător soluției \bar{X}_0)

			2	-1	-3	0	0	
B	CB	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄ ^e	P ₅ ^e	θ = $\frac{b_i}{a_{ik}}$
P ₄ ^e	0	10	1	1	2	1	0	10/1 = 10
P ₅ ^e	0	8	3	-1	2	0	1	8/3 = 2.66
		$\theta_{\min} = 2.66$	-2	1	3	0	0	$z_j - c_j$
P ₄ ^e	0	2	-2	2	0	1	-1	2/2 = 1
P ₃	-3	4	3/2	-1/2	1	0	1/2	4/(3/2) = 2.66
		$f(\bar{X}_1) = -12$	-13/2	5/2	0	0	-3/2	$z_j - c_j$
P ₂	-1	1	-1	1	0	1/2	-1/2	
P ₃	-3	9/2	1	0	1	1/4	1/4	
		$f(\bar{X}_2) = -29/2$	-4	0	0	-5/4	-1/4	$z_j - c_j$

pe col. $\bar{X}_0 = (0, 0, 0, 10, 8)^T$
 lui P₀ $\{f(\bar{X}_0) = 0\}$

pe col. $\bar{X}_1 = (0, 0, 4, 2, 0)^T$
 lui P₀ $\{f(\bar{X}_1) = -12\}$

pe col. $\bar{X}_2 = (0, 1, 9/2, 0, 0)^T$
 lui P₀ $\{f(\bar{X}_2) = -29/2\}$

4a) || crit. de optim. (toate dif. $z_j - c_j \leq 0$)

soluția găsită (pe coloana lui P₀)

este optimă și unică:

$\bar{X}_{\text{optim}} = (0, 1, 9/2, 0, 0)^T$
 $(\min) f = -29/2$

$$\text{II)} \begin{cases} (1g) \text{ (max)} f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 3x_3 \\ (2g) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 10 \\ 3x_1 + x_3 \leq 6 \end{cases} \\ (3g) x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

→ forme inițială (generală)

⇓

$$\begin{cases} (1s) \text{ (min)} (-f)(x_1, x_2, x_3; x_4^c) = -x_1 - x_2 - 3x_3 + 0 \cdot x_4^c \\ (2s) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 10 \\ 3x_1 + x_3 + x_4^c = 6 \end{cases} \\ (3s) x_1, x_2, x_3, x_4^c \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{A} = \begin{pmatrix} \bar{p}_1 & \bar{p}_2 & \bar{p}_3 & \bar{p}_4^c & \bar{p}_0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x}_0 = (0, 10, 0, 6)^T - s \bar{A} i$$

\swarrow v. sec. ca \searrow v. prim.

			-1	-1	-3	0		$\theta_i = \frac{p_0}{p_j}$	
	$B \setminus B$	\bar{p}_0	\bar{p}_1	\bar{p}_2	\bar{p}_3	\bar{p}_4^c		\bar{p}_0	
$\leftarrow \bar{p}_2$		-10	2	1	2	0	$\frac{10}{2} = 5$	$\frac{1}{2} / (-1/2)$	} $\theta_i = \frac{p_0}{p_3}$
\bar{p}_4^c		6	3	0	1	1	$\frac{6}{1} = 6$	+	
	$-f_0$	-10	-1	0	1	0	$2_j - c_j = 2(c_B \cdot \bar{p}_j) - c_j$		
\bar{p}_3		5	1	1/2	1	0			
\bar{p}_4^c		1	2	-1/2	0	1			
$-f_2$		-15	-2	-1/2	0	0			

⇓

$$\begin{cases} \text{standard} \\ x_{\text{optima}} = (0, 0, 5, 1)^T \rightarrow \text{soluție optimă unică pt. (PPL)}_s \\ (\text{min})(f) = -15 \end{cases}$$

⇓

$$\begin{cases} \text{inițială} \\ x_{\text{optima}} = (9, 0, 5)^T \rightarrow \text{sol. optimă unică pt. (PPL)}_g \\ (\text{max})(f) = 15 \end{cases}$$

III) (1) (min) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 3x_2 - x_3$
 (2) $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 + 2x_3 \leq 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 8 \end{cases}$
 (3) $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

\Rightarrow (1s) (min) $f = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 0x_4 + 0x_5$
 (2s) $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 8 \end{cases}$
 (3s) $x_1, \dots, x_5 \geq 0$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4^c & p_5^c & p_0 \\ 3 & -6 & 2 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

 \checkmark sec = 0 \checkmark p.rinc.

$$\bar{x}_0 = (0, 0, 0, 6, 8)^T - \text{S.B.A.1}$$

B	CB	PO	p_1	p_2	p_3	p_4^c	p_5^c	θ_i
p_4^c	0	6	3	-6	2	1	0	$\frac{6}{2} = 3$
p_5^c	0	8	1	2	1	0	1	$\frac{8}{1} = 8$
f	0	-3	-2	-3	1	0	0	
p_3	-1	3	3/2	-3	1	1/2	0	
p_5^c	0	5	-1/2	5	0	-1/2	1	
f	-3	-7/2	0	0	-1/2	0		

\Downarrow 4s)
 standard
 $x_{\text{optima}} = (0, 0, 3, 0, 5)^T$
 (min) $f = -3$

\Downarrow
 inițială
 $x_{\text{optima}} = (0, 0, 3)^T$
 (min) $f = -3$

- sol. optimă dar nu este unică
 f (PPL)s are 0 ∞ de sol. optimă

- sol. optimă dar nu este unică
 f probl. inițială are 0 ∞ de sol. optimă
 care conduc către aceeași valoare
 minimă ($= -3$) a fct. obiectiv