
Реализация эффективного взаимодействия между платформой для анализа экспрессии генов Morpheus и библиотекой вычислительных методов R/Bioconductor

Зенкова Д.М., группа М3436,

руководитель: Сергушичев А.А., к.т.н.

# Анализ экспрессии генов


- Экспрессия генов процесс преобразования наследственной информации от гена в РНК или белок
- Анализ экспрессии часто используемый метод при исследованиях в биологии



	A	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	М	N
1	ID	symbol	GSM357839	GSM357841	GSM357842	GSM357843	GSM357844	GSM357845	GSM357847	GSM357848	GSM357849	GSM357850	GSM357852	GSM357853
2	20090	Rps29	16.32141057	16.30051518	16.25429304	16.32141057	16.30051518	16.3214106	16.2104266	16.3214106	16.23220169	16.25429304	16.30051518	16.2542930
3	22121	Rpl13a	16.27241391	16.23220169	16.32141057	16.30051518	16.27241391	16.2724139	16.30051518	16.3005152	16.32141057	16.2104266	16.25429304	16.210426
4	20091	Rps3a1	16.23220169	16.18528469	16.30051518	16.25429304	16.25429304	16.3005152	16.32141057	16.1622511	16.25429304	16.23220169	16.32141057	16.2724139
5	67671	Rpl38	16.2104266	16.25429304	16.27241391	16.27241391	16.2104266	16.254293	16.16225112	16.1359833	16.2104266	16.27241391	16.23220169	16.3214105
6	19241	Tmsb4x	16.30051518	16.32141057	16.23220169	16.2104266	16.32141057	16.1852847	16.25429304	16.2724139	16.10255505	16.06215078	16.27241391	16.2322016
7	67186	Rplp2	16.16225112	16.2104266	16.18528469	16.23220169	16.13598328	16.1359833	16.18528469	16.254293	16.30051518	16.32141057	16.2104266	16.3005151
8	67097	Rps10	16.10255505	16.12314465	16.05120582	16.12314465	16.12314465	16.1231446	16.03531296	16.0621508	16.03531296	16.08954522	16.08954522	16.0895452
9	20084	Rps18	16.18528469	16.16225112	16.2104266	16.16225112	16.23220169	16.1622511	15.9457813	16.035313	16.08954522	16.16225112	16.12314465	16.1622511
10	54127	Rps28	16.06215078	15.98154012	15.95751874	16.10255505	16.03531296	16.0714312	16.12314465	16.2104266	16.0103654	15.9457813	16.05120582	15.9955107
11	20088	Rps24	15.98154012	15.96795367	15.99551072	15.98154012	16.07143124	16.102555	16.10255505	16.0895452	15.85007321	15.85007321	16.18528469	16.1025550
12	19981	Rpl37a	16.03531296	16.06215078	15.91137633	16.06215078	15.96795367	16.0512058	16.08954522	16.0714312	15.99551072	16.05120582	16.13598328	16.0621507
13	11837	Rplp0	15.9457813	16.07143124	16.13598328	16.07143124	15.93889341	16.0621508	16.23220169	16.2322017	16.18528469	16.18528469	16.16225112	16.1359832
14	13627	Eef1a1	15.96795367	15.9457813	16.03531296	16.0103654	16.0103654	15.9815401	16.13598328	16.1231446	16.06215078	16.03531296	16.03531296	16.1231446
15	16785	Rpsa	16.08954522	16.10255505	16.06215078	16.18528469	16.08954522	16.2322017	16.02104671	15.9955107	16.27241391	16.30051518	16.07143124	16.0210467
16	20115	Rps7	16.13598328	16.13598328	16.12314465	16.13598328	16.16225112	16.2104266	15.7690479	15.9113763	15.54340319	15.66058358	15.93160941	15.8559943
17	20102	Rps4x	15.99551072	16.02104671	15.96795367	15.96795367	16.05120582	16.035313	15.91137633	15.9815401	15.88458581	15.88458581	15.96795367	15.8737287
18	67891	Rpl4	16.05120582	16.0103654	16.08954522	16.05120582	16.10255505	16.0210467	15.96795367	15.9181346	16.13598328	16.07143124	16.10255505	15.9815401

# morpheus.js

- Веб-приложение, созданное для визуализации и анализа числовых матриц
- Создан на JavaScript
- Не требует информатической подготовки
- Имеет реализацию некоторых функций, но их недостаточно для полноценного анализа



### R/Bioconductor

- R язык программирования для статистической обработки данных
- Bioconductor хранилище готовых реализаций биоинформатических алгоритмов и методов обработки биологических данных
- Для использования Bioconductor необходимо знание R

# Цель работы

Разработать веб-приложение, интегрирующее возможности визуального анализа morpheus.js и методы анализа библиотек Bioconductor

# Задачи


- Разработать способ взаимодействия между јзклиентом и R (и встроить его в morpheus.js)
- Реализовать интерфейс для нескольких стандартных методов анализа
- Соединить все в одном веб-приложении phantasus

# Взаимодействие через OpenCPU API

- Система для интеграции R через HTTP API
- Имеет библиотеку opencpu.js для работы из JavaScript, реализованную с помощью Ajax

 Для каждого вызова OpenCPU создает новую временную сессию, ключ которой в дальнейшем можно использовать для новых вызовов

# Схема взаимодействия



# Реализованные функции в phantasus


Необходимый минимум для исследования:

- loadGEO загрузка и визуализация данных по идентификатору в репозитории Gene Expression Omnibus (GEO)
- pcaPlot реализация метода главных компонент и визуализация результата в виде интерактивного графика с помощью Plotly.js
- **kmeans** кластеризация генов


#### Дополнительные функции:

• limma - анализ дифференциальной экспрессии для сравнения образцов

# Схема начала работы с данными



# Добавление нового функционала



# Различия между phantasus.js и morpheus.js

• Добавлена поддержка ProtoBuf со стороны клиенты

 Графические интерфейсы для функций pcaPlot, kmeans, limma

 Код для поддержки актуального ключа сессии с ExpressionSet

# Запуск приложения

- Два варианта запуска и использования Webприложения:
  - 1. Запустить R-пакет phantasus через R непосредственно
  - 2. Загрузить Docker-образ и запустить от него Docker-контейнер
- Приложение работает в режиме single-user
- Для запуска параллельных сессий используется balancer в apache2

## Внедрение

- Веб-приложение используется в лаборатории
  Максима Артемова в Washington University in St. Louis
- Демонстрация приложения входит в программу семинара по системной биологии:
  - Сидней, Австралия, 10-13 апреля 2017 г.
    (<u>https://register.gimr.garvan.org.au/systemsbiology/</u>)
  - Санкт-Петербург, 14-19 мая 2017 г.
    (<a href="http://bioinformaticsinstitute.ru/sbw2017">http://bioinformaticsinstitute.ru/sbw2017</a>)

# Доступность

- https://artyomovlab.wustl.edu/phantasus
- Скоро на genome.ifmo.ru

- Код доступен на github под MIT
  - https://github.com/ctlab/phantasus R-пакет
  - https://github.com/ctlab/phantasus.js js-клиент
- Docker-oбраз
  - https://hub.docker.com/r/dzenkova/phantasus

# Результаты

- Применен способ взаимодействия между јѕ-клиентом и R через OpenCPU
- Реализован интерфейс для функций: pcaPlot, kmeans, limma
- Добавлена возможность загружать данные из GEO
- Все компоненты соединены в приложении phantasus
- Приложение было внедрено в лаборатории, а также представлено на семинаре по системной биологии

## Дальнейшая деятельность по проекту


- Добавить автоматическое тестирование как для JavaScript-кода и R-кода проекта phantasus
- Подробно документировать весь исходный код
- Подготовить проект к добавлению в Bioconductor и подать заявку
- Внедрить Google Analytics для сбора статистики об использовании веб-приложения

Реализация эффективного взаимодействия между платформой для анализа экспрессии генов Morpheus и библиотекой вычислительных методов R/Bioconductor

Зенкова Д.М., группа М3436,


руководитель: Сергушичев А.А., к.т.н.

# Визуализация метода главных компонент: pcaPlot




# Кластеризация генов: kmeans

#### Ключ сессии с ES Количество кластеров




#### Рендер аннотации





Анализ дифференциальной экспрессии:





# Gene Expression Omnibus

Series GSE14308 Query DataSets for GSE14308 Status Public on Ian 08, 2009 Title Epigenetic Mechanisms Underlie T Cell Plasticity Mus musculus Organism Experiment type Expression profiling by array Summary Multipotential naïve CD4+ T cells differentiate into distinct lineages including T helper 1 (Th1), Th2, Th17, and inducible T regulatory (iTreg) cells. The remarkable diversity of CD4+ T cells begs the question whether the observed changes reflect terminal differentiation with heritable epigenetic modifications or plasticity in T cell responses. We generated genome-wide histone H3 lysine 4 (H3K4) and lysine 27 (H3K27) trimethylation maps in naïve, Th1, Th2, Th17, iTreg, and natural (n)Treg cells. We found that although modifications of signature cytokine genes (Ifng, II4, and II17) partially conform to the expectation of lineage commitment, critical transcription factors such as Tbx21 exhibit a broad spectrum of epigenetic states, consistent with our Samples (12) GSM357839 Th2-1 demonstration of T-bet and IFN-gamma induction in nTreg cells. Our data ■ Less... suggest an epigenetic mechanism underlying the specificity and plasticity of GSM357841 Th2-2 effector and regulatory T cells and also provide a framework for understanding GSM357842 Th1-2 complexity of CD4+ T helper cell differentiation. GSM357843 Th17-1 Overall design Different T helper subsets are profiled for mRNA expression. GSM357844 Th1-1 Contributor(s) Wei L, Wei G, Zhu J, Hu-Li J, O'Shea JJ, Zhao K GSM357845 Th17-2 Wei G, Wei L, Zhu J, Zang C et al. Global mapping of H3K4me3 and H3K27me3 Citation(s) GSM357847 Naive-1 reveals specificity and plasticity in lineage fate determination of differentiating CD4+ T cells. Immunity 2009 Jan 16;30(1):155-67. PMID: 19144320 GSM357848 Naive-2 Submission date Jan 06, 2009 GSM357849 iTreg-1 Last update date Apr 17, 2017 GSM357850 iTreg-2 Contact name Lai Wei E-mail weil2@mail.nih.gov GSM357852 nTreg-1 Phone 3014961480 GSM357853 nTreq-2 Organization name NIH/NEI/NCCAM Street address 10 Center Dr. Room 2B47 City Bethesda State/province MD ZIP/Postal code 20892 USA Country Platforms (1) GPL1261 [Mouse430 2] Affymetrix Mouse Genome 430 2.0 Array Samples (12) GSM357839 Th2-1 # More... GSM357841 Th2-2 GSM357842 Th1-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo

# Получение данных из GEO: loadGEO





# checkpoint:

- На примере добавленных методов показано, что можно удобно внедрять новые функции в phantasus.
- Таким образом, дальнейшее расширение можно проводить аналогичным путем.