

GUÍA BABY MATHEW IA

Cómo tener un embarazo saludable

Una guía breve y clara, trimestre a trimestre, para cuidar tu cuerpo, tus emociones y saber cuándo consultar.

bebeteguia.com

INTRODUCCIÓN

Bienvenida

Si estás leyendo esto, probablemente acabas de recibir una de las noticias más grandes de tu vida — o estás acompañando a alguien que la está viviendo. El embarazo trae alegría, pero también muchas preguntas: qué es normal, qué comer, cuánto moverte, y cuándo una molestia deja de ser "normal" y hay que consultar.

Esta guía resume, de forma breve y práctica, lo esencial de cada trimestre: qué esperar, qué cuidados priorizar y qué señales nunca debes pasar por alto. Está basada en guías clínicas reconocidas — OMS, ACOG, la Academia Americana de Pediatría y las guías alimentarias del ICBF para Colombia — pero no reemplaza tu control prenatal ni el criterio de tu médico tratante.

> **Cómo usar esta guía:** léela completa una vez al confirmar el embarazo, y vuelve a la sección de tu trimestre actual cuando la necesites. El capítulo de "señales de alarma" (página 7) es el más importante — guárdalo a la mano.

Contenido

01 Primer trimestre (semanas 1-13) pág. 3

02 Segundo trimestre (semanas 14-27) pág. 4

03 Tercer trimestre (semanas 28-40) pág. 5

04 Alimentación y ejercicio seguro pág. 6

05 Salud emocional en el embarazo pág. 7

06 Señales de alarma — cuándo consultar ya pág. 7

07 Maleta del parto — checklist pág. 8

SEMANAS 1 – 13

Primer trimestre

Qué es esperable sentir

- Náuseas y vómitos ("náuseas matutinas", aunque pueden darse a cualquier hora), que suelen mejorar hacia la semana 12-14.
- Fatiga intensa, por el aumento de progesterona.
- Sensibilidad y aumento del tamaño de los senos, cambios de humor y más ganas de orinar.
- Antojos o rechazo a ciertos alimentos.
- Un manchado leve alrededor de la semana 4-5 (implantación) es distinto de un sangrado abundante — si tienes dudas, consulta.

Qué priorizar

- Comidas pequeñas y frecuentes: ayudan con las náuseas y evitan el estómago vacío.
- Hidratación constante, en sorbos si hay náuseas.
- Confirmar o iniciar la suplementación con ácido fólico y agendar tu primer control prenatal.

> **Vale la pena saber:** es normal sentir ansiedad o incertidumbre en estas primeras semanas — es un período de adaptación emocional, también para tu pareja o acompañante.

Cuándo pedir una cita (no es urgencia, pero sí revisar)

- Náuseas tan fuertes que no logras retener líquidos por más de 24 horas.
- Cualquier duda sobre si un medicamento que ya tomas es seguro en el embarazo — eso siempre se consulta con tu médico, nunca se decide por cuenta propia.

SEMANAS 14 – 27

Segundo trimestre

Qué es esperable sentir

- Las náuseas suelen ceder y la energía mejora.
- Primeros movimientos fetales perceptibles — entre la semana 18-22 en un primer embarazo, antes si no es el primero.
- Punzadas en la ingle o bajo vientre al cambiar de posición (dolor ligamentario, por el estiramiento de los ligamentos que sostienen el útero).
- Cambios en la piel (manchas, línea en el abdomen), congestión nasal y calambres nocturnos en las piernas.

Qué priorizar

- Familiarizarte con el patrón habitual de movimiento de tu bebé, sin necesidad de contarlos de forma obsesiva salvo que tu médico lo indique.
- Asistir a la ecografía morfológica y los controles de rutina según tu calendario de atención.
- Si tu sistema de salud lo ofrece, este es buen momento para iniciar un curso de preparación para el parto.

> **Vale la pena saber:** el dolor ligamentario leve y pasajero es normal; si el dolor pélvico es intenso y persistente, eso sí amerita consulta.

Señal de alarma de este trimestre

- Ausencia de movimiento fetal una vez que ya tenías un patrón regular establecido — consulta de inmediato, no esperes a que "se mueva más tarde".

SEMANAS 28 – 40

Tercer trimestre

Qué es esperable sentir

- Dificultad para dormir, falta de aire leve al esfuerzo, hinchazón en pies y tobillos al final del día.
- Contracciones de Braxton-Hicks: irregulares, que no aumentan en frecuencia ni intensidad, y ceden con reposo o hidratación.
- Más ganas de orinar y dolor de espalda baja.

La regla práctica para saber cuándo ir a la clínica

A partir de la semana 37 (embarazo a término), usa la **regla 5-1-1**: contracciones cada 5 minutos, de 1 minuto de duración cada una, durante al menos 1 hora. También debes ir ante ruptura de membranas o sangrado, sin importar el patrón de contracciones.

> **Vale la pena saber:** es común que la ansiedad crezca cerca de la fecha probable de parto — miedo al dolor, o a si sabrás cuidar al bebé. Que tu pareja o acompañante participe activamente de la preparación ayuda a reducirla y fortalece el vínculo con el bebé.

Cuándo pedir una cita (control, no emergencia)

- Contracciones antes de la semana 37 que no cumplen el patrón de emergencia descrito en la página 7.
- Dudas sobre posición fetal, peso estimado o resultados de exámenes — siempre se resuelven en el control prenatal.

CAPÍTULO 4

Alimentación y ejercicio seguro

Alimentación

No es necesario "comer por dos" en cantidad — lo que más importa es la calidad y variedad, no el volumen.

- Incluye a diario cereales, frutas y verduras de distintos colores, leguminosas, carnes/huevo/lácteos y grasas saludables.
- Prioriza alimentos ricos en hierro (carnes rojas, vísceras, leguminosas) y ácido fólico (verduras de hoja verde).
- Evita por completo el alcohol y limita la cafeína.
- Evita crudos o mal cocidos (carnes, huevo, pescado crudo, lácteos no pasteurizados) por riesgo de listeriosis, toxoplasmosis y salmonelosis.

Fuente: Guías Alimentarias ICBF para gestantes (Colombia).

Ejercicio

En un embarazo de bajo riesgo y sin contraindicación médica, moverte es seguro y recomendado.

- Caminar, nadar, bicicleta estática, yoga y pilates prenatal son buenas opciones.
- Meta general: 150 minutos de actividad moderada a la semana, repartidos en varios días.
- Evita deportes de contacto o caída, buceo, y ejercicios boca arriba prolongados tras el primer trimestre.
- Detente y consulta si sientes sangrado, mareo intenso, dolor de pecho o contracciones durante el ejercicio.

Fuente: recomendaciones OMS / ACOG.

Vacunación en el embarazo

La influenza (en cualquier trimestre) y la tosferina/Tdap (usualmente semana 27-36) son vacunas recomendadas en la mayoría de los esquemas, incluido Colombia. La evidencia actual respalda su seguridad en el embarazo. Confirma el esquema vigente y el momento exacto con tu médico tratante o tu EPS/IPS.

Salud emocional y señales de alarma

Lo emocional también es parte del embarazo

Cambios de ánimo, ansiedad leve o preocupación son comunes por los cambios hormonales y la adaptación al nuevo rol — no todo malestar emocional es un trastorno. Hablar abiertamente con tu pareja, familia o equipo de salud reduce el estigma y facilita pedir ayuda a tiempo.

La OMS reconoce que la ansiedad y depresión perinatal son frecuentes — afectan aproximadamente a 1 de cada 5 mujeres gestantes — y son tratables. Si notas tristeza persistente, ansiedad excesiva o pérdida de interés por más de dos semanas que afecta tu día a día, busca apoyo profesional de salud mental.

⚠ Señales de alarma — consulta de inmediato

- Sangrado vaginal abundante
- Dolor abdominal intenso y súbito
- Disminución marcada o ausencia de movimientos fetales (patrón ya establecido)
- Dolor de cabeza intenso con visión borrosa, o hinchazón repentina de cara/manos
- Fiebre alta
- Ruptura de membranas antes de la semana 37
- Contracciones regulares en aumento (patrón 5-1-1) antes de la semana 37
- Pensamientos de autolesión, o de hacerte daño o dañar al bebé, en cualquier momento del embarazo o posparto

Ante cualquiera de estas señales, contacta a tu médico tratante o acude a urgencias — no esperes a que "se te pase".

Líneas en Colombia: Emergencias 123 · Apoyo en salud mental (Minsalud) 192, opción 4.

Maleta del parto — checklist

Prepárala a partir de la semana 36. Tenerla lista con anticipación quita una preocupación de encima cuando llegue el momento.

- [ ] Documentos: carné prenatal, carné de EPS, identificación
- [ ] Ropa cómoda para ti (bata, medias, ropa interior desechable)
- [ ] Ropa de bebé: body, gorro, cobija, pañales talla recién nacido
- [ ] Artículos de aseo personal
- [ ] Cargador de celular
- [ ] Snacks para tu acompañante
- [ ] Silla para el carro (obligatoria en muchas instituciones para la salida)

En casa

- [ ] Cuna o moisés listo
- [ ] Pediatra de cabecera ya elegido, si es posible

Señales de inicio de trabajo de parto verdadero

Contracciones regulares que aumentan en frecuencia, duración e intensidad — a diferencia de las Braxton-Hicks. Pueden acompañarse de expulsión del tapón mucoso o ruptura de membranas. Recuerda la regla 5-1-1 de la página 5.



¿Y después de esta guía?

Esto es solo el comienzo. Baby Mathew IA te acompaña semana a semana, resolviendo tus dudas en el momento en que las tienes — en gestación y durante los primeros dos años de tu bebé.

Sigue la conversación con Baby Mathew

Pregúntale lo que quieras, cuando quieras, gratis.

bebeteguia.com

Esta guía es material informativo general, elaborado con base en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos del ICBF para Colombia. No sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Ante cualquier duda sobre tu embarazo o tu salud, consulta siempre a tu médico tratante o acude al servicio de urgencias.

© Baby Mathew IA — bebeteguia.com