

GUÍA BABY MATHEW IA

Papá primerizo: tu papel en las primeras semanas

Apoyo a tu pareja, cuidados básicos del bebé, el tetero y tus derechos como papá en Colombia — lo esencial para sentirte seguro desde el primer día.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido

Es fácil sentir que el protagonismo de estas semanas es de tu pareja y del bebé, y que tu papel es "ayudar" desde un segundo plano. No es así: lo que hagas o dejes de hacer en los primeros días tiene un efecto real en cómo se recupera tu pareja, en cómo se adapta tu bebé y en el vínculo que vas a construir con él o ella. No necesitas experiencia previa — se aprende hombro a hombro, con información clara y sin miedo a preguntar.

Esta guía reúne lo esencial para los primeros meses: cómo acompañar la recuperación física y emocional de tu pareja, los cuidados básicos del bebé que puedes dominar tú solo, cómo apoyar en la alimentación (incluido el tetero), el vínculo afectivo, y tus derechos laborales como papá en Colombia. Está basada en recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), la OMS, los CDC y la normativa laboral colombiana vigente, pero no reemplaza el criterio médico de los profesionales que atienden a tu pareja y a tu bebé.

> **Cómo usar esta guía:** si el parto ya ocurrió, ve directo al capítulo 2 (apoyo a tu pareja) y al capítulo 7 (señales de alarma) — son los más urgentes. El resto puedes leerlo con calma en las primeras semanas.

Contenido

01 Tu nuevo rol: qué puedes hacer desde el día uno — pág. 3

02 Apoyo a tu pareja en el postparto — pág. 4

03 Cuidados básicos del bebé que puedes dominar — pág. 5

04 Apoyo en la alimentación: el tetero y la lactancia — pág. 6

05 El vínculo afectivo con tu bebé — pág. 7

06 Licencia de paternidad y derechos laborales — pág. 7

07 Señales de alarma — en el bebé y en tu pareja — pág. 8

08 Checklist: tu kit de papá primerizo — pág. 8

DÍA 1 EN ADELANTE

Tu nuevo rol: qué puedes hacer desde el día uno

Qué puedes hacer tú, sin que nadie te lo pida

- **Piel con piel** con tu bebé: calma su llanto, regula su temperatura y ritmo cardíaco, y construye vínculo contigo igual que lo hace con mamá.
- **Cambiar el pañal, bañarlo, cargarlo y dormirlo**: no son tareas "de mamá". Entre más lo practiques, más seguro te vas a sentir.
- **Hacerte cargo de la logística**: registro civil del bebé, trámites con la EPS, afiliación como beneficiario, citas de control — libera a tu pareja de preocuparse por eso.
- **Filtrar visitas**: decide con tu pareja cuántas visitas y de cuánto tiempo son razonables las primeras semanas, y sé quien pone el límite si hace falta.
- **Acompañar las consultas médicas**: de tu bebé y de tu pareja. Una segunda persona que escuche las indicaciones ayuda a no olvidar nada.

Qué priorizar en las primeras dos semanas

- Que tu pareja duerma y coma. Si alguien más puede cocinar, limpiar o hacer mercado, acepta la ayuda.
- Aprender a leer las señales del bebé: hambre, sueño, incomodidad (lo ves en el capítulo 3).
- Hablar con tu pareja sobre cómo se van a turnar en las noches — no es necesario improvisar cada noche.

> **Vale la pena saber:** la confianza no llega de golpe. Los primeros cambios de pañal o los primeros baños pueden sentirse torpes para cualquier papá. Es normal — se vuelve automático con la repetición, no con la experiencia previa.

CAPÍTULO 2

Apoyo a tu pareja en el postparto

Recuperación física

- El sangrado postparto (loquios) puede durar varias semanas, disminuyendo poco a poco. Si hubo cesárea, hay además una herida que requiere cuidado e implica más límites de movimiento las primeras semanas.
- El cuerpo necesita descanso real, no solo "no hacer ejercicio". Encárgate de que las tareas del hogar no recaigan en ella mientras se recupera.
- Pregunta directamente cómo se siente físicamente, en vez de asumir que "ya está bien" porque no se queja.

Salud emocional: "baby blues" vs. depresión posparto

	"Baby blues"	Posible depresión posparto
Cuándo aparece	Días 3 a 10 después del parto	Puede aparecer en cualquier momento del primer año
Qué se ve	Llanto fácil, cambios de ánimo, irritabilidad leve	Tristeza profunda, desconexión del bebé, ansiedad intensa, culpa excesiva
Cuánto dura	Mejora sola en 1-2 semanas	Persiste más de 2 semanas o se intensifica
Qué hacer	Acompañar, descanso, paciencia	**Buscar ayuda profesional** cuanto antes

Formas concretas de ayudar: encárgate de una o dos tomas nocturnas (con tetero de leche extraída o fórmula, capítulo 4), cocina o consigue comida lista, protege sus horas de sueño, y dile explícitamente que lo está haciendo bien — se escucha menos de lo que se necesita.

Importante: la depresión posparto no es "falta de voluntad" ni algo que se supera sola con fuerza de voluntad. Si notas tristeza persistente, desconexión del bebé o comentarios sobre no sentirse capaz, acompáñala a buscar ayuda — ver señales de alarma en la página 8.

CAPÍTULO 3

Cuidados básicos del bebé que puedes dominar

Lo esencial del día a día

- **Pañal:** revisa cada 2-3 horas o al notar incomodidad. Limpia de adelante hacia atrás (especialmente en niñas) y deja secar bien la piel antes de cerrar.
- **Cordón umbilical:** mantenlo limpio y seco hasta que se caiga solo (1-2 semanas); no lo cubras ni apliques nada salvo indicación médica.
- **Baño:** 2-3 veces por semana es suficiente en el recién nacido; agua tibia (no caliente), sin dejarlo solo ni un segundo.
- **Cómo cargarlo:** sostén siempre cabeza y cuello — el bebé no controla esa zona solo hasta los 3-4 meses.
- **Sueño seguro (AAP):** siempre boca arriba, en su propia cuna o moisés, colchón firme, sin almohadas, cobijas sueltas ni peluches dentro de la cuna.

Aprende a leer sus señales

Señal	Puede significar
Se lleva las manos a la boca, gira buscando	Hambre (señal temprana — no esperes al llanto)
Se frota los ojos, bosteza, mira hacia otro lado	Sueño — es momento de bajar el estímulo
Llanto agudo y repentino	Puede ser dolor; revisa pañal, temperatura y posición
Se arquea o encoge las piernas después de comer	Gases o cólico — prueba sacarle el aire o "bicicleta" suave

> **Practica tú también:** no esperes a que tu pareja "te enseñe" cada vez. Ofrécete a cambiar el pañal o dormirlo sin que te lo pidan — así ambos ganan confianza y ella gana horas de descanso.

CAPÍTULO 4

Apoyo en la alimentación: el tetero y la lactancia

Si tu pareja amamanta, así puedes ayudar

- Tráele al bebé para las tomas nocturnas y llévatelo de vuelta a la cuna después, para que ella no tenga que levantarse del todo.
- Ten agua y algo para picar cerca de donde amamanta — da sed y hambre durante la toma.
- Asúmete una o dos tomas con leche materna extraída, para que ella duerma un tramo largo sin interrupciones.
- Si algo duele o se ve mal (grietas, pechos muy duros, fiebre), acompáñala a consultar pronto — no es "normal aguantar".

El tetero: alimentación con biberón

Ya sea con leche materna extraída o con fórmula, dar el tetero es una forma directa en la que tú alimentas a tu bebé — y una oportunidad real de vínculo.

- **Postura:** bebé semi-erguido (no acostado boca arriba), apoyado en tu brazo, con la cabeza más alta que el cuerpo.
- **Biberón casi horizontal**, no vertical: así el bebé controla el ritmo y no se ahoga ni traga aire de más (alimentación a ritmo o "paced feeding").
- Haz pausas a mitad de la toma para sacarle el aire, y ofrece de nuevo si quiere seguir.
- **Nunca fuerces** a terminar el biberón: el bebé decide cuánto necesita.
- Al terminar, sostenlo erguido contra tu hombro unos minutos para sacar los gases.

Si usas leche materna extraída

Dónde	Tiempo máximo
Temperatura ambiente (hasta 25 °C)	Hasta 4 horas
Nevera	Hasta 4 días
Congelador	6 a 12 meses

Descongela en la nevera o bajo agua tibia corriente — nunca en microondas: calienta de forma despareja y puede quemar al bebé (CDC).

> **Dato útil:** si el bebé toma pecho, algunos prefieren esperar a que la lactancia esté bien establecida (3-4 semanas) antes de introducir el tetero regularmente, para evitar confusión en el agarre. Coordina esto con el pediatra o consultor de lactancia de tu pareja.

CAPÍTULOS 5 Y 6

El vínculo afectivo y tus derechos laborales

El vínculo afectivo con tu bebé

No existe un "instinto paternal" que se activa solo con ver al bebé — el vínculo se construye con tiempo compartido, igual que cualquier relación importante. Mientras más te involucres en el día a día (bañarlo, dormirlo, hablarle, jugar con él), más rápido y más fuerte se construye esa conexión, tanto para él como para ti.

- Háblale aunque no entienda las palabras: reconoce tu voz y se calma con ella.
- Busca ratos de contacto piel con piel, especialmente en los primeros meses.
- No compares tu forma de cuidarlo con la de tu pareja — hay más de una manera correcta de calmar o cargar a un bebé.

Licencia de paternidad y derechos laborales en Colombia

- **Licencia de paternidad:** 2 semanas remuneradas, reconocidas por la EPS de forma proporcional a las semanas que hayas cotizado durante la gestación (Ley 2114 de 2021).
- **Trámite:** el soporte principal es el Registro Civil de Nacimiento del bebé, que debes presentar a tu empleador dentro de los 30 días siguientes al nacimiento.
- **Licencia parental compartida:** tú y tu pareja pueden acordar que tú tomes las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad de ella (las primeras 12 semanas posteriores al parto son intransferibles para la mamá). Es voluntaria y requiere autorización del médico tratante y aviso al empleador.

Verifica las condiciones vigentes con tu empleador y tu EPS — esta información es general y no sustituye asesoría legal individual.

Señales de alarma y tu kit de papá primerizo

⚠ En tu bebé — consulta de inmediato

- Fiebre (38 °C o más) en menor de 3 meses
- Rechazo total del alimento en varias tomas seguidas, o muy difícil de despertar para comer
- Menos de 3-4 pañales mojados en 24 horas
- Piel u ojos amarillos que aparecen o se intensifican después del alta
- Vómito en proyectil repetido, o con sangre o color verde
- Dificultad para respirar, quejido o color azulado

⚠ En tu pareja — consulta de inmediato

- Fiebre, sangrado abundante (empapar una toalla en una hora) o dolor intenso que no cede
- Dolor, hinchazón o calor fuerte en una pierna (riesgo de trombosis), o dolor en el pecho con dificultad para respirar
- Tristeza persistente por más de 2 semanas, desconexión del bebé, o pensamientos de hacerse daño o de dañar al bebé — esto es una urgencia, no esperes

Líneas en Colombia: Emergencias 123 · Apoyo en salud mental (Minsalud) 192, opción 4.

Checklist: tu kit de papá primerizo

- [ ] Pañales talla recién nacido y una muda de ropa extra, listos desde antes del parto
- [ ] Cargador o portabebé ergonómico para tener las manos libres
- [ ] Contactos guardados: pediatra, EPS, consultor de lactancia o grupo de apoyo
- [ ] Acuerdo claro con tu pareja sobre los turnos de la noche
- [ ] Registro Civil del bebé tramitado dentro de los primeros 30 días
- [ ] Agua, snacks y comida lista a la mano para tu pareja
- [ ] Tu propia red de apoyo: alguien con quien hablar si te sientes abrumado



¿Y después de esta guía?

Ser papá primerizo se aprende sobre la marcha, y está bien no saberlo todo desde el día uno. Baby Mathew IA te acompaña a ti también, resolviendo dudas sobre el embarazo y el cuidado del bebé durante sus primeros dos años.

Sigue la conversación con Baby Mathew

Pregúntale lo que quieras, cuando quieras, gratis.

bebeteguia.com

Fuentes de referencia

- Academia Americana de Pediatría (AAP). Participación del padre, sueño seguro y alimentación con biberón.
- OMS / UNICEF. Recomendaciones sobre lactancia materna y alimentación del lactante.
- CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Extracción, conservación y preparación de la alimentación del bebé.
- Paulson, J.F. & Bazemore, S.D. (2010). Depresión posparto paterna — estimaciones de prevalencia.
- Ley 2114 de 2021 (licencia de paternidad y licencia parental compartida) · Ley 1822 de 2017 (licencia de maternidad) · Código Sustantivo del Trabajo.

Esta guía es material informativo general. No sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud, ni asesoría legal individual. Ante cualquier duda sobre la salud del bebé o de tu pareja, consulta siempre a su médico tratante o acude al servicio de urgencias.

© Baby Mathew IA — bebeteguia.com