Клинические рекомендации

# Множественные переломы мозгового и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **S02.0** — Перелом свода черепа<br>**S02.1** — Перелом основания черепа<br>**S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти<br>**S02.6** — Перелом нижней челюсти<br>**S02.7** — Множественные переломы черепа и лицевых костей<br>**S02.8** — Переломы других лицевых костей и костей черепа<br>**S02.9** — Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей<br>**S07** — Размозжение головы |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Ассоциация нейрохирургов России; Ассоциация травматологов-ортопедов России; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Всероссийское Общество по детской нейрохирургии |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/871_1 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

**3. Диагностика** 5

3.1 Догоспитальный этап 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия 6

3.4 Анализы крови и мочи 6

3.5 Компьютерная томография 6

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа 7

3.7 Консультации специалистов 7

**4. Лечение** 7

4.1 Консервативное лечение 7

4.2 Сроки репозиции и иммобилизации отломков 7
4.3 Ортопедическое лечение 8
4.4 Хирургическое лечение 8
4.5 Антибактериальная профилактика 9
4.6 Антибактериальная терапия 10
4.7 Обезболивание и иное лечение 10
**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11**
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Медицинская реабилитация 11
5.3 Диспансерное наблюдение 11
**6. Источник и актуальность 11**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

## 1. Основные положения

- Черепно-лицевая травма — повреждение мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа. При подозрении на перелом черепа показана экстренная госпитализация в специализированный стационар.
- Первоочередные задачи на месте: восстановление дыхания (асфиксия при переломах челюстей), остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, экстренная доставка в стационар.
- Базальная ликворея — признак перелома основания черепа. Её отличают от отделяемого из носа по глюкозе и специфическим маркерам (beta-2 transferrin); фистулу закрывают хирургически при неэффективности консервативной терапии в течение **5–7 дней**, в том числе эндоназально эндоскопически.
- При кровотечении из носа с угрозой аспирации — интубация или S-образный воздуховод и передняя и задняя тампонада носа; при профузных рецидивирующих носовых кровотечениях — эндоваскулярная эмболизация или эндоназальная перевязка (коагуляция) крылонёбной артерии.
- В стационаре — МСКТ головного мозга и лицевого отдела черепа; консультации нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога и оториноларинголога.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определения

Множественная травма — травма, в результате которой возникло два и более повреждения мягких тканей и (или) костей в пределах одной анатомической области.

Черепно-лицевая (краниофациальная) травма — повреждения мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа.

Перелом костей основания черепа — повреждение основания черепа с нарушением его анатомической целостности и функциональными расстройствами; к ним относятся переломы глазничной поверхности лобной кости, пирамиды височной кости, решётчатой пластинки, клиновидной кости, затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие.

Вдавленный перелом черепа — перелом, при котором фрагменты кости смещаются более чем на толщину прилежащей кости.

Повреждения средней зоны лица чаще всего множественные и сочетанные. При одновременном повреждении костей носа, решётчатой кости и других костей средней зоны их объединяют понятием травмы средней зоны лица. Сочетанные повреждения вызывают «синдром взаимного отягощения».

### 2.2 Этиология и эпидемиология

Переломы лицевого черепа составляют 3–4% травм с повреждением костей: нижняя челюсть — 65,1%, скуловая кость и дуга — 12,8%, кости носа — 3,8%, верхняя челюсть — 2,0%. Причины — ДТП, падения с высоты, реже производственная и спортивная травма. Переломы челюстей в пределах зубного ряда считаются заведомо открытыми.

Переломы основания черепа составляют 4% тяжёлых ЧМТ; у 32–59% линия перелома переходит со свода на основание. Летальность при сочетанной черепно-лицевой травме у детей — 7,1–22%.

### 2.3 Классификация

**Локализация переломов по зонам лица**

1. **верхняя зона лица** — передняя стенка лобной пазухи, крыша глазницы
2. **средняя зона лица** — назоэтмоидальный комплекс, кости носа, скулоорбитальный комплекс, верхняя челюсть по верхнему, среднему и нижнему уровню, альвеолярный отросток
3. **нижняя зона лица** — нижняя челюсть

Переломы костей носа рассматриваются в отдельных КР (оториноларингология), переломы орбиты — в офтальмологических; здесь они упоминаются только в составе множественных переломов.

**Классификация черепно-лицевой травмы**

1. **субкраниальные** — назоорбитальные и назомаксиллярные, центральные (Ле Фор I, II, Вассмунд I, II), центролатеральные (Ле Фор III, Вассмунд IV), латеральные (скуловая кость, дуга, скулоорбитальный комплекс)
2. **краниофациальные** — верхняя и средняя зоны лица с передней черепной ямкой; панфациальные — все зоны лица и основание черепа
3. **фронтофациальные** — передняя черепная ямка и верхняя зона: стенки лобной пазухи, верхний край и стенка орбиты, решётчатая пластинка, задние решётчатые ячейки, верхняя и латеральная стенки клиновидной пазухи

Из-за плотного прилегания твёрдой мозговой оболочки и сообщения с пазухами большинство переломов основания черепа рассматриваются как открытые проникающие; они возможны даже при незначительной травме.

### 2.4 Клиническая картина

**Признаки перелома основания черепа**

1. гипосмия или аносмия;
2. базальная ликворея;
3. глазодвигательные нарушения (III, IV, VI нервы), повреждение зрительного нерва;
4. одно- и двусторонние нарушения слуха, спонтанный нистагм;
5. при поперечном переломе пирамиды — выпадение слуха и вестибулярной функции, повреждение лицевого нерва.

**Наружные признаки, указывающие на характер перелома**

1. периорбитальная гематома (симптом «очков») **через 12–48 часов** — перелом передней черепной ямки;
2. гематома в области сосцевидного отростка (симптом Бэттла), лагофтальм, асимметрия лица — перелом пирамиды височной кости, парез лицевого нерва;
3. гемотимпанум или разрыв барабанной перепонки — возможный перелом основания черепа;
4. рино- или отоликворея — перелом передней или средней черепной ямки;
5. эмфизема лица — перелом лицевых костей, возможно дна передней черепной ямки;
6. экзофтальм с отёком конъюнктивы — каротидно-кавернозное соустье или ретробульбарная гематома;
7. кровотечение из носа или ушей, нарушение слуха, нистагм, рвота.

Раннюю ликворею трудно распознать при сочетании с кровотечением; помогает проба со светлым ободком вокруг кровянистого пятна на марлевой салфетке.

**Симптомы при повреждениях зон лица**

1. **верхняя зона** — асимметрия, параорбитальные гематомы, симптом «лица панды» в первые часы, истинный симптом «очков» через сутки, затруднение носового дыхания, диплопия, эмфизема, кровотечение и (или) ликворея из носа
2. **средняя зона** — уплощение средней зоны, деформация носа, симптом «очков», затруднение носового дыхания, кровотечение и (или) ликворея из носа, подвижность фрагментов, нарушение прикуса и открывания рта
3. **нижняя зона** — симптом «ступеньки», патологическая подвижность фрагментов, симптом непрямой нагрузки, нарушение движений челюсти и прикуса

Симптомы множественных переломов лица малозаметны из-за отёка и кровоизлияний; даже при кровотечении и ликворее их не всегда вовремя диагностируют у тяжелопострадавших с явными повреждениями других областей.

---

## 3. Диагностика

### 3.1 Догоспитальный этап

**Признаки перелома лицевых костей на догоспитальном этапе**

1. деформация лица за счёт западения или отёка;
2. нарушение прикуса;
3. нарушение чувствительности в зоне подглазничного и (или) подбородочного нерва;
4. ограничение подвижности нижней челюсти;
5. патологическая подвижность и крепитация отломков, положительная проба непрямой нагрузки.

**Восстановление дыхания**

1. осмотр и санация полости рта: сгустки, осколки зубов, инородные тела;
2. при двустороннем переломе нижней челюсти — фиксация языка;
3. боковое стабильное положение;
4. при отёке, затрудняющем дыхание, — S-образный воздуховод.

Асфиксия при челюстно-лицевых ранениях: дислокационная (40%), обтурационная (29%), стенотическая (23%), клапанная (5%), аспирационная (3%).

Остановка кровотечения: зажим, тугая тампонада раны, жгут на шею через поднятую противоположную руку, пальцевое прижатие. Транспортная иммобилизация — стандартная повязка или теменно-подбородочная пращевидная повязка.

**Очерёдность медицинской эвакуации**

1. **первая очередь** — тяжёлое и крайне тяжёлое состояние: нарушение сознания, очаговая неврологическая симптоматика, продолжающееся кровотечение, ликворея, нарушение дыхания, тахикардия 100 и более, АД 100 мм рт. ст. и ниже, гемоглобин менее 100 г/л
2. **вторая очередь** — удовлетворительное или среднетяжёлое состояние с множественными повреждениями, подозрением на сотрясение мозга, возрастом **старше 60 лет**, сопутствующими заболеваниями
3. **третья очередь** — изолированная травма челюстно-лицевой области без неврологической симптоматики и кровотечения

### 3.2 Жалобы и анамнез

Анамнез собирают у пострадавшего, сопровождающих и из листа скорой помощи.

**Что уточнить**

1. механизм травмы, травмирующий предмет, время и место;
2. нарушение сознания и амнезию, их длительность;
3. прививку от столбняка, аллергию, сопутствующие заболевания;
4. лечение до поступления и его результат.

### 3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия

Всем — оценка общего состояния, осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области; выявляют признаки перелома черепа, следы кровотечения, истечения ликвора или детрита из раны.

**Что отметить при осмотре**

1. деформацию и симметричность лица, отёк, гематомы, раны, эмфизему;
2. движения глазных яблок, межкантальное расстояние;
3. кровотечение или ликворею из носа, уплощение средней зоны лица;
4. зоны нарушения чувствительности;
5. открывание рта, прикус, болезненность при перкуссии зубов.

При кровотечении и переломах основания и лицевого отдела черепа с угрозой аспирации — срочная интубация трахеи или S-образный воздуховод; механическая остановка кровотечения — передняя и задняя тампонада носа и ротоглотки.

Высокий риск осложнений: асфиксия, анемия, бронхолёгочные гнойные заболевания, синуситы, внутричерепные гнойные осложнения, травматический остеомиелит, посттравматическая деформация.

Тяжесть состояния оценивают нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, при сочетанной травме — травматолог и хирург.

### 3.4 Анализы крови и мочи

Всем — лабораторные исследования для оценки тяжести (общий анализ крови и мочи и др.); при ЧМТ — по рекомендациям «Очаговая травма головного мозга» и «Черепно-мозговая травма у детей».

### 3.5 Компьютерная томография

В стационаре — МСКТ; всем с подозрением на перелом черепа при поступлении — КТ головного мозга. При необходимости — конусно-лучевая КТ, особенно для средней зоны лица.

**ЛОР-структуры при МСКТ**

1. верхнечелюстные пазухи: положение, симметричность, гемосинус, повреждение стенок;
2. решётчатые ячейки, лобные и клиновидная пазухи;
3. кости носа, перегородка, носовые раковины, сошник.

**Поиск ликворной фистулы**

1. КТ с толщиной срезов 1–3 мм и коронарной реконструкцией: решётчатая пластинка, стенки решётчатых ячеек, верхняя стенка клиновидной пазухи, крыша барабанной полости;
2. аксиальные срезы: задняя стенка лобной пазухи, стенки клиновидной пазухи, ячейки сосцевидного отростка;
3. визуализация самой фистулы: КТ-цистернография.

По показаниям — МРТ головного мозга и лицевого черепа (кровоизлияния, эмфизема в тканях глазницы); КТ-ангиография — при вдавленном переломе над крупными венозными синусами.

При отсутствии КТ — рентгенография черепа как минимум в 2 проекциях.

### 3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа

Спинномозговая пункция — при подозрении на интракраниальные гнойные осложнения, при отсутствии признаков дислокации.

При подозрении на базальную ликворею исследуют глюкозу в отделяемом из носа и уха. В ликворе глюкозы больше (2,3–4,0 ммоль/л), а белка меньше (0,10–0,22 г/л), чем в серозном отделяемом.

Специфические маркеры ликвора — beta-2 transferrin (есть только в ликворе) и beta-trace protein (в ликворе 18,4 мг/л, в крови 0,59 мг/л).

### 3.7 Консультации специалистов

Для исключения ЧМТ, повреждения ЛОР-органов и органа зрения — МСКТ и консультации специалистов.

1. нейрохирург (при его отсутствии — невролог);
2. челюстно-лицевой хирург;
3. офтальмолог;
4. оториноларинголог;
5. детский стоматолог.

При подозрении на повреждение внутренних органов — хирург, травматолог, реаниматолог.

---

## 4. Лечение

План лечения составляет челюстно-лицевой хирург совместно с нейрохирургом; офтальмолог, оториноларинголог, травматолог привлекаются по характеру травмы. Часто приоритетны нейрохирургические операции. Решающий фактор исхода — время от травмы до специализированного лечения.

### 4.1 Консервативное лечение

При отсутствии показаний к операции лечение проводится в соответствии с тяжестью ЧМТ. С консервативной терапии начинают в двух ситуациях.

**Посттравматический парез лицевого нерва при переломе височной кости**

1. глюкокортикоиды;
2. вазодилататоры;
3. физиотерапия.

**Базальная ликворея**

1. постельный режим в положении полусидя;
2. серия люмбальных пункций или наружный люмбальный дренаж;
3. дегидратационная терапия.

### 4.2 Сроки репозиции и иммобилизации отломков

Репозицию и фиксацию отломков целесообразно отложить до стабилизации: при тяжёлом состоянии — через **2–7 суток и более**, после противошоковых мероприятий. Первичная хирургическая обработка ран — как можно раньше; глухой шов — до **24–36 часов** после травмы.

**Сроки иммобилизации по сочетанию ЧМТ и переломов лица**

1. тяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — временная иммобилизация после выведения из шока, лечебная — **на 2–5-е сутки**, остеосинтез **не ранее 7-х суток**;
2. тяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы лица — лечебная иммобилизация **через 1–3 суток**;
3. нетяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — иммобилизация и остеосинтез **в первые сутки**;
4. нетяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы — **в первые часы**.

### 4.3 Ортопедическое лечение

У детей ортопедический метод основной. Иммобилизация — индивидуальными проволочными, ленточными или пластмассовыми назубными шинами.

При ЧМТ с позывами на рвоту, особенно у детей, назубные шины и межчелюстную тягу в первые **2–3 суток** лучше не накладывать — риск аспирации и асфиксии; возможна шина без межчелюстной фиксации.

Переломы нижней челюсти у детей со сформированным постоянным прикусом (**после 12–13 лет**): ортопедическая иммобилизация назубными проволочными (стандартными ленточными) шинами с межчелюстной эластичной тягой.

### 4.4 Хирургическое лечение

**Показания к хирургическому лечению**

1. невозможность репозиции ортопедически, многооскольчатые переломы, недостаточно устойчивых зубов, интерпозиция тканей;
2. переломы скулоорбитального, скулоназоорбитального, скулоназоэтмоидального комплексов, стенок орбиты, стенок лобной пазухи;
3. проникающий вдавленный перелом, активное кровотечение, сильное загрязнение раны, раневая инфекция;
4. истечение ликвора через нос, не останавливающееся консервативно;
5. отсроченный парез лицевого нерва или отсутствие эффекта консервативного лечения;
6. отсроченное ухудшение зрения при повреждении зрительного нерва в канале;
7. сдавление мозга, «растущий перелом», косметически значимая деформация.

**Противопоказания**

1. декомпенсированная соматическая патология;
2. острая ЧМТ тяжёлой и крайне тяжёлой степени, реже средней;
3. травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой.

Основной метод — остеосинтез пластинами и винтами для черепно-лицевой хирургии. Детям нерассасывающиеся пластины после консолидации обязательно удаляют.

Доступы к средней зоне: коронарный, трансконъюнктивальный, субцилиарный, транскутанный по нижнему краю глазницы, трансоральный, трансантральный (гайморотомия), по Лимбергу.

**Операции при переломах черепа**

1. удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация;
2. закрытие базальной ликворной фистулы при неэффективности консервативной терапии **5–7 дней** — транскраниально или эндоназально эндоскопически;
3. декомпрессия лицевого нерва через среднюю черепную ямку или транслабиринтно;
4. декомпрессия зрительного нерва;
5. эндоваскулярные вмешательства при ложных аневризмах, соустьях и профузных рецидивирующих носовых кровотечениях; перевязка или коагуляция крылонёбной артерии эндоназальным доступом;
6. репозиция вдавленного перелома у детей элеватором.

При переломе черепа рекомендуется раннее хирургическое вмешательство; при вдавленном переломе давностью до суток без загрязнения раны — репозиция отломков или первичная пластика дефекта.

У младенцев и детей младшего возраста при вдавленных или растущих переломах для восстановления твёрдой мозговой оболочки и костей свода черепа используют только аутоткань: апоневроз, надкостницу, расщеплённую кость, рёбра.

### 4.5 Антибактериальная профилактика

Всем пациентам, которым планируется операция, показана периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза за **30–60 минут** до разреза, как правило однократно; при продлении — отмена не позднее **24 часов** после операции.

**Препараты в зависимости от доступа**

1. наружный доступ без сообщения с полостью рта — цефазолин или цефуроксим;
2. внутриротовой доступ, сообщение с полостью рта, открытый перелом — цефазолин или цефуроксим + метронидазол либо амоксициллин + клавулановая кислота;
3. аллергия на бета-лактамы, риск MRSA — ванкомицин (за 120 минут до разреза).

**Доза цефазолина у детей после 3 лет**

1. масса тела до 80 кг: 1 г;
2. масса тела 80 кг и более: 2 г.

Если продолжительность операции превышает 2 периода полувыведения препарата, вводится дополнительная разовая доза.

### 4.6 Антибактериальная терапия

**Показания**

1. рана IV типа («инфицированная»): старая травма, предшествующая инфекция, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани.

Ориентируются на терапевтические дозы по инструкции с учётом массы тела, возраста, функции почек и печени.

**Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно**

1. взрослые и подростки старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, максимальная суточная доза 6 г;
2. дети до 12 лет: 25 мг/кг в сутки;
3. длительность: до 14 дней.

**Цефазолин**

1. дети: 25 мг/кг/сут, в тяжёлых случаях до 100 мг/кг/сут;
2. дети до 1 месяца: противопоказан;
3. длительность: 7–10 дней.

**Метронидазол внутривенно капельно**

1. дети до 12 лет: 7,5 мг/кг на введение;
2. дети старше 12 лет: 500 мг на введение.

**Цефуроксим**

1. дети, включая грудных: 30–100 мг/кг/сут в 3–4 введения;
2. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг/сут в 2–3 введения.

**Ванкомицин только внутривенно**

1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 г в сутки (0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов);
2. дети от 1 месяца до 12 лет: 10 мг/кг каждые 6 часов, суточная доза 40 мг/кг;
3. новорождённые: начальная доза 15 мг/кг, затем 10 мг/кг каждые 12 часов на 1-й неделе жизни, со 2-й недели — каждые 8 часов до возраста 1 месяца.

**Показания к антибиотикотерапии в послеоперационном периоде**

1. загрязнение раны инородными телами;
2. пластика вдавленного перелома протезом;
3. нагноившиеся раны головы.

**При нагноении раны**

1. снятие швов, ревизия раны, вторичная хирургическая обработка;
2. удаление титановых или иных пластических материалов;
3. вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом или абсцесса полости рта;
4. посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы;
5. продолжение этиотропной терапии, местное лечение.

### 4.7 Обезболивание и иное лечение

Остеосинтез — под общим обезболиванием с интубацией через нос или рот; ортопедические манипуляции — под премедикацией и местной анестезией.

При нарушении всех компонентов приёма пищи кормят через зонд, при неэффективности — парентерально. Детям **до 3 лет** назначают молочную диету, старше — челюстную. Физиотерапия — по назначению физиотерапевта.

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Показания к госпитализации

**Экстренная госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии**

1. подозрение на перелом челюсти любой локализации или его наличие;
2. раны мягких тканей лица и полости рта;
3. обширные раны мягких тканей челюстно-лицевой области.

Пострадавших с множественными переломами госпитализируют в многопрофильный стационар с нейрохирургией и нейрореанимацией, круглосуточной КТ; при транспортировке — временная иммобилизация челюстей. Плановой госпитализации нет.

**Показания к выписке**

1. выполнены запланированные исследования;
2. восстановлена анатомическая целостность челюстно-лицевой области;
3. нет признаков послеоперационных осложнений.

### 5.2 Медицинская реабилитация

Всем пациентам с множественными переломами черепа и сочетанной ЧМТ после иммобилизации костных фрагментов показаны реабилитационные мероприятия для полного физического и социального восстановления.

### 5.3 Диспансерное наблюдение

Детям диспансеризация — на весь период до завершения роста лицевых костей. Осмотры — **через 2–4 недели**, 3, 6 месяцев и год.

**Участники наблюдения**

1. челюстно-лицевой хирург;
2. невролог и офтальмолог;
3. оториноларинголог;
4. ортодонт и детский стоматолог.

Невролог после выписки — **1 раз в 3 месяца** в первый год, затем **1 раз в 6 месяцев**: возможны посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия, ликворея.

**Обследование на 1-м году диспансерного наблюдения**

1. КТ головного мозга;
2. электроэнцефалография;
3. консультация невролога;
4. консультация офтальмолога.

Через **4 недели** после операции — контрольное рентгенологическое исследование: консолидация фрагментов и исключение посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа» |
| Версия | 1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года |

| | |
|---|---|
| Код в рубрикаторе | 871_1 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Ассоциация нейрохирургов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 7 при делении на группы перелом верхней челюсти по Ле Фор I и II отнесён к тяжёлым переломам лица (1-я группа), а Ле Фор III (черепно-лицевое разъединение) — к нетяжёлым (2-я группа); от группы зависят сроки иммобилизации.