Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 4

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы 4

2.4 Классификация 4

2.5 Критерии степени тяжести 5

2.6 Клиническая картина 5

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей 5

2.8 Осложнения 6
2.9 Жалобы и анамнез 6
3. Диагностика 7
3.1 Осмотр кожи, слизистых оболочек, носа и ротоглотки 7
3.2 Осмотр и пальпация лимфатических узлов 7
3.3 Обследование лёгких 8
3.4 Обследование сердечно-сосудистой системы 8
3.5 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 8
3.6 Общий анализ мочи 8
3.7 Биохимический анализ крови 8
3.8 Экспресс-тест на антигены вирусов 8
3.9 Методы амплификации нуклеиновых кислот 9
3.10 Пульсоксиметрия 9
3.11 Рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких 9
3.12 Рентгенография или КТ околоносовых пазух 9
3.13 Электрокардиография 9
3.14 Консультации специалистов 10
3.15 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе 10
3.16 Дифференциальная диагностика 10
3.17 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ 10
4. Лечение 11
4.1 Базисная терапия 11
4.2 Противовирусная терапия 12
4.3 Жаропонижающая терапия 14
4.4 Местная терапия ринита и риносинусита 14
4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита 15
4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия 15
4.7 Антибактериальная терапия 16
4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита 16
4.9 Терапия тяжёлого течения 17
4.10 Дополнительная терапия 17
4.11 Медицинская реабилитация 17
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 18
5.1 Показания к госпитализации 18
5.2 Диспансерное наблюдение 19
5.3 Профилактика 19
6. Источник и актуальность 20
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 21

1. Основные положения

- При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:
  1. рините;
  2. конъюнктивите;
  3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
  4. ларингите и крупе;
  5. бронхите.
- При затруднении носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрении на бактериальный синусит необходимы рентгенография или компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу. Изменения в пазухах не всегда свидетельствуют о бактериальном воспалении.
- Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:
  1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
  2. вторая линия: иммунотропные препараты.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите применяют местные деконгестанты, которые облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- Препаратом выбора при бактериальном риносинусите является амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки **7–10 дней**.
- Показания к срочной госпитализации:
  1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
  2. сатурация **ниже 95%**;
  3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой группу вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и поражающих преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп A и B и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) рассматриваются в отдельных клинических рекомендациях и в данном документе не освещаются.

2.2 Этиология

Наиболее частые возбудители ОРВИ

1. респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) А и В;
2. респираторный энтеровирус;
3. риновирус;
4. аденовирус;
5. метапневмовирус человека;
6. вирусы парагриппа 1–4 типов;
7. сезонные коронавирусы.

Большинство из них РНК-содержащие; их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития заболевания и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По типу течения

1. типичная (манифестная);
2. атипичная (бессимптомная, стёртая).

По тяжести

1. лёгкая;
2. средняя;
3. тяжёлая;
4. очень тяжёлая.

По характеру течения

1. неосложнённая;
2. осложнённая: со специфическими осложнениями, с осложнениями, обусловленными вторичной микрофлорой, или с обострением хронических заболеваний.

По длительности

1. острая: **5–10 дней**;
2. подострая: **11–30 дней**;
3. затяжная: **более 30 дней**.

2.5 Критерии степени тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура тела 37–37,5 °C или нормальная, умеренно выраженные катаральные явления, продолжительность заболевания 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура тела 38–39 °C, выраженные катаральные явления; при отсутствии осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура тела 39–41 °C; на фоне слабо или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период **от 1 до 14 суток**, у наиболее распространённых вирусов **1–5 дней**. Заболевание, как правило, начинается постепенно.

Интоксикация (умеренно выраженная)

1. повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений;
2. слабость;
3. головная боль;
4. боли в мышцах и суставах.

Катаральный синдром

1. першение в горле;
2. кашель;
3. насморк;
4. в ряде случаев конъюнктивит.

Возможно увеличение лимфатических узлов, реже печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой оболочки полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Стекание слизи по задней стенке глотки вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки: внезапно возникающие першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин как вирусной природы, так и при обострении бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, нёбных дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первыми симптомами являются сухой «лающий» кашель и осиплость голоса.
Трахеит	Воспаление слизистой оболочки трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель сохраняется 2 недели и более (до месяца). На второй неделе мокрота может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок вследствие примеси фибрина и присоединения бактериальной флоры.

2.8 Осложнения

Специфические осложнения

1. менингизм;
2. острая дыхательная недостаточность;
3. энцефалопатия;
4. инфекционно-токсический шок;
5. респираторный дистресс-синдром взрослых;
6. острая сердечно-сосудистая недостаточность;
7. миокардит;
8. тромбоэмболия.

Осложнения, обусловленные вторичной бактериальной микрофлорой

1. острый синусит;
2. острый отит;
3. острый бронхит;
4. обострение хронических бронхолёгочных заболеваний;
5. пневмония.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют

1. недомогание, утомляемость, слабость, снижение аппетита;
2. повышение температуры тела;
3. головную боль;
4. боль в горле;
5. затруднение носового дыхания, насморк;
6. осиплость;
7. сухой или влажный кашель;
8. увеличение лимфатических узлов;
9. боль в животе, рвоту;
10. одышку, затруднённый вдох;
11. судороги, потерю сознания.

Уточняются длительность заболевания, а также наличие причин, препятствующих незамедлительному началу лечения или требующих его коррекции в связи с сопутствующими заболеваниями.

К таким причинам относятся непереносимость лекарственных препаратов, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронического заболевания, требующее участия профильного специалиста, а также отказ от лечения.

Эпидемиологический анамнез

1. контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода;
2. сезонный подъём заболеваемости;
3. вспышки в организованных коллективах;
4. вакцинация против гриппа.

Факторы риска тяжёлого и осложнённого течения

1. хронические заболевания лёгких и сердца;
2. нарушения обмена веществ;
3. хроническая болезнь почек;
4. заболевания печени;
5. неврологические состояния;
6. гемоглобинопатии;
7. иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров);
8. злокачественные новообразования;
9. возраст **старше 65 лет**;
10. беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании

1. жалоб и анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных и инструментальных исследований.

Цель диагностики: определить

1. нозологическую и клиническую форму;
2. степень тяжести;
3. наличие осложнений;
4. показания к лечению.

3.1 Осмотр кожи, слизистых оболочек, носа и ротоглотки

Диагностические признаки при осмотре

1. кожные покровы и видимые слизистые оболочки: гиперемия, бледность, цианоз, влажность, отёчность;
2. инъекция сосудов склер, конъюнктивит;
3. носовое дыхание и признаки ринита;
4. ротоглотка: гиперемия нёбных дужек и задней стенки глотки, состояние миндалин, рыхлость и зернистость задней стенки глотки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы необходимо выявлять уже на первом этапе обследования, однако они встречаются и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

3.2 Осмотр и пальпация лимфатических узлов

Показания

1. все пациенты: осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи с оценкой размеров и болезненности.

3.3 Обследование лёгких

Показания

1. все пациенты: пальпация, перкуссия и аускультация лёгких.

Диагностические признаки

1. частота дыхания;
2. характер дыхательных шумов;
3. хрипы;
4. крепитация (появляется при пневмонии).

3.4 Обследование сердечно-сосудистой системы

Показания

1. пациенты с ОРВИ: частота пульса, артериальное давление, аускультация сердца.

Цель: оценка степени тяжести, выявление тахикардии, шумов, осложнений и сопутствующих заболеваний.

3.5 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Показания

1. все пациенты: оценка тяжести, своевременное выявление осложнений, исключение бактериальных осложнений.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное количество лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

3.6 Общий анализ мочи

Показания

1. все пациенты: выявление нарушения функции почек, декомпенсации сопутствующих заболеваний, исключение инфекции мочевыводящих путей и нефропатии.

При неосложнённой ОРВИ изменения отсутствуют; при выраженной лихорадке возможны преходящее повышение относительной плотности мочи, незначительные лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

3.7 Биохимический анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение: активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амилазы, уровень мочевины и электролитов.

3.8 Экспресс-тест на антигены вирусов

Показания

1. пациенты с симптомами респираторной инфекции, обратившиеся **не позднее 2 суток** от начала симптомов.

Цель: своевременное назначение противовирусной терапии.

Иммунохроматографический тест: антигены вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки.

3.9 Методы амплификации нуклеиновых кислот

Мазки из носоглотки и ротоглотки исследуют методами амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция (ПЦР), петлевая изотермическая амплификация (LAMP) и другие) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Показания

1. пациенты с симптомами респираторной инфекции.

Цель: идентификация возбудителя.

1. наиболее эффективный метод;
2. нуклеиновые кислоты вирусов выявляются в среднем **до 7 дней**, максимально **до 2 недель** от начала заболевания при сохранении признаков поражения верхних дыхательных путей;
3. результат готов **через 4–6 часов**.

Обследование пациентов с тонзиллитом и пневмонией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями по данным заболеваниям.

3.10 Пульсоксиметрия

Измерение сатурации крови кислородом (SpO2).

Показания

1. пациенты с ОРВИ.

Цель: ранняя диагностика дыхательной недостаточности, выявление пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке.

3.11 Рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких

Показания

1. бронхит продолжительностью **более 3–5 дней**;
2. физикальные признаки поражения лёгких.

Цель: исключение или подтверждение пневмонии.

3.12 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. затруднение носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрение на синусит вследствие присоединения бактериальной флоры.

Цель: своевременное направление пациента к оториноларингологу.

Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в околоносовых пазухах не всегда свидетельствуют об их бактериальном поражении.

3.13 Электрокардиография

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно у пациентов пожилого возраста: оценка функции сердца и выявление нарушений ритма на фоне интоксикации.

3.14 Консультации специалистов

Консультации смежных специалистов при подозрении на осложнения

1. оториноларинголог: синусит, отит;
2. невролог: энцефалопатия;
3. пульмонолог: признаки пневмонии;
4. гематолог: выраженные изменения в анализе крови, геморрагический синдром;
5. кардиолог: миокардит, острая сердечно-сосудистая недостаточность;
6. акушер-гинеколог: беременность.

Консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ):

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 25 в минуту**, SpO2 **ниже 92%**;
2. другая органная недостаточность: **2 балла и более** по шкале SOFA.

3.15 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе

1. при катаральных явлениях: общий анализ крови и обследование лёгких;
2. изменений в лёгких нет: лечение амбулаторное; при сохранении лихорадки на фоне лечения анализ крови повторяют, при изменениях направляют к инфекционисту;
3. есть изменения в лёгких: рентгенография; если признаков пневмонии нет, выполняют рентгенографию околоносовых пазух;
4. изменения в пазухах: направление к оториноларингологу.

3.16 Дифференциальная диагностика

ОРВИ дифференцируют с острыми респираторными заболеваниями бактериальной природы, в том числе вирусной пневмонии с бактериальной.

3.17 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
Парагрипп	Инкубационный период 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °C, может сохраняться длительно; интоксикация слабо или умеренно выражена, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость голоса; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия слизистой оболочки зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой «лающий» кашель, в ряде случаев до 12–21 дня; ведущими синдромами являются ларингит и ложный круп

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
РС-инфекция	Инкубационный период 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, в ряде случаев затяжное	Субфебрильная, в ряде случаев нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых оболочек	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм
Аденовирусная инфекция	Инкубационный период 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Резко выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; возможны полиаденит, гепатоспленомегалия, экзантема, диарея

4. Лечение

Целями лечения являются подавление репликации вируса в ранние сроки, предотвращение прогрессирования заболевания, достижение полного выздоровления и профилактика осложнений.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам независимо от степени тяжести:

1. постельный режим;
2. диета: легкоусвояемые продукты, богатые витаминами;
3. обильное питьё;
4. исключение алкоголя в любом виде.

Дезинтоксикационная терапия всем пациентам без поражения лёгких:

1. лёгкое и среднетяжёлое течение, амбулаторно: приём **2–3 литров** жидкости в сутки;
2. среднетяжёлое течение, стационар: пероральная регидратация и (или) инфузия **800–2000 мл** растворов, влияющих на водно-электролитный баланс;
3. осложнённое и тяжёлое течение: внутривенная дезинтоксикационная терапия с коррекцией электролитных нарушений.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации применяют меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:

1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
2. вторая линия: иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Выбор препарата определяется возбудителем. Раннее назначение противовирусной терапии предупреждает тяжёлое течение и развитие осложнений; целесообразность назначения противовирусного препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

Препарат	Доза	Противопоказания (кроме гиперчувствительности)
Риамиловир (первая линия)	Внутрь 250 мг 3 раза в день в течение 5 дней; лечение следует начать не позднее 2-го дня болезни	в рекомендации не указаны
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток	I триместр беременности
Энисамия йодид (первая линия)	Внутрь 500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней	беременность и грудное вскармливание, тяжёлые органические поражения печени и почек, аллергические реакции в анамнезе, дефицит лактазы и сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы и фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день в течение 5–7 дней, приём желательно начать в первые 2 суток	беременность, период лактации, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток)	беременность, период лактации
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, в последующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	беременность, период лактации, возраст до 12 лет, наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, нарушение всасывания глюкозы и галактозы

Препарат	Доза	Противопоказания (кроме гиперчувствительности)
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки: по 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 7 дней. Раствор: парентерально 6 мг в сутки в течение 3 дней, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо сублингвально по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Суппозитории: 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	беременность, грудное вскармливание
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки в первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	беременность, период лактации, возраст до 18 лет
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 таблетке каждые 30 минут в течение первых 2 часов, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	врождённая галактоземия, мальабсорбция глюкозы или галактозы, врождённая лактазная недостаточность; у беременных и в период лактации эффективность и безопасность не изучались
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	В 1-й день по той же схеме, затем по 1 таблетке 3 раза в день; общая продолжительность 5 дней, с 18 лет	врождённая галактоземия, мальабсорбция глюкозы или галактозы, врождённая лактазная недостаточность; у беременных и в период лактации эффективность и безопасность не изучались

Беременность и лактация

1. умифеновир противопоказан в I триместре беременности;
2. при беременности и в период лактации противопоказаны энисамия йодид, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, меглюмина акридонацетат, оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, азоксимера бромид, тилорон;
3. для препаратов антител к гамма-интерферону (Эргоферон, Рафамин) эффективность и безопасность у беременных и в период лактации не изучались.

Возможно применение интраназальных интерферонов, которые обладают опосредованным действием и используются в комплексной терапии с первых признаков заболевания. В рекомендации отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b

1. по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день: 3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки;
2. курс 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный

1. по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день;
2. курс 5–7 дней.

Лизаты бактерий в комплексном лечении для стимуляции иммунитета

1. неосложнённая ОРВИ;
2. частые, тяжёлые или затяжные респираторные инфекции в анамнезе.

С первых дней заболевания по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды до исчезновения симптомов, **не менее 10 дней**.

4.3 Жаропонижающая терапия

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) назначают при температуре тела **выше 38 °C** и болях в мышцах и суставах.

Препараты выбора

1. парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, **не более 4000 мг в сутки**;
2. ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, **не более 1200 мг в сутки**;
3. возможны комбинации ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяются только для снижения температуры тела и обезболивания; длительные курсы нецелесообразны, поскольку могут затруднить оценку эффективности лечения.

4.4 Местная терапия ринита и риносинусита

Физиологический раствор натрия хлорида вводится в полость носа 2–3 раза в день; он разжижает секрет, способствует удалению слизи и восстанавливает функцию мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяются местные деконгестанты для уменьшения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	По 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	По 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация, применяется при обильной ринорее; доза в рекомендации не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

Показания

1. назофарингит и неосложнённый риносинусит с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки; назначают с первого дня.

Состав комбинированного растительного препарата

1. корень горечавки;
2. цветки первоцвета;
3. трава щавеля;
4. цветки бузины;
5. трава вербены.

Препарат улучшает функцию мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление, способствует профилактике осложнений.

1. сухой экстракт: по 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день;
2. измельчённое растительное сырьё: по 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день;
3. капли: по 50 капель 3 раза в день;
4. курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат может быть назначен после консультации врача в форме таблеток, а при невозможности их приёма в форме капель.

4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита

Для уменьшения воспаления и болевого синдрома и профилактики вторичной инфекции слизистой оболочки ротоглотки назначаются препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания.

1. грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином);
2. бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием;
3. гексэтидин;
4. лизоцим с пиридоксином;
5. хлоргексидин;
6. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний;
7. биклотимол;
8. препараты йода.

Показания: фарингит и тонзиллит

1. боль в горле в покое и при глотании;
2. гиперемия слизистой оболочки глотки и миндалин;
3. увеличение миндалин.

Состав растительного антисептика

1. корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника;
2. кора дуба, листья грецкого ореха;
3. трава хвоща, трава одуванчика.

Препарат уменьшает боль и воспаление, способствует профилактике осложнений и повторных эпизодов ОРВИ.

Таблетки — по 2 таблетки (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день до купирования боли в горле, затем ещё в течение недели 3 раза в день. Препарат может назначаться беременным и пациентам с соматическими заболеваниями после консультации врача.

4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия

При сухом непродуктивном надсадном кашле, значительно ухудшающем качество жизни (болевой синдром, нарушение сна), назначают противокашлевые средства:

1. бутамират;
2. леводропропизин;
3. антитела к брадикинину, морфину и гистамину;
4. декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в форме сиропа — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — по 60 мг 1–3 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначаются муколитические и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитические препараты, в том числе растительные, применяются только при продуктивном кашле.

Муколитические и отхаркивающие средства

1. ацетилцистеин: 600 мг в сутки до 5–7 дней;
2. бромгексин: внутрь по 8 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки;
3. амброксол: 90 мг в сутки, в форме капсул пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней;
4. амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт: внутрь 40 мл в сутки (по 10 мл 4 раза);
5. амброксол + натрия гидрокарбонат + натрия глицирризинат + термопсиса ланцетного травы экстракт: по 1 таблетке 3 раза в сутки;
6. плюща обыкновенного листьев экстракт + тимьяна травы экстракт, сироп: по 5,4 мл 3 раза в сутки после еды, 10–14 дней;
7. первоцвета корней экстракт + тимьяна травы экстракт: по 1 таблетке 3 раза в день перед едой, 10–14 дней.

Одновременное назначение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется, поскольку подавление кашлевого рефлекса может привести к застою мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для облегчения отхождения вязкой мокроты рекомендуются небулайзерные ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме, обусловленном бронхоспазмом, применяют комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в форме дозированного аэрозольного ингалятора по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым может назначаться амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день в течение 2 недель.

4.7 Антибактериальная терапия

При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:

1. рините;
2. конъюнктивите;
3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
4. ларингите и крупе;
5. бронхите и бронхообструктивном синдроме.

Показания к антибактериальной терапии:

1. вероятная сопутствующая бактериальная инфекция;
2. неэффективность патогенетической, симптоматической и противовирусной терапии;
3. бактериальные осложнения среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ: бронхит, пневмония и другие.

4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита

Препарат	Доза
Амоксициллин	Внутрь 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней

Препарат	Доза
Азитромицин	Внутрь 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней (кратность приведена по тексту рекомендации)
Левофлоксацин	Внутрь 500 мг до 5–7 дней; применяется при устойчивой микрофлоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В рекомендации имеется расхождение в сроках. Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а в разделе об организации медицинской помощи сохранение высокой температуры тела более 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Лечение пневмонии в данных рекомендациях не рассматривается и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Терапия тяжёлого течения

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком головного мозга применяют системные глюкокортикоиды; лечение таких пациентов осуществляется в ОРИТ в соответствии с рекомендациями по неотложным состояниям.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 **ниже 92%**) необходима оксигенотерапия через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начальная скорость потока **5–7 л/мин**, при необходимости до 10 л/мин для поддержания SpO2 выше 90%.

4.10 Дополнительная терапия

Для защиты слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарственных препаратов, в том числе НПВП, назначается омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики рекомендованы пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, заболеваниями кожи, а также при приёме антибиотиков более 7 дней в настоящее время или в предшествующие 1–2 месяца. Пробиотики применяются в ранние сроки заболевания в сочетании с другими препаратами.

Пробиотики

1. бифидобактерии бифидум однокомпонентный сорбированный: по 2–3 капсулы или 2–3 пакетика 2 раза в день, 7–10 дней;
2. бифидобактерии бифидум + лактобактерии плантарум: по 1 капсуле или пакету 3 раза в сутки, 5–10 дней;
3. Lactobacillus acidophilus (LA-5) + Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12): 1–3 капсулы в день в зависимости от тяжести симптомов;
4. бифидобактерии лонгум + энтерококкус фециум: 2–3 капсулы в сутки, 10–21 день;
5. сахаромицеты буларди: по 1–2 капсулы 2 раза в день во время применения антибиотика.

4.11 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается в периоде ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении применяют общетонизирующие препараты, в частности оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, в последующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановительное лечение проводится комплексно, с участием специалистов разного профиля, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и при постоянном контроле эффективности. Физическая и умственная нагрузка увеличивается постепенно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Перед выбором тактики ведения определяется характер течения заболевания (неосложнённое или осложнённое).

Лечение лёгкой и среднетяжёлой ОРВИ амбулаторное. При неэффективности лечения или невозможности его проведения в домашних условиях решается вопрос о госпитализации.

Госпитализации подлежат пациенты:

1. с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением;
2. из групп риска;
3. по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением при проживании в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В рекомендации имеется противоречие в отношении среднетяжёлого течения: одна рекомендация раздела 6 предусматривает амбулаторное лечение таких пациентов, следующая предусматривает их госпитализацию.

Показания к срочной госпитализации:

1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
2. SpO2 **ниже 95%**;
3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

Показания к переводу в ОРИТ:

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 30 в минуту**, SpO2 **ниже 90%**, систолическое артериальное давление **ниже 90 мм рт. ст.**;
2. другая органная недостаточность, например острая почечная недостаточность.

> Пороговые значения для перевода в ОРИТ в разных разделах рекомендации различаются: в разделе 2.5 консультация анестезиолога-реаниматолога показана при частоте дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 перевод в ОРИТ показан при частоте дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.

При прогрессировании заболевания схему ведения срочно пересматривают. Признаки прогрессирования:

1. гипоксия и сердечно-лёгочная недостаточность: одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, снижение сатурации;
2. поражение нервной системы: нарушение сознания, сонливость, судороги, выраженная слабость, параличи;
3. вторичная бактериальная инфекция, в том числе сохранение высокой температуры тела и других симптомов **более 3 дней**;
4. тяжёлая дегидратация.

Выписка возможна при:

1. стойком улучшении состояния;
2. нормальной температуре тела;
3. регрессе респираторно-катарального синдрома;
4. нормальных показателях общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные и родильницы;
2. хронические заболевания лёгких, сердца и сосудов;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. хроническая болезнь почек;
5. заболевания печени;
6. некоторые неврологические состояния;
7. гемоглобинопатии;
8. иммунодефициты;
9. злокачественные новообразования;
10. возраст **65 лет и старше**.

5.2 Диспансерное наблюдение

При развитии осложнений наблюдение осуществляет терапевт, после аденовирусной инфекции инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлиники.

В течение месяца после выписки вакцинация не проводится, за исключением введения анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После перенесённого заболевания рекомендуется ограничение инсоляции на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести течения.

5.3 Профилактика

Вакцины против ОРВИ отсутствуют.

1. среди контактных лиц выявляют заболевших;
2. больного изолируют на дому, при необходимости в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем **на 1–2 недели**; затем он может приступить к работе;
3. карантин для контактных лиц не вводится.

При работе с больными ОРВИ необходимо использование маски со сменой каждые 3–4 часа.

Необходимы обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, влажная уборка и проветривание помещений.

После контакта с больным ОРВИ рекомендуется химиопрофилактика. Экстренная профилактика в очаге продолжается 2 дня при прекращении контакта и 5–7 дней при его сохранении. Плановая сезонная профилактика проводится перед эпидемическим подъёмом заболеваемости лицам с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки в течение 10–14 дней; сезонная профилактика — 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток

Препарат	Доза для профилактики
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5–7 дней; при однократном контакте достаточно однократного закапывания
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака в течение 10 дней
Меглюмина акридонацетат	Не позднее 3 дней после контакта — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды в течение 14 дней
Азоксимера бромид	По 1 таблетке в день в течение 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или сублингвально, или суппозитории 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	По 1 таблетке в день в течение 1–3 месяцев в период подъёма заболеваемости

Лизаты бактерий для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции, независимо от сезона:

1. лица, проживающие в неблагоприятных экологических условиях;
2. хронический бронхит;
3. хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);
4. бронхиальная астма;
5. хронический риносинусит;
6. хронический тонзиллит.

Три курса по 10 дней с интервалами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, рекомендуется #колекальциферол (пометка off-label, в КР — знак #, означает применение вне инструкции по медицинскому применению).

1. без ожирения: 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю;
2. при ожирении: 3000–6000 МЕ в сутки.

Пациенту разъясняется необходимость срочного обращения к врачу при высокой температуре тела, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте, не приносящей облегчения, и резком снижении артериального давления.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 6 одна рекомендация предусматривает амбулаторное лечение среднетяжёлой ОРВИ, а следующая предусматривает госпитализацию.
- Пороговые значения для перевода в реанимацию расходятся: в разделе 2.5 частота дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 частота дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.
- Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а сохранение температуры более 3 дней в разделе 6 расценивается как признак вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография околоносовых пазух предусмотрена только при изменениях в лёгких без признаков пневмонии, тогда как в разделе 2.4 она назначается в зависимости от длительности затруднения носового дыхания.
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; для оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; доза бромгексина записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).