

# BOYABAT BARAJ GÖLÜ 2. AVLAK BÖLGESİ(SINOP) AVLANABİLİR SU ÜRÜNLERİ STOK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

## 1. BARAJ GÖLÜNÜN YERİ VE ÖZELLİKLERİ

Boyabat Barajı, Kızılırmak nehri üzerinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü gayesiyle 2012 yılında inşa edilmiştir. Barajın 330,00 m olan normal su kotundaki göl alanı 6540 hektardır. Boyabat Baraj Gölü Samsun, Sinop ve Çorum illeri sınırları içerisinde yer almaktadır.

## 2. ETÜT ÇALIŞMALARI

Baraj göl alanındaki rezervuar saha temizliği çalışmaları 1995 yılında yapılmıştır. Göl suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tespiti amacıyla yapılan limnolojik etüt çalışmaları ise 2014 yılında tamamlanmıştır.

Boyabat Baraj Gölü'nde tespit edilen balık türleri:

- Pullu sazan (*Cyprinus carpio*)
- Sudak (*Stizostedion lucioperca*)
- Siraz (*Capoeta sp.*)
- Tatlısu kefali (*Squalis cephalus*)
- Bıyıklı balık (*Barbus sp.*)
- Kaya balığı (*Proterorhinus marmoratus*)
- Yayın (*Silurus glanis*)

## 3. AVLANABİLİR STOK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Stok tespiti çalışmaları rezervuarda bulunan balık popülasyonlarının cins ve miktarlarının tespiti ile işletilmesi sırasında verimin en yüksek düzeyde tutulması için uyulması gereken av teknik şartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

### 3.1 Materyal ve Metot

Avlanabilir stok miktarının göl alanının farklı verimlilikleri de dikkate alınarak belirlenmesi amacıyla istasyonlar belirlenerek örnekleme çalışmaları yapılmıştır. “Av Yoğunluğu” yöntemi kullanılarak çeşitli göz aralıklı fanyalı ve fanyasız ağlarla çalışılmıştır. Ağlardan çıkan balıkların biyometrilere ağ gözlerine göre ayrı ayrı yapılmıştır. Balıklardan alınan pul örnekleri laboratuvara getirilerek yaş tayinleri pul analizi ile gerçekleştirilmiştir. Avlanan balık örneklerinin toplam boyları milimetrik ölçüm tahtası ile ağırlıkları ise 2 g duyarlığa sahip terazi ile ölçülmüştür.

### 3.2 Değerlendirme Çalışmaları

Baraj gölünden alınan verilerin değerlendirilmesine pul örneklerinin analizi ile başlanılmıştır. Yaş analizlerinden alınan ortalama değerler balıkların yumurtlama boy ve ağırlığı ile birleştirilerek balıkların ilk döl verdiği yaş tespit edilmiştir. Bu özelliklerin ağların selektif güçleri ile karşılaştırılması sonucu Baraj Gölü'nün işletilmesi sırasında kullanılacak minimum ağ gözünün tespiti yapılmıştır.

**Boyabat Baraj Gölü 2. Avlak Bölgesi(Sinop);** Boyabat Barajı yasak bölgesinden başlayarak membaya doğru ekli haritada Kızılırmak eski nehir yatağının belirtildiği kırmızı hattın batısında kalan alanın Sinop-Çorum il sınırını kestiği noktaya kadar olan alanı kapsamaktadır. Bölgede Sinop ili, Saraydüzü ilçesine bağlı Fakılı, Yaylacılı, Hacıçay ve Yalmansaray köyleri bulunmaktadır. Maksimum su kotunda bölgenin **Rezervuar alanı 2000 hektardır.**

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış olan avlanabilir stok tespiti ve istihsal kontrolü çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu tahmin edilen avlanabilir su ürünleri tür ve miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Su Ürünleri Türü |                                    | Avlanabilir Stok Miktarı (kg/yıl) |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Pullu sazan      | ( <i>Cyprinus carpio</i> )         | 3.000                             |
| Siraz            | ( <i>Capoeta sp.</i> )             | 2.500                             |
| Tatlısu kefali   | ( <i>Leuciscus cephalus</i> )      | 500                               |
| Sudak            | ( <i>Stizostedion lucioperca</i> ) | 500                               |
| Yayın            | ( <i>Silurus glanis</i> )          | 1.000                             |
| Bıyıklı balık    | ( <i>Barbus sp.</i> )              | 1.000                             |
| <b>TOPLAM</b>    |                                    | <b>8.500</b>                      |

#### 4. SONUÇ

Yapılan çalışmalar sonucu Boyabat Baraj Gölü 2. Avlak Bölgesinin(Sinop) tahmin edilen **8,5 ton/yıl** stok ve ekli teknik şartlar dâhilinde **5 yıl** süreyle kiraya verilmesi Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.